

Медико-социальная помощь

Текст вопроса	Верный вариант
Текст варианта	
«Дезинфекция» – это	
уничтожение патогенных микроорганизмов	
комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды	+
уничтожение грибов	
уничтожение вирусов	
«Не навреди» - это основной принцип этической модели	
Гиллократа	+
Парацельса	
деонтологической	
биоэтики	
«Стерилизация» – это	
уничтожение патогенных бактерий	
уничтожение микробов на поверхности	
уничтожение инфекции	
освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение	+
Адсорбент, применяемый при отравлениях	
раствор крахмала	
раствор сернистой магнелии	
активированный уголь	+
Алексия — это	
потеря способности к счёту	
потеря способности к чтению	+
потеря узнавания предметов	
Амнезия – это нарушение	
памяти	+
внимания	
мышления	
восприятия	
Анализ психологических работ позволил выделить личностные особенности пожилых людей	
опыт, мудрость, духовность	+
быстрота, выносливость, честолюбие	
независимость, реактивность, эгоцентризм	
Антиретровирусные препараты, предназначенные для профилактики ВИЧ-инфекции медицинских работников должны храниться	
в сейфе	
в месте, доступном для сотрудников	+
в доступном месте для сотрудников и пациентов	
Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на	
предупреждение попадания микробов в рану	
полное уничтожение микробов и их спор	
стерильность	
предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом	
ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом	+
Апатия — это	
длительное угнетённое состояние	
болезненное безразличие к событиям внешнего мира	+
кратковременное недовольство	

Апраксия — это	
отсутствие возможности пользоваться предметами согласно их назначения	+
отсутствие способности к счёту	
отсутствие способности к рисованию	
Аптечку «анти - ВИЧ», при аварийной ситуации с пациентом - носителем вирусного гепатита В или С	
Можно использовать	+
Нельзя использовать	
Артериальный жгут накладывают максимум на	
0,5-1 час	+
1,5-2 часа	
6-8 часов	
3-5 часов	
Артрит - это	
воспалительное заболевание суставов	+
дегенеративное заболевание суставов	
Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на	
уничтожение микробов в ране	
полное уничтожение микробов и их спор	
стерильность	
ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом	
предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом	+
Атеросклероз — это	
проявление биологии возраста	
результат возрастных изменений стареющего организма	
патологический процесс	+
Афазия — это	
нарушение сна	
нарушение слуха	
нарушение речи	+
Барьерные меры защиты медицинского персонала при выполнении в/м инъекций	
халат, маска, перчатки	
халат, перчатки, шапочка	+
одноразовая маска, защитный экран, сменная обувь	
Благоприятное воздействие, оказываемое личностью медицинского работника на психику пациента носит название	
терапевтическим общением	+
нетерапевтическим общением	
Болезнь Альцгеймера относится к группе	
сердечно — сосудистых заболеваний	
эндокринных заболеваний	
опухолей	
нейродегенеративных заболеваний	+
Боль в месте перелома костей таза усиливается при надавливании на	
голову	
пятки	
крылья подвздошных костей	+
живот	
Боль за грудиной, иррадиирующая в левую руку и левую лопатку – признак	
Приступа стенокардии	+
Желчной колики	
Почечной колики	
Приступа бронхиальной астмы	
Больные с электротравмами после оказания помощи	
направляются на прием к участковому врачу	
не нуждаются в дальнейшем обследовании и лечении	
госпитализируются скорой помощью	+
В 90-х годах в России	
смертность растёт, рождаемость снижается	+
смертность растёт, рождаемость растёт	
смертность снижается, рождаемость снижается	

В высохшей мокроте на различных предметах внешней среды микобактерии туберкулеза могут сохранять свои свойства в течение	
нескольких дней	
нескольких месяцев	+
несколько лет	
несколько часов	
В государственную структуру гериатрической службы входят	
Всероссийское общество Красного Креста	
центры социального обслуживания населения	
В дореактивном периоде отморожения характерны	
бледность кожи	
отсутствие чувствительности кожи	+
боль	
гиперемия кожи	
отек	
В мирное время для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях применяется система этапного лечения	
одноэтапная	
двухэтапная	+
трехэтапная	
многоэтапная	
В передачах для пациентов психиатрического стационара разрешено	
бытовая химия	
острые предметы	
средства личной гигиены	+
В психиатрии пожилой возраст является наиболее значимым фактором риска развития	
деменция	+
простудных заболеваний	
ревматических артритов	
В Российской Федерации "Основы законодательства об охране здоровья граждан РФ" пожилой возраст считается	
с 65 лет у женщин, с 70 лет у мужчин	
с 60 лет у мужчин, с 55 лет у женщин	+
с лет 50 у женщин, с 60 лет у мужчин	
В случае неоказания помощи больному медицинские работники привлекаются по статье	
ст 122 УК РФ	
ст. 124 УК РФ	+
ст. 105 УК РФ	
ст. 229 к РФ	
В случае умышленного причинения смерти другому человеку или в целях использования органов или тканей потерпевшего, медицинский работник может быть привлечён к уголовной ответственности по	
ст. 105 УК РФ	+
ст. 106 УК РФ	
ст. 122 к РФ	
ст. 124 УК РФ	
Виды медицинской помощи, предусмотренные на догоспитальном этапе при катастрофах	
любая, которую можно использовать	
квалифицированная	
первая медицинская, доврачебная, первая врачебная	+
специализированная, квалифицированная	
Виды медицинской сортировки на этапах медицинской эвакуации	
диагностическая	
прогностическая	
внутренняя	
эвакуационно-транспортная, внутриспунктовая	+
ВИЧ погибает	
При нагревании до 45 градусов в течении 20 минут	
При дезинфекции, в соответствующем режиме	+
В замороженной крови, сперме	
ВИЧ-инфекция не передается при	
Рукопожатии	+
Использовании одного шприца, несколькими лицами	

от инфицированной матери плоду	
ВИЧ-инфицированный пациент, получающий только консультативные услуги	
должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе	
не должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе	+
Внелёгочные проявления пневмонии у больных пожилого и старческого возраста	
лихорадка	+
боли в животе	
гипергликемия	
ангинозные боли	
Воздушный метод стерилизации применяется для изделий из	
металла	+
хлопчатобумажной ткани	
пластмасса	
Возможные осложнения инфаркта миокарда	
заболевания органов ЖКТ	
кардиогенный шок	+
пороки сердца	
Выведение нижней челюсти при ИВЛ	
предупреждает регургитацию желудочного содержимого	
устраняет западение языка, восстанавливает проходимость ДП (гортани и трахеи)	+
создает герметичность между ртом оказывающего помощь и ртом пациента	
Высока вероятность инфицирования ВИЧ при	
половом контакте с ВИЧ-инфицированным	+
проживании в одной квартире с ВИЧ-инфицированным	
посещение спортивно- оздоровительных комплексов	
Гериатрия — это наука, изучающая	
особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте	+
закономерности старения организма	
профилактику старения	
Геронтология – это наука, изучающая	
диагностику, лечение и предупреждение возрастной патологии	
закономерности старения живых организмов	+
возникновение заболеваний пожилого и старческого возраста	
Главный признак вывиха	
Боль	
Изменение формы сустава	
Отёк сустава	
Невозможность движения в суставе	+
Гомеорез — это	
закономерные возрастные изменения организма	+
незакономерные возрастные изменения организма	
изменение темпа старения	
Группы риска инфицирования ВИЧ	
потребители инъекционных наркотиков	+
больные, получающие кортикостероиды	
пациенты, подлежащие диагностическим обследованиям	
Дезиконт (индикаторные полоски) используют для	
Определения концентрации дезинфицирующего средства	+
определение стерильности ИМН	
Определения % соотношения дезинфицирующего средства и воды	
Дезинсекция это	
Борьба с паразитирующими на людях и предметах их обихода членистоногими	+
Борьба с грызунами в лечебном учреждении	
Дератизация это	
Борьба с паразитирующими на людях и предметах их обихода членистоногими	
Борьба с грызунами в лечебном учреждении	+
Дереализация — это	
восприятие без реального объекта	
искажение восприятия объектов окружающего мира	+
нарушение узнавания предметов	
Деформирующий остеоартроз - это	
воспалительное заболевание суставов	

дегенеративное заболевание суставов	+
Диета является основой лечения сахарного диабета	
всех форм	+
только 1 типа	
только 2 типа лёгкого течения	
только тяжёлых и средней тяжести форм	
Длительное угнетённо-подавленное настроение с мрачной оценкой прошлого и настоящего и пессимистическими взглядами на будущее называется	
эйфорией	
депрессией	+
дисфорией	
манией	
Длительность инкубационного периода при вирусном гепатите "А"	
1—7 дней	
7—14 дней	
7—45 дней	+
Длительность инкубационного периода при вирусном гепатите "В"	
1—7 дней	
7—45 дней	
45—180 дней	+
Длительность инкубационного периода при дизентерии	
1—7 дней	+
7—14 дней	
7—35 дней	
Длительность инкубационного периода при дифтерии	
1—7 дней	+
1 -- 10 дней	
7—45 дней	
Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо соблюдать следующие условия	
применение моющих средств бытового назначения	
наличие лака на ногтях	
отсутствие на руках ювелирных украшений	+
Для защиты щитовидной железы при авариях на радиационно опасных объектах применяют	
тарен	
промедол	
этаперазин	
йодистый калий	+
Для лиц пожилого и старческого возраста характерны все перечисленные изменения в пищеварительном тракте, кроме	
повышения желудочной секреции	+
понижения желудочной секреции	
понижение тонуса желчного пузыря	
гипотония кишечника	
склонность к запорам	
Для остеоартрозов характерны следующие клинические проявления	
боль в суставах усиливается в покое, чаще поражаются лучезапястные суставы	
боль в суставах возникает при нагрузке, чаще поражается тазобедренный и коленный суставы, болезнь быстро прогрессирует	+
болезнь медленно прогрессирует	
Для перелома основания черепа характерен симптом	
"очков	+
Кернига	
Брудзинского	
Для проведения искусственной вентиляции легких необходимо в первую очередь	
Голову пострадавшего запрокинуть с выдвиганием вперёд нижней челюсти	+
Закрывать нос пострадавшему	
Сделать пробное вдувание воздуха	
Нажать на грудину	
Для промывания желудка необходимо приготовить чистую воду с температурой	
12 градусов С	
18-20 градусов С	+

24-36 градусов С	
Для профилактики аспирации рвотных масс больному следует придать положение	
На спине	
На боку	+
На животе	
Полусидячее	
Для профилактики педикулеза и чесотки осмотрам подлежат дети домов ребенка, детских домов, школ интернатов, школ, ДДУ, загородных детских учреждений	
еженедельно	+
2 раз в месяц	
1 раз в месяц	
1 раз в год	
Для ревматоидного артрита характерно	
утренняя скованность в суставах	
боли в суставах, особенно по ночам	+
припухание в области суставов	
постепенное развитие деформации суставов	
Для сотрясения головного мозга характерно	
кома	
ретроградная амнезия	+
антероградная амнезия	
конградная амнезия	
Для стерилизации применяются средства, обладающие	
статическим действием	
вирулицидным действием	
спороцидным действием	+
фунгицидным действием	
родентицидным действием	
Для удушья характерны	
Сильная головная боль	
Сильный кашель, синюшность и отёчность лица	+
Беспокойство, потливость, дрожь	
Боли в сердце	
Для уменьшения болевого синдрома при артрите применяются	
нестероидные противовоспалительные средства	+
антигистаминные препараты	
массаж	
Для электротравм 1 степени тяжести характерно	
потеря сознания	
расстройства дыхания и кровообращения	
судорожное сокращение мышц	+
клиническая смерть	
Для язвенной болезни 12-перстной кишки не характерно	
боли в эпигастральной области после приёма пищи	+
запоры	
изжога	
обострение в осенне-весенний период	
перфорация язвы	
До прихода врача больному с желудочно-кишечным кровотечением нужно	
поставить очистительную клизму	
положить на живот горячую грелку	
положить на эпигастрий пузырь со льдом	+
Доврачебная неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы	
ингаляция беротока или сальбутамола (1 доза)	+
ингаляция кислорода	
инъекция зуфиллина 2,4 % - 10,0	
Естественные пути передачи ВИЧ-инфекции	
половой	+
воздушно-капельный	
трансфузионный	
Заболевания, наиболее затрудняющие проведение спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций	

простудные заболевания	
особо опасные инфекции	+
сердечно-сосудистые заболевания	
заболевания кожи и подкожной клетчатки	
Задержка мочеиспускания у лиц пожилого и старческого возраста часто связана с	
гломерулонефритом	
пиелонефритом	
циститом	
доброкачественной гиперплазией предстательной железы	+
Иммобилизация при подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника	
петля Глиссона	
не требуется	
ватно-марлевый воротник	+
працевидная повязка	
Инфекционный изолятор приемного отделения служит для	
санитарной обработки пациентов	
госпитализации пациентов с подозрением на инфекционное заболевание	+
оказание неотложной помощи	
Искусственные пути передачи ВИЧ-инфекции	
вертикальный	
Через медицинские отходы, не прошедшие дезинфекцию	+
аэрогенный	
К абсолютным признакам перелома костей относится	
Боль	
Ограничение движений в суставах	
Патологическая подвижность кости	+
Наличие гематомы	
К антисептикам относится	
лизанин	+
хлорамин	
арбидол	
К вербальным средствам общения относится	
поза	
речь	+
взгляд	
жест	
К методам временной остановки кровотечения относятся	
перевязка сосуда в ране	
перевязка сосуда на протяжении	
наложение кровоостанавливающего жгута	+
введение кровоостанавливающих средств	
К причинам гипогликемии не относятся	
обильная еда	+
избыточные дозы инсулина или таблеток	
опоздание с приёмом пищи или его пропуск	
недостаточная калорийность пищи	
незапланированная или слишком интенсивная физическая нагрузка	
слишком много алкоголя, особенно на голодный желудок	
К противопедикулезным препаратам относятся	
лизанин	
сульфохлаорантил	
эмульсия Медифокс Супер	+
К ранним симптомам биологической смерти относится	
помутнение роговицы	+
трупное окоченение	
трупные пятна	
расширение зрачков	
деформация зрачков	
К субъективным методам сестринского обследования относятся	
измерение АД	
определение отеков	
расспрос пациента	+

Какое из ОРВИ имеет наиболее тяжёлое клиническое течение и чаще вызовет осложнения у лиц пожилого и старческого возраста	
грипп	+
парагрипп	
риновирусная инфекция	
аденовирусная инфекция	
Какую помощь может оказать медицинская сестра родственникам пациентов, страдающих психическими заболеваниями	
дать рекомендацию по питанию	
обучение по уходу за пациентом и осуществлению контроля за приемом медикаментов	+
корректировать лечение пациента	
Камерную дезинфекцию вещей проводят при	
платяном педикулёзе	+
головном педикулёзе	
лобковом педикулёзе	
Категории лиц, не имеющих право на отказ от медицинского вмешательства	
больные инфекционными эпидемиологическими болезнями	+
больные СПИДом	
больные, страдающие онкологическими заболеваниями	
Квалифицированная медицинская помощь – это	
оказание помощи по жизненным показаниям	
оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным	+
само- и взаимопомощь, помощь спасателей	
полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами	
Количество уровней в иерархии основных жизненноважных потребностей по Маслоу	
три	
пять	+
десять	
Коллективные средства защиты	
больницы	
формирования гражданской обороны	
фильтрующие противогазы	
убежища и укрытия	+
Кратность обследования медицинского работника на антитела к ВИЧ после аварийной ситуации	
только после аварийной ситуации	
после аварийной ситуации и далее, через 1;3;6 месяцев	
После аварийной ситуации и далее, через 3;6;12 месяцев	+
Лаково-красная моча – признак	
синдрома длительного сдавления	+
асфиксии	
перегревания	
переохлаждения	
Легочные проявления пневмонии у больных пожилого и старческого возраста	
артралгии	
одышка	+
кровохарканье	
дисфагия	
Лекарственные препараты для профилактики ВИЧ-инфекции	
Ацикловир	
Циклоферон (меглюмин акридоацетат)	
Лопинавир (ритонавир)	+
Лихорадка, боль в поясничной области, лейкоцитурия, бактериурия, наблюдаются при	
пиелонефрите	+
мочекаменной болезни	
хронической почечной недостаточности	
раке предстательной железы	
Максимальное время, в течение которого может развиваться анафилактический шок	
5	
15	
30	+
1	

Медицинская психология не изучает	
деятельность медицинского персонала	
психологию больных	
роль психических факторов в возникновении психосоматических заболеваний	
психологический климат учреждений	+
Медицинская помощь в первую очередь оказывается	
пострадавшим с повреждениями с нарастающими расстройствами жизненных функций	+
пострадавшим с повреждениями несовместимым с жизнью	
легко пострадавшим	
Медицинская помощь инвалидам ВОВ предоставляется	
бесплатно	+
с 50% скидкой	
Медицинский работник, инфицированный ВИЧ	
Может работать в лечебном учреждении, если он не проводит манипуляций	+
Не может работать в лечебном учреждении, даже если он не проводит манипуляций	
Медицинской сортировкой называется	
метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях	+
выделение пораженных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи	
распределение потока пострадавших на «ходячих» и «носиловых»	
распределение пораженных на группы по возрастному признаку и полу	
Мероприятия по профилактике профессионального инфицирования медработников	
Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима	+
соблюдение противопожарной безопасности	
обучение персонала тактики действия при ГО	
Метод, наиболее информативный при подозрении на язвенную болезнь 12-перстной кишки	
pH — метрия	
фиброгастроскопия	+
желудочное зондирование	
биопсия	
УЗИ	
Моюще-дезинфицирующее средство используют для	
обработки рук медицинского персонала	
Дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментария	+
Дезинфекции и стерилизации инструментария	
Мутность мочи обусловлена содержанием большого количества	
бактерий	+
цилиндров	
эритроцитов	
На 1 этапе экстренную медицинскую помощь пострадавшим оказывают	
бригада скорой помощи	+
медицинские работники поликлиники	
бригады специализированной медицинской помощи	
На ВИЧ-инфекцию обследуются обязательно	
пенсионеры	
больные с поражениями легких	
доноры крови и органов	+
На локтевой и коленный суставы накладывается повязка	
Циркулярная	
Спиральная	
8	
«Черепашья»	+
На обожженную поверхность накладывают	
сухую асептическую повязку	+
повязку с раствором чайной соды	
повязку с синтомициновой эмульсией	
Наблюдение за соблюдением двигательной активности пациентом обязанность	
санитарки	
врача	
медицинской сестры	+

Наиболее легкая степень умственной отсталости	
имбицильность	
дебильность	+
идиотия	
Наиболее опасное проявление немедленной аллергии	
Крапивница	
Бронхоспазм	
Анафилактический шок	+
Отек Квинке	
Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений	
Наложение жгута	
Тампонада раны	
Тугая давящая повязка	+
Закрутка	
Наиболее частые симптомы гипертонической болезни у старых людей	
общая слабость, шум в голове, шаткая походка	+
отсутствие общей слабости, частые головные боли	
постоянные головные боли, устойчивая походка	
Наиболее частыми формами инфаркта миокарда у стариков являются	
болевая	
безболевая	+
гастралгическая	
Наибольшее значение в уменьшении безвозвратных потерь придать своевременному оказанию	
Первой медицинской и доврачебной помощи	+
Доврачебной и врачебной помощи	
Врачебной и квалифицированной помощи	
Специализированной помощи	
Наиважнейший вид медицинской помощи в фазе изоляции	
Первая медицинская помощь	+
Специализированная помощь	
Первая врачебная помощь	
Квалифицированная врачебная помощь	
Наказания, не относящиеся к дисциплинарной ответственности	
замечание	
выговор	
строгий выговор	+
лишение стимулирующих выплат	
Наложение теплоизолирующей повязки больным с отморожениями требуется	
в дореактивном периоде	+
в реактивном периоде	
Нарушению уродинамики у пожилых людей способствует	
атония мочевых путей, гиподинамия, заболевания предстательной железы	+
нарушение иммунитета	
нарушение метаболизма печени	
замедление всасывания в ЖКТ	
Независимое сестринское вмешательство при недержании мочи лиц пожилого и старческого возраста	
увеличить прием жидкости	
применение средств гигиенического ухода	+
провести катетеризацию мочевого пузыря	
Независимое сестринское вмешательство при приступе стенокардии	
введение адреналина, кордиамина	
холод на область сердца	
прекращение физических нагрузок	+
постановка пиявок	
Необходимым условием для госпитализации в психиатрический стационар (в плановом порядке) является	
наличие паспорта	
наличие направления	
информированное добровольное согласие пациента на госпитализацию и медицинское вмешательство	+

Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского работника являются	
сообщение на предыдущее место работы	
заключение трудового договора	+
наличие испытательного срока	
Неотложная помощь при тяжелой электротравме, приведшей к остановке сердца	
освободить пострадавшего от действия тока	
выполнить ИВЛ, прекардиальный удар, непрямой массаж сердца	+
инъекция адреналина	
дать вдыхать пары нашатырного спирта, вызвать бригаду скорой помощи	
Неотложная помощь при язвенном кровотечении	
промывание желудка	
холод на эпигастральную область	+
введение обезболивающих препаратов	
Неотложная помощь при гипертермическом синдроме	
холод	+
тепло	
кордиамин	
новокаин	
анальгин	
Неотложная помощь при носовом кровотечении	
Запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду	
Нагнуть голову больного вперед, положить холод на переносицу, сделать тампонаду	+
Немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, сделать тампонаду	
Приложить тепло к переносице	
Неотложная помощь при ожогах	
асептическая повязка	+
димедрол	
грелка	
Неотложная помощь при остром отравлении через желудочно-кишечный тракт	
промыть желудок 10-12 л. воды, дать активированный уголь 1 гр. внутрь	+
вызывать рвоту	
дать слабительное	
поставить клизму	
Неотложная помощь при отравлениях неприжигающими ядами	
введение антигистаминных препаратов	
промывание желудка	+
уложить больного, вызвать скорую помощь	
Неотложная помощь при травматическом шоке	
вызов скорой помощи	
введение седативных препаратов	
остановка кровотечения	+
эфедрин	
Непрямой массаж сердца проводится	
на границе верхней и средней трети грудины	
на границе средней и нижней трети грудины	+
на 1см выше мочевидного отростка	
Несомненный признак биологической смерти	
Отсутствие дыхания	
Отсутствие сердцебиения	
Расширение зрачков	
Помутнение роговицы	+
Нормативно-правовая база медицинского права включает в себя	
уголовный кодекс	
ФЗ об основах охраны здоровья граждан	+
арбитражное право	
ФЗ о системе государственной службы РФ	
Обморок – это	
проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания	
аллергическая реакция	

потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса	+
Общение в деятельности медицинского работника – это	
обмен информацией	
обмен эмоциями	
обмен информацией и эмоциями	+
Обязательному ФЛГ-обследованию 2 раза в год подлежат	
лица, находящиеся в тесном бытовом или профессиональном контакте с источниками туберкулезной инфекции	+
пациенты с онкологическими заболеваниями	
больные сахарным диабетом	
мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы	
лица, проживающие совместно с беременными женщинами и новорожденными	
Обязательными условиями при проведении непрямого массажа сердца является	
положение рук реанимирующего на границе средней и нижней трети грудины	+
наличия валика под лопатками	
наличие двух реанимирующих	
Одной из основных задач профессиональной деятельности медицинской сестры является	
своевременная диагностика и лечение	
уточнение причин заболевания	
восстановление здоровья и реабилитации пациентов	+
Оказывая помощь при ожоге первой степени, в первую очередь необходимо обработать обожжённую поверхность	
96% этиловым спиртом	
Холодной водой до онемения	+
Стерильным новокаином	
Жиром	
Окклюзионная повязка применяется при	
венозных кровотечениях	
открытом пневмотораксе	+
ранение мягких тканей головы	
после пункции сустава	
Окклюзионную повязку накладывают при	
Закрытом переломе ребер	
Открытом пневмотораксе	+
Ушибе грудной клетки	
Переломе ключицы	
Окончательная остановка кровотечения производится	
наложением жгута	
наложением жжима в ране	
перевязкой сосуда в ране	+
прижатием сосуда на протяжении	
Опасное легочное кровотечение возникает при	
Бронхопневмонии	
Бронхиальной астме	
Туберкулезе легких	+
Остром бронхите	
Оптимальное время оказания медицинской помощи с момента травмы	
1	
2	
5-30 минут	+
Оптимальный срок оказания первой медицинской помощи (ПМП) после травмы	
0,5	+
1	
1,5	
2	
Оптимальным сроком оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях является	
30	+
1	
2	
6	
Организация сестринского процесса состоит из	

пяти этапов	+
шести этапов	
четырёх этапов	
Ослабление памяти — это	
гипомнезия	+
парамнезия	
амнезия	
Осложнением обострения хронического пиелонефрита в пожилом и старческом возрасте является	
хронический гломерулонефрит	
артериальная гипотензия	
бактериальный шок	+
острый панкреатит	
Осложнениями язвенной болезни 12-перстной кишки являются все указанные, кроме	
кровотечения	
рубцового стеноза	
перфорации	
малигнизации	
перивисцерита	+
Осмотры на педикулёз в очаге должны проводиться не реже	
1 раза в день	
1 раза в 7 дней	
1 раза в 10 дней	+
Основная проблема старости	
консерватизм	
тревога	
одиночество	+
Основной признак торпидной фазы шока	
рвота	
асфиксия	
анизокария	
снижение АД	+
Основные задачи медицинской службы медицины катастроф	
лечебно-профилактические и гигиенические мероприятия	
сохранение здоровья населения, оказание всех видов медицинской помощи с целью спасения жизни, снижение психоэмоционального воздействия катастроф, обеспечение санитарного благополучия в зоне ЧС и др	+
подготовка медицинских кадров, материально-техническое обеспечение больниц в зоне ЧС	
сохранение личного здоровья медицинских формирований, эвакуация лечебных учреждений вне зоны ЧС	
Основные факторы, обуславливающие здоровья и долголетия	
дата рождения, наличие семьи	
социально-экономические условия	
генетический фактор, окружающая среда, образ жизни	+
взаимоотношения в семье	
Основным препаратом для лечения больных сахарным диабетом 1 типа является	
манинил	
глюренорм	
инсулин	+
диабетон	
Основными инволютивными изменениями в поджелудочной железе являются все перечисленные, кроме	
атрофия поджелудочной железы	
изменения протоковой системы	
изменения кровотока в сосудах	
некроза поджелудочной железы	+
Основными функциями приемного отделения психиатрического стационара является	
прием и регистрация пациентов	
врачебный осмотр пациента	
оказание экстренной помощи	
санитарно-гигиеническая обработка пациентов	
всё выше перечисленное	+

Основоположники отечественной теории старения	
Н.Н. Мечников, И.П. Павлов. А.А. Богомолец	+
Бехтерев, Вишневский, Мудров	
Пирогов, Гааз, Сеченов	
Особенность сахарного диабета у пациентов пожилого и старческого возраста	
симптомы заболевания быстро нарастают	
симптомы не выражены; чаще уменьшение массы тела	+
течение относительно доброкачественное	
аппетит часто резко повышен	
Отеки почечного происхождения появляются	
утром на ногах	
утром на лице	+
вечером на ногах	
вечером на лице	
Отрицательные последствия длительного пребывания больных пожилого возраста в постели	
опасность развития застойных явлений в лёгких	
	+
снижение аппетита	
нарушение памяти и внимания	
Охлаждение ожоговой поверхности холодной водой показано	
в первые минуты после ожога в течении 10-15 минут	+
не показано	
при ожоге II степени	
Парентеральный способ внедрения лекарств в организм	
Ингаляционный	+
Пероральный	
Сублингвальный	
Ректальный	
Пациента с большой кровопотерей транспортируют	
сидя	
полусидя	
лежа с приподнятым головным концом на носилках	
лежа с опущенным головным концом на носилках	+
Пенсия за выслугу лет называется	
трудовой	+
социальной	
Первая медицинская помощь при ранении наружной сонной артерии	
пальцевое прижатие	+
наложение давящей воздухопроницаемой повязки	
обезболивание	
прошивание раны	
Первая медицинская помощь при ранениях вен шеи	
пальцевое прижатие	
наложение давящей воздухопроницаемой повязки	+
обезболивание	
прошивание раны	
Первая помощь при солнечном ударе	
ИВЛ и непрямой массаж сердца	
перенести пострадавшего в прохладное место, защищенное от солнца, приложить холод к голове	+
подкожное введение кордиамина или кофеина	
Первичный реанимационный комплекс включает	
восстановление проходимости дыхательных путей, ИВЛ методом изо рта в рот, наружный массаж сердца	+
аппаратная ИВЛ, открытый массаж сердца	
регистрацию ЭКГ, введение адреналина внутрисердечно, дифибрилляцию	
Первоочередное мероприятие, проводимое пострадавшему с открытым пневмотораксом	
обезболивание	
дренирование плевральной полости	
интубация трахеи	
окклюзионная повязка	+
Первым видом оказания медицинской помощи пострадавшим считается	

первая медицинская доврачебная помощь	
первая медицинская помощь (само- и взаимопомощь)	+
специализированная медицинская помощь	
квалифицированная медицинская помощь	
Первым проявлением синдрома умеренных когнитивных расстройств является	
головокружение	
тошнота	
прогрессирующее ухудшение памяти	
нарушение равновесия	+
Первыми признаками развивающегося травматического шока являются	
психомоторное возбуждение, неадекватная оценка своего состояния	+
судороги, апатия, потоотделение	
гиперемия, сухость кожи, пенистое отделение изо рта, галлюцинации	
Планирование сестринского процесса происходит на	
втором этапе	
первом этапе	
третьем этапе	+
Плательная вошь во внешней среде без пищи живет при низкой температуре	
до -0 суток	+
до - месяца	
до - года	
По закону РФ «О психиатрической помощи и гарантии прв граждан при её оказании» не	
добровольная госпитализация в психиатрический стационар осуществляется если больной	
отказывается от лечения	
конфликтует с родственниками и соседями	
опасен для себя и окружающих	+
высказывает бредовые идеи	
Под моральным вредом понимают всё, кроме	
нравственные страдания	
деловая репутация	
осуществление эвтаназии	+
раскрытие врачебной тайны	
Подготовка больного к отбору мокроты	
почистить зубы и прополоскать полость рта кипяченой водой	+
промыть желудок	
не требует подготовки	
надеть на больного резиновые перчатки	
опорожнить кишечник	
Показание к наложению жгута	
Венозное кровотечение	
Артериальное кровотечение	+
Внутреннее кровотечение	
Кровотечение в просвет полого органа	
Показателями эффективной реанимации являются	
появление пульса на сонных артериях, сужение зрачков и появление их реакции на свет	+
расширенные зрачки	
правильный массаж сердца	
Понижение чувствительности к внешним раздражителям — это	
анестезия	
гиперстезия	
гипестезия	+
Понятие "врачебная тайна" предусматривается	
трудовым кодексом	
конституцией РФ	
законом об адвокатской деятельности	
ФЗ об основах охраны здоровья граждан	+
законом о полиции	
Последовательность оказания помощи при сдавливании конечности	
наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, асептическая повязка, иммобилизация, наружное охлаждение конечности, инфузия	+
асептическая повязка, наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, иммобилизация, наружное охлаждение конечности, инфузия	

освобождение сдавленной конечности, обезболивание, инфузия, наложение жгута, иммобилизация	
иммобилизация, обезболивание, наложение жгута, инфузия	
Последовательность появления симптомов при острой остановке кровообращения	
выключение сознания, появление судорог, расширение зрачков	+
расширение зрачков, появление судорог, выключение сознания	
появление судорог, расширение зрачков, отключения сознания	
Права медицинского работника	
на бесплатное санаторно-курортное лечение	
бесплатного проезда в общественном транспорте	
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет работодателя	+
Права пациента	
на составление схемы лечения	
на выбор палаты в медицинской организации	
на получение информации о состоянии своего здоровья	+
на составление меню рациона питания	
Право на получение двух пенсий предоставляется	
гражданам, достигшим пенсионного возраста и ставшими инвалидами в следствии общего заболевания	
участникам ВОВ, ставшими инвалидами в следствии общего заболевания	+
Правовые требования к занятию индивидуальной медицинской деятельностью	
наличие медицинского образования, стажа, сертификата	
наличие высшего образования, лицензии, стажа	
наличие лицензии, сертификата, медицинского образования	+
При агрессивном поведении пациента с психическими заболеваниями необходимо	
применить меры физического стеснения	
не обращать внимание на пациента	
сообщить лечащему врачу об изменении состояния пациента	+
При внезапном снижении объема циркулирующей крови появляются	
бледность, гипертензия, напряженный пульс, головокружение	
цианоз, гипотензия, аритмия, тахипноэ, слабость, потеря сознания	
бледность, головокружение, слабость, гипотензия, пульс слабого наполнения, аритмия	+
При кормлении ослабленных пациентов медицинской сестре необходимо	
прибегать к помощи других пациентов	
оставлять пищу для самостоятельного приема	
При лечении ревматоидного артрита назначают следующие препараты быстрого действия	
нестероидные противовоспалительные средства	+
противомалярийные препараты	
метотрексат	
декарис	
При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у взрослого должен быть	
1-2 см	
2-4 см	
4-5 см	+
6-8 см	
При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у ребенка должен быть	
1-2 см	
2-4 см	+
4-5 см	
6-8 см	
При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение	
Полусидячее	
Ровное горизонтальное	
Горизонтальное с приподнятой головой	
Горизонтальное с приподнятыми ногами	+
При отморожении первая помощь состоит в	
наложении термоизолирующей повязки	+
погружении в горячую воду	
растирании снегом и шерстью	

наложении масляно - бальзамической повязки	
При оценке состояния пациента после падения не учитываются факторы	
боль	
отеки	
лабораторные показатели	+
диапазон произвольных движений	
При пальцевом прижатии сонной артерии её прижимают к	
Ребру	
Поперечному отростку VI шейного позвонка	+
Середине грудино-ключично-сосцевидной мышцы	
Ключице	
При пищевых токсикоинфекциях оказание неотложной помощи начинают	
с введения антибиотиков	
с забора подозрительных пищевых продуктов на исследование	
с промывания желудка через зонд	+
с введения глюкозы — солевых растворов	
При попадании крови или других биологических жидкостей при аварийной ситуации на слизистые глаз, можно использовать	
Чистую воду	+
3% раствор борной кислоты	
раствор хлоргексидина водный	
При утоплении в холодной воде продолжительность клинической смерти	
укорачивается	
удлинняется	+
не меняется	
При уходе за пожилыми пациентами с деменцией медицинская сестра должна	
следить за своевременным приемом лекарств, пищи, проведением гигиенических мероприятий	+
рекомендовать ежедневные прогулки	
оставлять без присмотра	
При хронических соматических заболеваниях изменение характера	
возможно	+
невозможно	
При хроническом холецистите в стадии обострения боли иррадиируют в	
левое плечо, левую руку	
нижнюю челюсть, за грудину	
правое бедро, промежность	
левую подвздошную область	
правое плечо, правую лопатку	+
При черепно-мозговой травме противопоказан применение	
морфина	+
противостолбнячной сыворотки	
антибиотиков	
противорвотных	
Признак артериального кровотечения	
Медленное вытекание крови из раны	
Темно-вишнёвый цвет крови	
Сильная пульсирующая струя крови	+
Образование гематомы	
Признаками клинической смерти являются	
нитевидный пульс, цианоз, агональное дыхание	
потеря сознания, нитевидный пульс, цианоз	
потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, остановка дыхания, расширение зрачков	+
потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии	
Признаки лёгочного кровотечения	
кровь алая, пенистая	
кровь выделяется с кашлевыми толчками	+
кровь тёмная, выделяется сгустками типа "кофейной гущи"	
Принципом ухода за ногами при сахарном диабете не является	
контроль гликемии	
осмотр и пальпация ног	

уход за ногами	
выбор носков, обуви	
двигательный покой	+
Принципы лечения больного туберкулезом	
промывание желудка	
трансфузионная терапия	
многокомпонентная химиотерапия	+
терапия холодом	
искусственная вентиляция легких	
Принципы лечения чесотки	
втирание препарата тампоном или салфеткой	
втирание препарата лицам старше трех лет в весь кожный покров	
втирание препарата в вечернее время на 8--0 часов	+
контроль излеченности проводить после - недели лечения	
Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме	
Начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока	
Освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию	+
Закопать пострадавшего в землю	
Облить водой	
Принципы оказания помощи при химических ожогах	
По возможности нейтрализовать вещества, вызывающие ожог, промыть холодной водой	+
Промывание холодной водой в течение часа	
Анальгетики, начиная со второй степени – сухие асептические повязки без обработки обожжённой поверхности	
Присыпать тальком	
Приобретённое слабоумие -- это	
идиопатия	
деменция	+
имбецильность	
Приоритетная проблема пациента при почечной колике	
тошнота	
боль в пояснице	+
лихорадка	
одышка	
Приступ стенокардии купируют	
Парацетамолом	
Нитроглицерином	+
Папаверином	
Дибазолом	
Приступ стенокардии у пожилых людей может проявляться всеми перечисленными симптомами, кроме	
загрудинных болей	
диспепсии	+
пароксизма одышки	
головокружения	
пароксизмального нарушения ритма	
Причина учащения приступов почечной колики у лиц пожилого и старческого возраста	
переохлаждение	
переутомление	
сужение мочеточников	
миграция камня из-за расширения мочеточников	+
Проблемы при пиелонефрите у лиц пожилого и старческого возраста	
Недомогание, утомляемость, небольшое повышение температуры тела	+
анурия	
снижение АД	
Провести профилактику ВИЧ-инфекции медработнику после аварийной ситуации с ВИЧ-инфицированным пациентом антиретровирусными препаратами следует в период, не позднее	
72	+
1	

24	
Противопоказанием для проведения реанимации является	
инсульт	
неизлечимое заболевание в терминальной стадии	+
инфаркт миокарда	
Профилактика обострения хронического пиелонефрита у лиц пожилого и старческого возраста	
увеличение физической нагрузки	
обливание холодной водой	
приём горячей ванны	
исключение переохлаждения	+
Профилактика падений лиц пожилого и старческого возраста в стационаре включает	
размещение пациентов в палатах ,находящихся рядом с сестринским постом	
постоянное наблюдение, оказание помощи при перемещении, обеспечение удобной обувью и достаточным освещением	+
ограничение самостоятельного перемещения пациента по отделению	
Профилактические флюорографические осмотры 1 раз в год должны проходить	
Вич — инфицированные	
Работники родильных домов	
Лица. проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания	+
Психологическая помощь медицинской сестрой пациенту пожилого возраста в депрессивном состоянии заключается	
изоляция	
гиперопеки	
психотерапевтической беседе	+
Пути заражения вирусным гепатитом "А"	
водный	+
воздушно - капельный	
половой	
парентеральный	
Пути заражения вирусным гепатитом "В"	
фекально- оральный	
воздушно - капельный	
половой	+
контактно - бытовой	
Пути заражения дизентерией	
воздушно — капельный	
половой	
контактно — бытовой	+
парентеральный	
Пути передачи вирусных гепатитов В, С	
Парентеральный путь	+
Воздушно-капельный путь	
фекально-оральный	
трансмиссивный	
Пути передачи ВИЧ-инфекции	
Половой путь	+
контактно- бытовой	
Воздушно-капельный путь	
фекально-оральный путь	
Развитие артериальной гипертонии у пожилых людей связано	
с наследственностью	
с особенностями водного режима	
с атеросклеротическим поражением аорты	+
Реанимацию обязаны проводить	
только врачи и медсестры реанимационных отделений	
все специалисты, имеющие медицинское образование	+
все взрослое население	
Реанимация показана	
в каждом случае смерти больного	
только при внезапной смерти молодых больных и детей	
при внезапно развивающихся терминальных состояниях	+

Реанимация это	
раздел клинической медицины, изучающей терминальные состояния	
отделение многопрофильной больницы	
практические действия, направленные на восстановление жизнедеятельности	+
Результатом правильного наложения жгута при кровотечении является	
прекращение кровотечения, отсутствие пульса, бледность кожи	+
уменьшение кровотечения, сохранение пульса, увеличение цианоза	
прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза	
уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи	
С целью профилактики гриппа и других ОРВИ у лиц пожилого и старческого возраста проводятся	
профилактические прививки	+
приём антигистаминных препаратов	
приём антибиотиков	
Сангвиник является типом темперамента	
бурным, порывистым, резким, горячим	
спокойным, вялым, медлительным, устойчивым	
живым, подвижным, отзывчивым, эмоциональным	+
Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий	
по профилактике экзогенных интоксикаций	
направленных на пропаганду «Здорового образа жизни»	
по профилактике внутрибольничной инфекции	+
Сахарный диабет у лиц пожилого и старческого возраста обусловлен	
бактериальная инфекция	
недостаток инсулина	
снижение чувствительности тканей к инсулину	+
Сердечная недостаточность обусловлена	
уменьшением сократительной способности миокарда	+
уменьшением объёма циркулирующей крови	
падением сосудистого тонуса	
уменьшением кровоснабжения мозга	
снижением артериального давления	
Симптомы почечной колики	
боли внизу живота	
понос	
боли в поясничной области	+
Симптомы сдавления головного мозга	
зрачок на стороне гематомы сужен, парезы и параличи на противоположной стороне	+
потеря сознания на 30 минут, тошнота, головная боль	
потеря сознания на 4 часа, рвота, головокружение	
потеря сознания на 2 суток, симптом «очков»	
Симптомы, характерные для гипогликемической комы	
усиление потоотделения, судороги	+
сухость кожи, снижение тонуса мышц	
сухость кожи, запах аммиака изо рта, дыхание Куссумала	
гиперемия слизистых оболочек, произвольные дефекация и мочеиспускание, запах алкоголя изо рта	
развитие парезов и параличей	
Симптомы, характерные для кетоацидотической комы	
усиление потоотделения, судороги	
сухость кожи, снижение тонуса мышц	+
сухость кожи, запах аммиака изо рта, дыхание Куссумала	
гиперемия слизистых оболочек, произвольные дефекация и мочеиспускание	
влажность кожных покровов, дрожь, возбуждение	
Состав «Аптечки аварийных ситуаций»	
70 % спирт этиловый , 5% спиртовой раствор йода, бактерицидный лейкопластырь, стерильный бинт, резиновые перчатки ,ножницы	+
70 % спирт этиловый, 5% спиртовой раствор йода, бактерицидный лейкопластырь, ножницы препараты выбора: или 0,05 % раствор марганцовокислого калия или 1 % раствор борной кислоты	

70 % спирт этиловый, 5% спиртовой раствор йода, стерильный бинт, резиновые перчатки, ножницы, препараты выбора: или 0,05 % раствор марганцовокислого калия или 1% раствор протаргола	
Социальная геронтология изучает	
предупреждение возрастной патологии	
особенности заболеваний в пожилом возрасте	
влияние условий жизни на процессы старения человека	+
Специализированная медицинская помощь – это	
оказание помощи по жизненным показаниям	
оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным	
само- и взаимопомощь, помощь спасателей	
полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами	+
Срок наблюдения очага педикулёза	
7	
10	
30	+
45	
Стадии эволюции сознания умирающего пациента	
смирение, тревога, гнев, отрицание	
отрицание, гнев, депрессия, смирение	+
гнев, смирение, тревога	
Старение — это процесс	
нарастающего повреждающего действия экзогенных факторов, ведущих к недостаточности физиологических функций организма	+
повреждение систем организма	
приспособление функций организма к изменённым условиям	
Старость — это	
снижение адаптационных возможностей	
результат действия экзогенных факторов	
закономерно наступающий заключительный этап жизнедеятельности человека	+
Столкновение интересов двух или нескольких людей называется	
конфликтом	+
стрессом	
переговорами	
Стремительно развивающийся шок	
Травматический	
Геморрагический	
Анафилактический	+
Гемотрансфузионный	
Табельные медицинские средства индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях	
ватно-марлевая повязка, изолирующий противогаз	
аптечка индивидуальная, индивидуальный перевязочный пакет, индивидуальный противохимический пакет	+
костюм противохимической защиты	
фильтрующий противогаз	
Тактика медицинской сестры по отношению к пациенту с деменцией	
своевременное проведение гигиенических процедур	
обеспечение мероприятий по снижению риска травматизма	+
проведение диагностических исследований	
Тактика оказывающего помощь на доврачебном этапе при ранении грудной клетки в случае, если из раны выступает ранящий предмет	
Удаление ранящего предмета, наложение тугая повязки	
Наложение повязки без удаления ранящего предмета	+
Удаление ранящего предмета, тугая тампонада раны, наложение повязки	
Наложение окклюзионной повязки	
Терминальные состояния - это	
обморок, коллапс, клиническая смерть	
предагония, агония, клиническая смерть	+
агония, клиническая смерть, биологическая смерть	
Типичная психосоциальная проблема лиц пожилого возраста	
отказ от участия в общественной жизни	
злоупотребление алкоголем	
одиночество	+

склонность к суициду	
Транспортировка больных с повреждением таза	
лежа на носилках, поза «лягушки»	+
в устойчивом боковом положении	
полусидя	
лежа на носилках с валиком под поясницей	
Транспортировка пострадавшего с сотрясением головного мозга осуществляется в положении	
горизонтальном	
с приподнятым головным концом	+
с опущенным головным концом	
Транспортируют пострадавшего с переломом ребер и грудины	
лежа на боку	
лежа на спине	
в положении сидя	+
Тройной прием по Сафару включает	
поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову	
освобождение от стесняющей одежды области шеи	
отгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта	+
Тяжелая форма сосудистой недостаточности	
обморок	
сердечная астма, отёк лёгких	
коллапс	+
У пожилых людей постепенно снижается	
оперативная память, абстрактное мышление	+
слух, зрение	
целостность восприятия	
Ультрафиолетовые лучи убивают микобактерии за	
2 – 3 секунды	
2 – 3 минуты	+
2 – 3 часа	
2 – 3 дня	
Установить верную последовательность действий медицинского работника при повреждении кожных покровов (укол, порез)	
немедленно снять перчатки, выдавить кровь из ранки, тщательно вымыть руки под проточной водой, обработать руки 70% спиртом, заклеить ранку бактерицидным лейкопластырем, использованные перчатки погрузить в дезинфицирующий раствор	
немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70% спиртом, смазать ранку 5% спиртовым раствором йода	+
немедленно снять перчатки, промыть под проточной водой, обработать руки 70% спиртом	
Уход за кожей, волосами является	
независимым вмешательством	+
взаимозависимым вмешательством	
зависимым вмешательством	
Фактор риска ИБС	
ревматизм	
порок сердца	
остеоартроз	
пневмосклероз	
гипертоническая болезнь	+
Факторы передачи гепатита «В»	
медицинский инструментарий	+
продукты питания	
воздух	
Формы острых аллергических реакций	
дерматит	
сыпь, зуд	
анафилактический шок	+
снижение температуры тела	
Хроническая почечная недостаточность развивается при хроническом	
пиелонефрите	+
гепатите	

панкреатите	
цистите	
Хронический бронхит у пожилых и лиц старческого возраста характеризуется	
кашлем с небольшим количеством слизисто-гноной мокроты	+
кашлем с обильным отделением мокроты	
общим недомаганием	
удовлетворительным самочувствием	
субфебрильной лихорадкой	
нормальной температурой	
Частота искусственных вдохов при ИВЛ у взрослых должна быть	
4-5 в минут	
12-16 в минуту	+
30-40 в минуту	
50-70 в минуту	
Частота искусственных вдохов при ИВЛ у детей должна быть	
4-5 в минут	
12-16 в минуту	
20 в минуту	+
60-80 в минуту	
Чесоточный клещ вне тела человека живет	
до 5 часов	
до 2 суток	
до 5 суток	+
до 2 недель	
Что не является субъектами медицинского права	
медицинский персонал	
пациент	
ЛПУ	
должностное лицо правоохранительных органов	+
Что такое деменция	
приобретенное слабоумие	+
слабоумие передающееся по наследству	
слабоумие в детском возрасте	
Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по	
гемодинамическим показателям	
эвакуационно-сортировочным признакам	+
возрастным показателям	
наличию транспортных средств	
Эмоциональное благополучие и комфорт предусматривает один из режимов	
больничный	
общий	
лечебно- охранительный	+
санитарный	