

## Наркология

Текст вопроса	Верный вариант
«Дезинфекция» – это уничтожение патогенных микроорганизмов, грибов, вирусов	+
спорообразующих микроорганизмов	
микробов в ране	
«Стерилизация» – это уничтожение вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов	+
патогенных бактерий	
микробов на поверхности	
инфекции	
Акт о появлении на работе в пьяном виде составляется на водителя при отсутствии алкотестора	
по распоряжению руководителя	
при отказе от проведения контроля трезвости	+
Алкоголизм - это хроническое заболевание, характеризующееся формированием патологического влечения к алкоголю	+
соматоневрологическими расстройствами	
нарушением психологической адаптации	
Алкогольный делирий возникает чаще всего	
в первые дни после окончания запоя	+
на высоте абстинентного синдрома	
в период завершения абстинентного синдрома	
Амнезия – это нарушение памяти	+
внимания	
мышления	
восприятия	
Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на уничтожение микробов в ране	+
предупреждение попадания микробов в рану	
полное уничтожение микробов и их спор	
стерильность	
Артериальный жгут накладывают максимум на	
0,5-1 час	+
1,5-2 часа	
6-8 часов	
3-5 часов	
Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране	
предупреждение попадания микробов в рану	+
полное уничтожение микробов и их спор	
стерильность	
Безопасная инъекция	
не наносит вред пациенту	+
появляется гематома	
проведение инъекции иглой с тупым концом	
Благоприятное воздействие, оказываемое личностью медицинского работника на психику пациента носит название	
терапевтическим общением	+
не терапевтическим общением	
Боль в месте перелома костей таза усиливается при надавливании на голову	

пятки	
крылья подвздошных костей	+
живот	
Боль за грудиной, иррадиирующая в левую руку и левую лопатку, – признак	
Приступа стенокардии	+
Желчной колики	
Почечной колики	
Приступа бронхиальной астмы	
Больной наркоманией может быть снят с учета после лечения при условии воздержания от употребления наркотиков	
1	
5	+
3	
Большая депрессивная триада включает	
замедление психических процессов, упадок настроения, идиотная заторможенность	+
булемия	
увеличение продолжительности сна	
диарея	
В кабинете анонимного лечения	
на обратившегося документация не заводится	
документация заводится по усмотрению обратившегося	
заводится амбулаторная карта без указания фамилии и адреса обратившегося	+
используются все формы регистрации	
В каких случаях водители при предрейсовом осмотре не допускаются к работе	
АД- 120 *80, АД -130 * 90	
при наличии остаточных явлений алкогольной интоксикации (похмельный синдром)	+
при показании анализатора паров в выдыхаемом воздухе 0,01 ‰	
В какой период заболевания больные СПИДом наиболее опасны для окружающих	
в инкубационный период	
в скрытом периоде (бессимптомная фаза)	+
в терминальной стадии	
В общей структуре смертности населения алкоголизм и заболевания связанные с ним занимают	
второе место	+
четвертое место	
десятое место	
В состав аптечки «Антиспид» входят	
5% раствор йода, 70 градусный этиловый спирт, вата, бинт, лейкопластырь	+
5% раствор йода, 70 градусный этиловый спирт, протаргол	
5% раствор йода, 70 градусный этиловый спирт, перманганат калия или борная кислота, протаргол, бинт, вата, пипетки, лейкопластырь, ножницы	
вата, бинт, пластырь, ножницы	
Виды ответственности медицинских работников	
дисциплинарная, уголовная	+
социальная	
гражданско-правовая	
экологическая	
ВИЧ поражает в первую очередь	
сердечно -сосудистую систему	
иммунную систему	+
дыхательную систему	
Во время коллапса кожные покровы	
бледные, сухие, теплые	
бледные, влажные, прохладные	+
гиперемированные, сухие	
гиперемированные, влажные	
Во флаконе разведено 1000000 ЕД бензилпенициллиновой соли в 5мл растворителя. Пациенту назначено ввести 750000 ЕД в/м. Сколько необходимо набрать антибиотика на одну инъекцию	
0,75	
3,75	+
2	
Все перечисленные отходы относятся к классу Г, кроме	

просроченные лекарственные препараты	
цитостатики	
отходы от эксплуатации транспорта	
органы удаленные при операции	+
ртутьсодержащие приборы	
Все приведенные формулировки заключений медосвидетельствования водителя транспортных средств являются верными, кроме	
алкогольное опьянение установлено или не установлено	+
трезв, признаков употребления алкоголя нет	
установлен факт употребления алкоголя, признаки опьянения не выявлены	
Вторичная профилактика - это	
предупреждение возникновения инвалидности	
предупреждение обострения заболевания	+
предупреждение факторов риска развития заболевания	
Выберите из перечисленных дезинфектантов, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования	
САТ 22	+
хлорамин 3%	
жавель Солид таблетки	
Выберите из перечисленных дезинфектантов, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования	
сайдекс	
септодор-форте	+
стераниос	
септрин Р-плюс	
Выберите наиболее предпочтительный метод стерилизации полимерных и резиновых материалов	
химический	
автоклавирование	+
плазменный	
газовый	
Выведение нижней челюсти при ИВЛ	
предупреждает регургитацию желудочного содержимого	
устраняет западение языка, восстанавливает проходимость ДП (гортани и трахеи)	+
создает герметичность между ртом оказывающего помощь и ртом пациента	
Герметичный непрокальваемый контейнер для острого инструментария может использоваться	
не более 24 часов	
не более 8 часов	
не более 72 часов	+
Главный признак вывиха	
Боль	
Изменение формы сустава	
Отёк сустава	
Невозможность движения в суставе	+
Дезинфекцию многоразового инструментария после больного вирусным гепатитом "В" проводят	
мелисиптол аэрозоль	
Оксилосепт аэрозоль	
раствор Жавель Солид 0,1%	+
Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую оболочку глаз	
промыть проточной водой	+
промыть 0,05% раствором перманганата калия	
промыть проточной водой, промыть 0,05% раствором марганцовистого калия или 2% раствором борной кислоты	
Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую оболочку рта	
прополоскать рот 70 градусным этиловым спиртом	+
прополоскать рот раствором соды	
прополоскать рот водой, 96 градусным спиртом	
Действия медработника при повреждении кожных покровов рук в процессе работы	
выдавить из раны кровь и промыть под проточной водой	

не останавливая кровотечения, выдавить кровь, промыть под проточной водой, обработать ранку 70% спиртом, обработать ранку 5% раствором йода, заклеить лейкопластырем	+
обработать руки 70 градусным этиловым спиртом	
обработать ранку 5% раствором йода или 2% раствором бриллиантового зеленого	
Депрессивно-идиотическое торможение выражается	
пессимистическим содержанием мыслей	+
ментизме	
шперрунгах	
Диагноз алкогольной зависимости включает в себя	
увеличение частоты алкоголизации	
ситуационно-обусловленное потребление алкоголя	
компульсивное влечение к алкоголю	
абстинентный синдром	+
Динамику изготовления и потребления алкоголя в мире отражают данные	
ВОЗ о производстве алкоголя на душу населения в мире	
о производстве алкоголя на душу населения за определенный период времени в отдельных регионах мира	
о потреблении алкоголя на душу населения в мире	
о потреблении алкоголя населением конкретного региона	+
о потреблении алкоголя на душу населения в отдельном регионе	
Длительное угнетённо-подавленное настроение с мрачной оценкой прошлого и настоящего и пессимистическими взглядами на будущее называется	
эйфорией	
депрессией	+
манией	
Для III стадии алкоголизма характерны	
повышенная толерантность к алкоголю	
эйфория	
алкогольная деградация личности	+
повышенная работоспособность	
Для алкогольного галлюциноза характерны	
ценные идеи	
слуховые галлюцинации	+
бред ревности	
Для водителей установлены следующие предельно допустимые параметры содержания алкоголя в крови	
0,2	
0,4	
не более 0,16 мг/л	+
Для депрессивной триады характерно	
двигательная заторможенность, идеаторная заторможенность, пониженное настроение	+
меланхолический раптус	
иллюзорные расстройства	
Для диагностики ВИЧ-инфекции используется	
иммуноферментный анализ	+
анализ на бактериологическое исследование	
общий анализ мочи	
анализ крови на ГГТП	
Для истинных запоев характерны	
систематическое пьянство	
спонтанность возникающего интенсивного влечения к алкоголю	+
эпизодическое употребление спиртных напитков	
Для контроля изделий на скрытую кровь берётся	
1% каждого наименования обработанных изделий	+
не менее 50% изделий	
Для невротического синдрома характерно	
слабоумие	
оглушение	
тревога	+
Для обеззараживания одноразового инструментария используют	
1 % хлорамин	

3 % перекись водорода	
раствор САТ 22 -0,2%	+
Для обеззараживания поверхностей на которые попала кровь, используют	
биолот	
0,1% раствор Жавель Солида	+
кальценированная сода	
Для обеззараживания рук после контакта с инфекционным больным используют растворы	
0,5% сульфаклорантин	+
0,05% раствором перманганата калия	
хлоргексидин водный раствор	
3% перекись водорода	
Для обработки кожи больного перед в/м инъекцией используют	
2 ватных шарика, смоченных 700 спиртом	+
1 ватный шарик, смоченный 900 спиртом	
Для обработки рук перед проведением манипуляций используют	
хлорамин 3%	
Новодез	
лизанин	+
Для опьянения, вызванного употреблением опиатов, характерны	
сужение зрачка	+
расширение зрачка	
дурашливость	
галлюцинации	
Для оценки состояния пострадавших на месте происшествия используют	
измерение АД, подсчет пульса за 1 мин., аускультацию	
расспрос, осмотр, пальпацию, подсчет пульса за 10-15 сек	+
лабораторные экспресс-методы	
УЗИ, рентгенографию, ЭКГ	
Для перелома основания черепа характерен симптом	
"очков	+
Кернига	
Брудзинского	
Для проведения искусственной вентиляции легких необходимо в первую очередь	
Голову пострадавшего запрокинуть с выдвиганием вперед нижней челюсти	+
Закрывать нос пострадавшему	
Сделать пробное вдувание воздуха	
Нажать на грудину	
Для промывания желудка необходимо приготовить чистую воду с температурой	
12 градусов С	
18-20 градусов С	+
24-36 градусов С	
Для профилактики аспирации рвотных масс больному следует придать положение	
На спине	
На боку	+
На животе	
Полусидячее	
Для сотрясения головного мозга характерно	
кома	
ретроградная амнезия	+
антероградная амнезия	
конградная амнезия	
Для стерилизации применяются средства, обладающие	
статическим действием	
вирулицидным действием	
спороцидным действием	+
фунгицидным действием	
родентицидным действием	
Для удушья характерны	
Сильная головная боль	
Сильный кашель, синюшность и отёчность лица	+
Беспокойство, потливость, дрожь	

Боли в сердце	
Для электротравм 1 степени тяжести характерно расстройство дыхания и кровообращения	
судорожное сокращение мышц	+
клиническая смерть	
До прихода врача больному с желудочно-кишечным кровотечением нужно поставить очистительную клизму	
положить на живот горячую грелку	
положить на эпигастрий пузырь со льдом	+
Доврачебная неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы	
ингаляция беротока или сальбутамола (1 доза)	+
ингаляция кислорода	
инъекция зуфиллина 2,4 %-10,0	
Документами для составления годового отчета о деятельности поликлиники являются	
статистический талон заключительных (уточненных) диагнозов	+
листок учета больных и коечного фонда	
карта выбывшего из стационара	
Заболевания, наиболее затрудняющие проведение спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций	
простудные заболевания	
особо опасные инфекции	+
сердечно-сосудистые заболевания	
заболевания кожи и подкожной клетчатки	
Задачи наркологического диспансера	
оказание психиатрической помощи	
выполнение диагностической, лечебно-реабилитационной деятельности; осуществление профилактических мероприятий ,экспертиза алкогольного опьянения, оказание организационно-методической помощи МО	+
вакцинация населения	
Задачи стационарных наркологических отделений	
оказание специализированной лечебно-диагностической помощи; купирование психозов, связанных с потреблением психоактивных веществ, ведение профилактической и реабилитационной работы	+
поликлинический прием	
диспансерное наблюдение	
Заражение при контакте с ВИЧ-инфицированным пациентом может произойти при	
при уколе иглой	+
бытовом контакте	
фекально-оральный	
Из всех соматических осложнений при алкоголизме наиболее специфичными являются	
сосудистая гипертензия	
бактериальная пневмония	
жировая дистрофия печени	+
Из истинных и ложных суррогатов алкоголя наиболее опасны	
самогон	
энергетические напитки	
бодяжная водка	
денатурат	+
Иммобилизация при подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника	
петля Глиссона	
не требуется	
ватно-марлевый воротник	+
працевидная повязка	
Инкубационный период ВИЧ	
7 дней-14 дней	
3 недели - 3месяца-1год	+
5-15 лет	
Источники инфекции при гепатите В	
стерильный медицинский инструментарий	
вирусоноситель , больной гепатитом	+
испражнения больного	
Источники инфекции при СПИДе	
человек больной или носитель	+

животное больное или носитель	
предметы личной гигиены	
К вербальному типу общения относится	
беседа	+
внешний вид	
выражение лица, мимика, жесты	
К вербальным средствам общения относится	
поза	
речь	+
взгляд	
жест	
К внешним характерным признакам алкогольного синдрома плода относят	
«заячью» губу	
увеличение окружности головы	
истончение верхней губы	+
широкие глазные щели	
К методам временной остановки кровотечения относятся	
перевязка сосуда в ране	
перевязка сосуда на протяжении	
наложение кровоостанавливающего жгута	+
К наиболее опасным для заражения ВИЧ – инфекцией биологическим жидкостям можно отнести	
кровь, сперма	+
моча, кал	
слюна, пот	
К наркотическим препаратам относятся	
содержащие спирт	
препараты конопли, опия	+
препараты валерианы	
реланиум	
К немедикаментозным методам лечения наркологических заболеваний относятся	
сенсibiliзирующая терапия	
психотерапия	+
пирогенная терапия	
дезинтоксикационная терапия	
К показателям, характеризующим деятельность поликлиники, относятся	
процесс охвата диспансерным наблюдением, число лиц, снятых с диспансерного учета	+
летальность на участке	
динамика инвалидности	
К препаратам группы опия относятся	
героин	+
тетрагидроканнабиол	
ЛСД	
кокаин	
К ранним симптомам биологической смерти относится	
помутнение роговицы	+
трупное окоченение	
трупные пятна	
расширение зрачков	
К симптомам расстройства восприятия относятся	
бред	
иллюзии	+
эйфория	
страхи	
К симптомам расстройства мышления относятся	
сверхценные идеи	+
галлюцинации	
сопор	
астения	
К социальным последствиям злоупотребления ПАВ относятся	

высокая смертность от заболеваний, полученных в результате злоупотребления ПАВ	
большое число суицидов	
сокращение продолжительности жизни	
убытки по бюджету здравоохранения	+
большое число преступлений	
К средствам сенсibiliзирующей терапии алкогольной зависимости относятся	
эспераль	+
унитиол	
реополиглюкин	
пирацетам	
К факторам способствующим формированию наркомании относятся	
наследственная отягощенность алкоголизмом	
преобладание астенических черт в характере	
асоциальная направленность ближайшего окружения	+
Кабинет психиатра-нарколога в общесоматической поликлинике осуществляет	
консультативную работу; занимается вопросами профилактики	+
общемедицинский прием	
купирование запоев	
Как часто проводится замена перчаток при выполнении манипуляций в процедурном кабинете	
1 пара перчаток на 3-5 пациентов	
1 пара перчаток на 10 пациентов	
1 пара перчаток на 1 пациента	+
1 пара перчаток на смену	
Какие из перечисленных спиртных напитков быстрее всасываются в кровь из желудочно-кишечного тракта	
самогон	
коньяк	
крепкие вина	+
сухое вино	
Какие из перечисленных средств оказывают воздействие на спорообразующие микроорганизмы	
перекись водорода 3%	
хлоргексидин	
лизоформин 3000	+
Какие из перечисленных средств относятся к токсикоманическим	
Опий	
Морфий	
Галлоперидол	
Клей "Момент"	+
Какие из перечисленных средств являются нейролептиками	
цитоплавин	
пирроксан	
галлоперидол	+
милдронат	
Каким нормативным документом регламентируется работа с медицинскими отходами	
Сан ПиН 2.1.7.2790-10	+
СанПиН 2.1.3.1375-03	
ФЗ №89 "Об отходах производства и потребления"	
кадастром отходов производства и потребления РФ	
Какое из следующих лекарственных средств является антагонистом опия наркотика	
элениум	
галлоперидол	
метадон	
налоксон	+
Какой документ выдается при нетрудоспособности возникающей вследствие алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения	
справка	
лист нетрудоспособности не выдается	
справка на 3 дня, затем листок нетрудоспособности	
листок нетрудоспособности с отметкой о состоянии опьянения в истории болезни и в листке нетрудоспособности	+

Какой документ заполняет средний мед. работник на предрейсовом осмотре на водителя обнаруженного в состоянии опьянения	
докладная записка руководителю	
протокол контроля трезвости	
журнал предрейсовых осмотров	+
Какой из перечисленных методов является наиболее эффективным для преодоления анозогнозии	
гипноз	
медикаментозная терапия	
рациональная психотерапия	+
иглорефлексотерапия	
Какой из перечисленных факторов в большей степени приводит к дорожно-транспортным происшествиям	
неудовлетворительное состояние дорог и автотранспорта	
нехватка транспортных развязок	
употребление алкоголя за рулем	
недостатки в работе ГИБДД	
нарушение правил безопасности дорожного движения	+
Какой нормативный документ МЗ регламентирует работу медицинского персонала по профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулёзом	
приказ № 490 от 2006г	
приказ № 408 от 1986г	
приказ № 342 от 1998г	+
приказ № 170 от 1994г	
Какую функцию выполняет общение на первом этапе сестринского процесса	
информационную	+
экспрессивную	
регулятивную	
Качество предстерилизационной очистки на наличие скрытой крови оценивают	
амидопириновой, фенолфталеиновой пробами	
азопирамовой, амидопириновой пробами	+
ортолидиновой, амидопириновой пробами	
Квалифицированная медицинская помощь – это	
оказание помощи по жизненным показаниям	
само- и взаимопомощь, помощь спасателей	
полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами	+
Клинико-экспертная комиссия наркодиспансеров решает следующие задачи	
направление больных на медико-социальную экспертизу, принятие экспертного решения в сложных, конфликтных случаях	+
экспертизы алкогольного или наркотического опьянения	
диагностику в сложных случаях	
Клинические проявления характерные для СПИДа	
увеличение лимфоузлов	+
увеличение веса тела	
булимия	
гематурия	
акроцианоз	
Коллективные средства защиты	
больницы	
формирования гражданской обороны	
фильтрующие противогазы	
убежища и укрытия	+
Комплекс мер по предупреждению попаданию микробов в рану при медицинских манипуляциях - это	
асептика	+
антисептика	
заключительная дезинфекция	
текущая дезинфекция	
Кратность обследования персонала на носительство ВИЧ	
1 раз в год	+
1 раз в 2 года	
1 раз в 3 месяца	
Лаково-красная моча – признак	

синдрома длительного сдавления	+
асфиксии	
перегревания	
переохлаждения	
Медицинская помощь в первую очередь оказывается	
пострадавшим с повреждениями с нарастающими расстройствами жизненных функций	+
пострадавшим с повреждениями несовместимым с жизнью	
легкопострадавшим	
Медицинские отходы класса Б и В должны собираться	
в сертифицированную упаковку с цветовой маркировкой	
в сертифицированную герметичную упаковку с цветовой маркировкой	+
в мусорные контейнеры	
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения водителей транспортных средств проводится	
на основании протокола сотрудника ГИБДД о направлении на освидетельствование	+
по жалобе родственников	
Можно прикасаться руками	
к цилиндру шприца, рукоятке поршня	+
к адаптеру шприца	
к кончику иглы	
На какой спектр микроорганизмов воздействуют стерилизационные методы обработки инструментария	
на патогенную микрофлору	
на непатогенную микрофлору	
на спорообразующие микроорганизмы	
на все виды микроорганизмов, в том числе и спорообразующие	+
На лицо употребляющее наркотики без признаков зависимости в райнаркокабинете заводится	
медицинская карта амбулаторного больного ф №025-5/у-88	+
карта обратившегося за психиатрической (наркологической) помощью ф № 30	
статистический талон	
На обожженную поверхность накладывают	
сухую асептическую повязку	+
повязку с раствором чайной соды	
повязку с синтомициновой эмульсией	
На основании СанПиН 2.1.3.2630-10 не рекомендуется	
стирать спецодежду на дому	+
устраивать сквозные проветривания палат	
проводить кварцевание палат	
наносить дезинфицирующие средства на стены на высоту вытянутой руки	
Назовите возможные пути передачи ВИЧ» инфекции	
контактно-бытовой	
фекально-оральный	
воздушно-капельный	
трансфузионный	+
Назовите пероральный препарат, рекомендованный для борьбы с педикулёзом	
амоксипин	
парацетомол	
бутадион	+
Назовите симптомы Корсаковского психоза	
грубое снижение интеллекта, памяти	+
бредовые идеи	
сумеречное помрачение сознания	
Назовите синдром, возникающий вследствие систематической ингаляции органических летучих веществ	
психоорганический	+
судорожный	
параноидный	
Наиболее опасное проявление немедленной аллергии	
Крапивница	
Бронхоспазм	

Анафилактический шок	+
Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений	
Наложение жгута	
Тампонада раны	
Тугая давящая повязка	+
Закрутка	
Наказания, относящиеся к дисциплинарной ответственности	
замечание, выговор, увольнение	+
лишение материнских прав	
заключение под стражу	
Необходима ли изоляция для носителей ВИЧ-инфекции	
нет	+
да	
Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского работника являются	
сообщение на предыдущее место работы	
заключение трудового договора	+
выдача справки о месте работы	
Неотложная помощь при тяжелой электротравме, приведшей к остановке сердца	
освободить пострадавшего от действия тока	
выполнить ИВЛ, прекардиальный удар, непрямой массаж сердца	+
инъекция адреналина	
дать вдыхать пары нашатырного спирта, вызвать бригаду скорой помощи	
Неотложная помощь при тяжелом коллапсе	
внутривенно ввести преднизолон 30- 60 мг( или дексаметазон 8 мг), обеспечить инфузию 200 мл физ. раствора	+
внутривенно ввести адреналин 1 мл	
внутривенно ввести глюкозу 5%-200 мл	
Неотложная помощь при носовом кровотечении	
Запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду	
Нагнуть голову больного вперед, положить холод на переносицу, сделать тампонаду	+
Немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, сделать тампонаду	
Приложить тепло к переносице	
Неотложная помощь при ожогах	
асептическая повязка, анальгин, обильное питье	+
димедрол	
грелка	
Неотложная помощь при остром отравлении через желудочно-кишечный тракт	
промыть желудок 10-12 л. воды, дать активированный уголь 1 гр. внутрь	+
вызывать рвоту	
дать слабительное	
поставить клизму	
Неотложная помощь при отравлениях неприжигающими ядами	
промывание желудка, клизма	+
грелка на область эпигастра	
анальгин	
Неотложная помощь при приступе стенокардии	
обеспечить покой, использовать сублингвально нитроглицерин 0,05 мг, контроль АД	+
Измерить АД, сделать инъекцию баралгин 5 мг	
Измерить АД, сделать инъекцию анальгина 50%-2 мл	
Неотложная помощь при судорожном синдроме	
седуксен	+
коргликон	
кардиамин	
супрастин	
Неотложная помощь при травматическом шоке	
обезболивание ,иммобилизация , остановка кровотечения	+
седуксен	
эфедрин	
преднизолон	
Непрямой массаж сердца проводится	

на границе верхней и средней трети грудины	
на границе средней и нижней трети грудины	+
на 1см выше мечевидного отростка	
Нормативно-правовая база медицинского права включает в себя	
конституцию РФ, основы законодательства РФ об охране здоровья граждан	+
арбитражное право	
ФЗ о системе государственной службы РФ	
Обеззараживание посуды после приема пищи туберкулезным больным	
замачивание на 30 минут в 700 спирте	
5% хлорамин -4 часа	+
0,1% хлорамин -2 часа	
Обморок – это	
проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания	
аллергическая реакция	
потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса	+
Общение в деятельности медицинского работника – это	
обмен информацией	
обмен эмоциями	
обмен информацией и эмоциями	+
Обязательными условиями при проведении непрямого массажа сердца является	
наличие твердой поверхности, положение рук реанимирующего на границе средней и нижней трети грудины	+
наличия валика под лопатками	
наличия двух реанимирующих	
Оказывая помощь при ожоге первой степени, в первую очередь необходимо обработать обожжённую поверхность	
96% этиловым спиртом	
Холодной водой до онемения	+
Стерильным новокаином	
Жиром	
Окклюзионная повязка применяется при	
венозных кровотечениях	
открытом пневмотораксе	+
ранение мягких тканей головы	
после пункции сустава	
Окклюзионную повязку накладывают при	
Закрытом переломе ребер	
Открытом пневмотораксе	+
Ушибе грудной клетки	
Переломе ключицы	
Окончательная остановка кровотечения производится	
наложением жгута	
наложением зажима в ране	
перевязкой сосуда в ране	+
прижатием сосуда на протяжении	
Опасное легочное кровотечение возникает при	
Бронхопневмонии	
Бронхиальной астме	
Туберкулезе легких	+
Остром бронхите	
Определение сестринского диагноза	
выявление клинического синдрома	
выявление конкретного заболевания	
выявление причины заболевания	
описание проблем пациента, связанных с реакциями на заболевание	+
Оптимальное время оказания медицинской помощи с момента травмы	
1	
2	
5-30 минут	+
Организационная структура сестринской помощи состоит из	
3	
6	

4	
5	+
Основной признак торпидной фазы шока	
рвота	
асфиксия	
анизокория	
снижение АД	+
Особенности введения инсулина	
строго в/м	
в/к, шарик со спиртом не прикладывать	
п/к, через 30 минут поесть	+
Остановке кровотечения способствует	
Новокаин	
Гепарин	
Викасол	+
Аспирин	
Отходы от больных туберкулезом, анаэробной инфекцией и микологических больных согласно классификации относятся к следующему классу опасности	
класс В	+
класс Г	
класс Д	
Отходы процедурного кабинета, не требующие обязательной дезинфекции по вирусногепатитному режиму	
одноразовые шприцы	
перчатки	
постинъекционные шарики	
пустые ампулы лекарственных препаратов	+
пробирки с кровью	
Отчетные формы наркологических учреждений и подразделений	
фф 1,30	
фф 37,11	+
фф 36,10	
Охлаждение ожоговой поверхности холодной водой показано	
в первые минуты после ожога в течении 10-15 минут	+
не показано	
при ожоге II степени	
Парентеральным путем передаются заболевания	
грипп	
простой герпес	
гепатит А	
гепатит В	+
Патологическое опьянение развивается	
только в подростковом возрасте	
у психически здоровых лиц, на фоне интоксикации или астении	+
только у женщин	
Пациента с большой кровопотерей транспортируют	
сидя	
полусидя	
лежа с приподнятым головным концом на носилках	
лежа с опущенным головным концом на носилках	+
Первая медицинская помощь при ранении наружной сонной артерии	
пальцевое прижатие	+
наложение давящей воздухопроницаемой повязки	
обезболивание	
прошивание раны	
Первая медицинская помощь при ранениях вен шеи	
пальцевое прижатие	
наложение давящей воздухопроницаемой повязки	+
обезболивание	
прошивание раны	
Первая помощь при гипогликемической предкоме	
Срочно ввести инсулин	

Дать пару кусков сахара, конфету, кусок хлеба	+
Срочно доставить в ЛПУ	
Сделать непрямой массаж сердца	
Первая помощь при потере сознания	
Абсолютный покой	
Абсолютный покой, голову поворачивают набок	
Абсолютный покой, голову поворачивают набок, дальнейшие действия зависят от причины, вызвавшей потерю сознания	+
Холод на голову	
Первая помощь при солнечном ударе	
ИВЛ и непрямой массаж сердца	
перенести пострадавшего в прохладное место, защищенное от солнца, приложить холод к голове	+
подкожное введение кордиамина или кофеина	
Первичная заболеваемость - это	
число больных впервые выявленных в данном году	
число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 000 населения	+
число больных состоящих на учете на конец года	
Первичный реанимационный комплекс включает	
восстановление проходимости дыхательных путей, ИВЛ	+
регистрацию ЭКГ, введение адреналина внутрисердечно	
дифибрилляцию	
Первый этап сестринского процесса включает	
прогнозирование результатов ухода	
беседу с родственниками пациента	+
определение существующих и потенциальных проблем пациента	
профилактику осложнений	
Первым видом оказания медицинской помощи пострадавшим считается	
первая медицинская доврачебная помощь	
первая медицинская помощь (само- и взаимопомощь)	+
специализированная медицинская помощь	
квалифицированная медицинская помощь	
Первыми признаками развивающегося травматического шока являются	
резкое побледнение кожных покровов, липкий холодный пот	+
судороги, апатия, потоотделение	
гиперемия, сухость кожи, пенистое отделение изо рта, галлюцинации	
Повреждение нервных стволов может быть осложнением	
в/в вливаний	
п/к инъекций	
в/м инъекций	+
в/в капельных вливаний	
Повторно использовать одноразовые (уничтожаемые) шприцы	
можно для восстановления одинаковых вакцин	
нельзя	+
можно для восстановления любых вакцин, если в наличии имеется только один шприц	
можно для иммунизации детей старше 2 лет	
Повторный осмотр на педикулёз проводится	
ежедневно	
через 10 дней	+
при выписки пациента	
Показание к наложению жгута	
Венозное кровотечение	
Артериальное кровотечение	+
Внутреннее кровотечение	
Кровотечение в просвет полого органа	
Показания к амбулаторному лечению больных алкоголизмом	
начальная форма болезни	+
делирий	
выраженная абстиненция	
Показания к стационарному лечению больных алкоголизмом	
неэффективность амбулаторного лечения	+

положительная динамика при лечении	
начало лечения на ранней стадии болезни	
перепады настроения	
Показатели АД 160/90 рт. ст. – это	
Норма	
Гипотензия	
Экстрасистолия	
Гипертензия	+
Показателями эффективной реанимации являются	
появление пульса на сонных артериях, сужение зрачков и появление их реакции на свет	+
расширенные зрачки	
правильный массаж сердца	
Положительное окрашивание азопирамовой пробы может быть	
синее	
розовое	
коричневое	
любое из перечисленных	+
Положительное окрашивание фенолфталеиновых проб	
синее	
розовое	+
коричневое	
Понятие "врачебная тайна" предусматривает следующими нормативно-правовыми актами	
трудовой кодекс	
конституция РФ	+
закон о полиции	
закон об адвокатской деятельности	
Понятие жизненно важная потребность человека означает	
способность функционировать независимо	
дефицит того, что существенно для здоровья и благополучия человека	+
любое осознанное желание	
потребность человека в самоактуализации	
Понятие рецидив при алкогольной зависимости включает в себя все перечисленное, кроме	
возобновление алкоголизации вследствие влечения к алкоголю	
употребление алкоголя не повлекшее за собой развитие болезненных симптомов	+
употребление алкоголя с целью улучшения своего психического состояния	
Попадание конца иглы в просвет сосуда при подкожных и внутримышечных инъекциях может привести к	
масляной эмболии	
воздушной эмболии	+
тромбофлебиту	
абсцессу	
Последовательность оказания помощи при сдавливании конечности	
наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, асептическая повязка, иммобилизация, наружное охлаждение конечности, инфузия	+
асептическая повязка, наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, иммобилизация, наружное охлаждение конечности, инфузия	
освобождение сдавленной конечности, обезболивание, инфузия, наложение жгута, иммобилизация	
иммобилизация, обезболивание, наложение жгута, инфузия	
Последовательность появления симптомов при острой остановке кровообращения	
выключение сознания, появление судорог, расширение зрачков	+
расширение зрачков, появление судорог, выключение сознания	
появление судорог, расширение зрачков, отключения сознания	
Права медицинского работника	
работа по трудовому договору	+
право бесплатного проезда	
работа без сертификата	
Права пациента	
на выбор врача и МО	+
на выбор палаты в МО	

на составление меню рациона питания	
Правовые требования к занятию индивидуальной медицинской деятельностью	
наличие лицензии	+
наличие гражданства	
наличие стажа	
Предрейсовые осмотры водителей в учреждении проводятся при наличии	
медицинского работника в здравпункте	
диплома о медицинском образовании	
удостоверения о его специальной подготовке	+
Предрейсовые осмотры при наличии специальной подготовки имеют право проводить	
инспектор по трудоустройству	
инженер по технике безопасности	
бухгалтер по материалам	
все врачи и средний медработник	+
При внезапном снижении объема циркулирующей крови появляются	
бледность, гипертензия, напряженный пульс, головокружение	
цианоз, гипотензия, аритмия, тахипноэ, слабость, потеря сознания	
бледность, головокружение, слабость, гипотензия, пульс слабого наполнения, аритмия	+
При выявлении больного вирусным гепатитом – А, заключительная дезинфекция проводится с использованием растворов	
0,1% Жавель- Солида	+
5% хлорамина	
3% перекиси водорода	
При выявлении инфекционного больного в стационаре, персонал	
организует и проводит заключительную и текущую дезинфекцию	+
изолирует пациента от остальных и организует доставку пациента домой	
переводит больного в общую палату	
При гипертензивном кризе для нормализации АД необходимо использовать	
внутримышечно анальгин 50%-2 мл	
внутривенно баралгин 5 мг	
капотен - половину таблетки (12,5мг) сублингвально	+
При загрязнении неповрежденных кожных покровов кровью пациента необходимо	
удалить кровь тампоном, обработать кожные покровы 70 градусным спиртом, промыть проточной водой с мылом, вновь обработать 70 градусным спиртом	+
кровь смыть под струёй воды с мылом	
смыть кровь, обработать кожные покровы йодом	
При наличии у больных психическим заболеванием алкоголизма, они должны проходить лечение	
в психиатрическом стационаре	
в специализированном учреждении	
в наркологическом диспансере	
в психиатрическом или наркологическом стационаре в зависимости от состояния	+
в психиатрическом диспансере	
При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у взрослого должен быть	
1-2 см	
2-4 см	
4-5 см	+
6-8 см	
При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у ребенка должен быть	
1-2 см	
2-4 см	+
4-5 см	
6-8 см	
При острой интоксикации смерть наиболее вероятно наступает при концентрации алкоголя в крови	
2-3 мг /л	
3-4 мг /л	
4-5 мг /л	+
5-6 мг/л	
6–7 мг /л	
При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение	

Полусидячее	
Ровное горизонтальное	
Горизонтальное с приподнятой головой	
Горизонтальное с приподнятыми ногами	+
При отморожении первая помощь состоит в наложении термоизолирующей повязки	+
растирание снегом и шерстью	
наложение масляно бальзамической повязки	
При отравлении барбитуратами не наблюдается возбуждение	+
депрессия дыхания	
артериальная гипотензия	
При пальцевом прижати сонной артерии её прижимают к Ребру	
Поперечному отростку VI шейного позвонка	+
Середине грудино-ключично-сосцевидной мышцы	
Ключице	
При подкожных инъекциях иглу вводят на глубину 1/3 длины иглы	
2/3 длины иглы	+
чтобы скрылся просвет иглы	
При попадании крови пациента на незащищенные кожные покровы нужно вымыть водой с мылом, обработать 70% раствором этилового спирта	
обработать их 70% раствором этилового спирта, вымыть водой с мылом, повторить обработку 70% раствором этилового спирта	+
вымывать водой с мылом, обработать 5% спиртовой настойкой йода	
При применении каких медикаментов могут возникнуть аллергические реакции у больного лидокаин	+
физиологический раствор	
валидол	
При проведении предрейсовых осмотров водителей проводится оценка здоровья водителей, контроль трезвости	+
медицинское освидетельствование на состояние опьянения	
психотерапевтическое обследование	
При развитии клиники анафилактического шока необходимо срочно ввести адреналин 1мл, обеспечить инфузию физ.раствора 300 мл, преднизолон 60–120 мг	+
вести адреналин 1-2 мл, супрастин 2 мл, хлористый кальций	
кофеин натрия бензоат 1 мл, адреналин 1 мл, супрастин 2 мл	
При решении вопроса о дееспособности вследствие злоупотребления алкоголем или наркотическими веществами над лицом устанавливается опека и попечительство	+
группа инвалидности	
При СПИДе наиболее пораженными являются следующие форменные элементы крови лимфоциты	+
тромбоциты	
эритроциты	
При хронических соматических заболеваниях изменение характера возможно	+
невозможно	
При черепно-мозговой травме противопоказаны морфин	+
противостолбнячная сыворотка	
антибиотики	
противорвотные	
Признаками алкогольного делирия являются продолжительный сон	
зрительные галлюцинации	+
заторможенность	
систематизированный бред	
Признаками быстро наступившей смерти при острой интоксикации алкоголем являются интерстициальный фиброз	
застойное полнокровие внутренних органов	+

множественные очаги выпадения нервных клеток	
очаги клеточного опустошения	
Признаками клинической смерти являются	
нитевидный пульс, цианоз, агональное дыхание	
потеря сознания, нитевидный пульс, цианоз	
потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, остановка дыхания, расширение зрачков	+
потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии	
Признаки воздушной эмболии	
приступ удушья	+
судороги	
внезапное повышение АД	
Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме	
Начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока	
Освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию	+
Закопать пострадавшего в землю	
Облить водой	
Принципы оказания помощи при химических ожогах	
По возможности нейтрализовать вещества, вызывающие ожог, промыть холодной водой	+
Промывание холодной водой в течение часа	
Анальгетики, начиная со второй степени – сухие асептические повязки без обработки обожжённой поверхности	
Присыпать тальком	
Причины гематомы при в/в инъекции	
прокол обеих стенок вены	+
повышенная свертываемость крови	
нарушение правил асептики и антисептики	
Противопоказанием для проведения реанимации является	
инсульт	
неизлечимое заболевание в терминальной стадии	+
инфаркт миокарда	
Профилактика воздушной эмболии	
тщательно вытеснить воздух из шприца	+
лекарственный препарат вводить медленно	
соблюдать правила асептики	
Профилактика поломки иглы при в/м инъекциях	
вводить иглу не до конца	+
перед инъекцией провести обработку инъекционного поля	
вводить лекарственное средство только подкожно	
Проявление психопатического синдрома	
вспыльчивость	+
бред	
иллюзии	
Пути передачи внутрибольничной инфекции	
парентеральный	+
биологический	
химический	
Растворы, использующиеся для обеззараживания кожи при попадании на них крови больного СПИДом	
6% перекись водорода	
70% спирт	+
раствор хлоргексидина	
1% иодонат	
Растворы, использующиеся для обеззараживания слизистых при попадании на них крови больного СПИДом	
6% перекись водорода	
раствор хлоргексидина	
0,05% раствор перманганата калия	
70% спирт	+
Реанимацию обязаны проводить	

только врачи и медсестры реанимационных отделений	
все специалисты, имеющие медицинское образование	+
все взрослое население	
Реанимация показана	
в каждом случае смерти больного	
только при внезапной смерти молодых больных и детей	
при внезапно развивающихся терминальных состояниях	+
Реанимация это	
раздел клинической медицины, изучающей терминальные состояния	
отделение многопрофильной больницы	
практические действия, направленные на восстановление жизнедеятельности	+
Результатом правильного наложения жгута при кровотечении является	
прекращение кровотечения, отсутствие пульса, бледность кожи	+
уменьшение кровотечения, сохранение пульса, увеличение цианоза	
прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза	
уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи	
С чего начинается оказание помощи при утоплении	
Искусственного дыхания	
Непрямого массажа сердца	
Удаления воды из дыхательных путей пострадавшего	+
Согревания	
Сангвиник является типом темперамента	
бурным, порывистым, резким, горячим	
спокойным, вялым, медлительным, устойчивым	
живым, подвижным, отзывчивым, эмоциональным	+
Симптом расстройства влечений	
анорексия	+
сопор	
дереализация	
навязчивость	
Симптом расстройства воли	
псевдогаллюцинации	
ступор	+
абсанс	
деменция	
Симптом расстройства интеллекта	
оглушение	
бредовые идеи	
слабоумие	+
Симптом расстройства памяти	
деменция	
амнезия	+
галлюцинации	
Симптом расстройства сознания	
ритуалы	
ступор	
оглушение	+
Симптом расстройства эмоций	
амнезия	
кома	
эйфория	+
оглушение	
Симптомами I стадии алкоголизма являются	
компульсивное влечение к алкоголю	
повышение толерантности	+
делирий	
утрата ситуационного контроля	
Симптомами II стадии алкоголизма являются	
абстинентный синдром	+
снижение толерантности	
прорыв рвотного рефлекса	
Симптомы алкогольного бреда ревности следующие	

убежденность больного в неверности жены	+
эйфория	
колебания настроения	
алкогольный галлюциноз	
Симптомы сдавления головного мозга	
зрачок на стороне гематомы сужен, парезы и параличи на противоположной стороне	+
потеря сознания на 30 минут, тошнота, головная боль	
потеря сознания на 4 часа, рвота, головокружение	
потеря сознания на 2 суток, симптом «очков»	
Смена маркированных пакетов для медицинских отходов осуществляется	
каждые 3 часа	
каждые 8 часов	+
каждые 24 часа	
Современные дезинфицирующие средства для генеральных уборок	
5% хлорамин	
Лизетол, Сайдекс	+
моющий раствор	
Современные тенденции, характерные для наркоманий, включают	
преимущественное употребление средств растительного происхождения	
склонность к комбинированному приему наркотиков и смене их; появление новых форм наркотиков	+
исключительно парентеральный путь введения	
уменьшение числа женщин, злоупотребляющих наркотиками	
Состояние опьянения водителя считается бесспорным в случаях когда	
дизартрия	
концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе выше "0	+
нарушение координации	
Социальная потребность пациента	
сон	
жажда	
признание	+
еда	
Специализированная медицинская помощь – это	
оказание помощи по жизненным показаниям	
оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным	
само- и взаимопомощь, помощь спасателей	
полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами	+
Срок наблюдения за контактными при брюшном тифе	
21	+
35	
6	
Срок наблюдения за контактными при менингите	
10	+
7	
35	
1	
Срок наблюдения за контактными с больным дизентерией	
7	+
10	
21	
Сроки формирования алкоголизма у подростков	
1-3 года	+
3-5 лет	
5-7 лет	
Столкновение интересов двух или нескольких людей называется	
конфликтом	+
стрессом	
переговорами	
Страх смерти является проблемой	
психологической	+
физической	

социальной	
духовной	
Стремительно развивающийся шок	
Травматический	
Геморрагический	
Анафилактический	+
Гемотранфузионный	
Субъектами медицинского права являются	
медицинский персонал	+
суд	
должностное лицо правоохранительных органов	
Субъективное отношение к заболеванию называется	
анозогнозией	
ипохондрией	+
эгоцентризмом	
Субъективным методом сестринского обследования является	
определение отеков	
расспрос пациента	+
измерение артериального давления	
знакомство с данными медицинской карты	
Судорожный синдром алкогольной этиологии характеризуется	
наличием предшествующей ауры	
развитием в стадии абстиненции	+
появлением на ЭКГ специфических изменений	
Судорожный синдром характерен	
деменцией	
аурой	+
депрессией	
абулией	
Тактика оказывающего помощь на доврачебном этапе при ранении грудной клетки в случае, если из раны выступает ранящий предмет	
Удаление ранящего предмета, наложение тугой повязки	
Наложение повязки без удаления ранящего предмета	+
Удаление ранящего предмета, тугая тампонада раны, наложение повязки	
Наложение окклюзионной повязки	
Терминальные состояния - это	
обморок, коллапс, клиническая смерть	
предагония, агония, клиническая смерть	+
агония, клиническая смерть, биологическая смерть	
Типы течения подросткового алкоголизма	
злокачественный	+
медленнопрогредиентный	
Транквилизаторами являются	
нозепам	+
преднизолон	
пирацетам	
мексидол	
Транспортировка больных с повреждением таза	
лежа на носилках, поза «лягушки»	+
в устойчивом боковом положении	
полусидя	
лежа на носилках с валиком под поясницей	
Транспортировка пострадавшего с сотрясением головного мозга осуществляется в положении	
горизонтальном	
с приподнятым головным концом	+
с опущенным головным концом	
Транспортируют пострадавшего с переломом ребер и грудины	
лежа на боку	
лежа на спине	
в положении сидя	+
Третий этап сестринского процесса включает	

планирование объема сестринских вмешательств	+
срочное оказание неотложной помощи	
выявление проблем пациента	
сбор информации	
Тройной прием по Сафару включает	
поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову	
освобождение от стесняющей одежды области шеи	
отгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта	+
Уголовная ответственность предусматривается за	
нарушение установленных правил производства, хранения, отпуска, перевозок наркотических лекарственных средств, хищение наркотических лекарственных средств	+
употребление или приобретение ПАВ без врачебного предписания	
Укажите меры, направленные на отрезвление общества	
ужесточение наказания за изготовление "бодяжной" водки	
рост цен на спиртные напитки	
запрет рекламы водки и пива в СМИ	+
Укажите признаки наркотического опьянения	
запах алкоголя изо рта	
бледность кожных покровов, расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза	+
несвязанная речь	
Установить верную последовательность действий по оказанию помощи при КРАШ-синдроме: 1.наложение жгута; 2.обезболивание; 3.освобождение сдавленной конечности; 4.асептическая повязка; 5.иммобилизация; 6.наружное охлаждение конечности; 7.инфузия	
1,3,6,2,4, 5,7	+
7,6,5,1,3,4,2	
4,2,1,7,3,6,5	
Факторами, способствующими развитию алкоголизма у женщин, являются	
экономическая зависимость от мужчин	
недостаточная активность алкогольдегидрогеназы	+
Факторы передачи гепатита «В»	
кровь	+
продукты питания	
воздух	
грязные руки	
Факторы положительно влияющие на эффективность лечения	
установка на лечение	+
неблагоприятный климат в семье	
невозможность трудоустройства	
потеря близкого человека	
Факторы, способствующие развитию наркологических заболеваний у подростков	
ведение здорового образа жизни	
склонность к подражанию и стремление к самоутверждению	+
увлечение компьютерными играми	
занятие спортом	
Физиологическая проблема пациента	
одиночество	
риск суицидальной попытки	
беспокойство по поводу потери работы	
нарушение сна	+
Физиологической потребностью, согласно иерархии А.Маслоу, является	
уважение	
знание	
дыхание	+
общение	
Фосфорорганические соединения из группы отравляющих веществ	
общееядовитых	
удушающих	
метаболических	
нервно-паралитических	+
Функция койки - это	
среднее число дней работы койки в году	+

число больных лечившихся на койке за год	
число больных поступивших в стационар в данном году	
Цели сестринского ухода бывают	
краткосрочными	+
общими	
личными	
не конкретными	
Цель заключительной дезинфекции	
одномоментное уничтожение возбудителя инфекционного заболевания на объектах внешней среды	+
изоляция пациента в отдельную палату, исключение контакта с родственниками и окружающими пациентами	
Цель сестринского процесса	
диагностика и лечение заболевания	
обеспечение приемлемого качества жизни в период болезни	+
решение вопроса об очередности мероприятий ухода	
активное сотрудничество с пациентом	
Целью санитарно-просветительной работы в стационаре является	
формирование установки на трезвый образ жизни только период лечения	
формирование установки на контролируемое потребление алкоголя	
пропаганда здорового образа жизни	+
Частота искусственных вдохов при ИВЛ у взрослых должна быть	
4-5 в минут	
12-16 в минуту	+
30-40 в минуту	
50-70 в минуту	
Частота искусственных вдохов при ИВЛ у детей должна быть	
4-5 в минут	
12-16 в минуту	
20 в минуту	+
60-80 в минуту	
Шок - это	
острая сосудистая недостаточность	+
острая сердечная недостаточность	
острая дыхательная недостаточность	
Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по	
гемодинамическим показателям	
эвакуационно-сортировочным признакам	+
возрастным показателям	
наличию транспортных средств	
Эпилептический припадок характеризуется	
Редким дыханием, бледной кожей	
Отсутствием или резким ослаблением реакции организма на внешние раздражители	
Внезапной потерей сознания	+
Запахом ацетона изо рта	