

Общая практика

Текст вопроса	Верный вариант
Текст варианта	
«Холодовая цепь» - это	
система холодильного оборудования и расположенные в нем вакцины	
система специальной подготовки персонала	
система мероприятий, обеспечивающих соблюдение температурного режима при хранении, транспортировке и применении МИБП на всех этапах их продвижения от предприятия изготовителя до вакцинируемого	
система мероприятий, обеспечивающих соблюдение температурного режима при хранении, транспортировке и применении МИБП на всех этапах их продвижения от предприятия изготовителя до вакцинируемого и контроля за соблюдением температурного режима	+
«Не навреди» - это основной принцип этической модели	
Гиппократ	+
Парацельс	
деонтологической	
биоэтической	
40% спирт в наружный слуховой проход при наличии в нем инородного тела растительного происхождения (горошины, фасолины и др) закапываются с целью	
предупреждения инфицирования	
вымывания инородного тела	
предупреждения его набухания	+
Абсолютные признаки проникающего ранения глаза	
наличие раны, гипотония глаза	+
помутнение зрачка	
симптом «кошачьего глаза»	
Абсолютный признак вывиха	
боль	
гиперемия	
нарушение функции	
пружинящая фиксация	+
Абсцесс - это	
воспаление потовых желез	
разлитое воспаление клетчатки	
ограниченное скопление гноя в тканях	+
гнойное воспаление сустав	
АДС – м-вакцину вводят	
накожно	
внутрикожно	
внутримышечно	+
подкожно	
перорально	
Аллергическая реакция на стиральный порошок, симптомы	
контактного дерматита	+
экземы	
атопического дерматита	
токсидермии	
Аллергические реакции замедленного типа развиваются после попадания аллергена в организм	
в течение 30- 40 минут	
через 1-2 суток	+
через 1- 2 часа	
через 4-12 часов	

Аллергические реакции немедленного типа развиваются после попадания аллергена в организм	
в течении 4- 5 часов	
через 1- 2 суток	
в течение 15- 20 минут	+
через 2-3 часа	
Амнезия – это нарушение	
памяти	+
внимания	
мышления	
восприятия	
Анафилактический шок может развиваться	
при травме нижних конечностей	
при введении сывороток, вакцин, белковых препаратов, при укусе насекомых	+
при тепловом ударе, переохлаждении	
при диарее, запоре	
Ангина характерна для	
скарлатины	+
менингококковой инфекции	
кори	
Антибиотики, используемые при туберкулезе	
линкомицин	
пенициллин	
цикloserин, рифампицин	+
Безопасная инъекция	
не наносит вред медицинскому работнику (вакцинатору)	+
в/м инъекция	
инъекция, сделанная одноразовым шприцем	
Благоприятное воздействие, оказываемое личностью медицинского работника на психику пациента носит название	
терапевтическим общением	+
нетерапевтическим общением	
Боли и чувство скованности в суставах по утрам свидетельствуют	
о ревматоидном артрите	+
о парезе	
об остеохондрозе	
о наличии вирусной инфекции	
Боли при остром холецистите возникают	
постепенно в эпигастрии	
внезапно в левом подреберье	
внезапно в правом подреберье	+
постепенно в правой подвздошной области	
Боль в месте перелома костей таза усиливается при надавливании на	
голову	
пятки	
крылья подвздошных костей	+
живот	
Больные СПИДом наиболее опасны для окружающих	
в инкубационном периоде	
в скрытом периоде (бессимптомная фаза)	+
в терминальной стадии	
Больным с отеками, одышкой при заболеваниях сердца ограничивают прием	
свежевыжатых соков	
белка животного происхождения	
поваренной соли	+
продуктов, богатых клетчаткой	
свежевыжатых соков	
В дополнительной диспансеризации участвуют	
терапевт, акушер-гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог, эндокринолог	
терапевт, акушер-гинеколог, хирург, уролог, офтальмолог	
терапевт, акушер-гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог	+
терапевт, акушер-гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог, андролог	

В клинике острого геморрагического инсульта преобладает	
очаговая неврологическая симптоматика	
общемозговая симптоматика	+
боль в груди	
затрудненное дыхание	
В клинике острого ишемического инсульта преобладает	
очаговая неврологическая симптоматика	+
общемозговая симптоматика	
боль за грудиной	
В момент прободения желудка или 12-перстной кишки наиболее часто встречается	
тахикардия	
схваткообразная боль	
внезапно возникшая острая боль	+
жидкий стул	
В основе развития приступа удушья при бронхиальной астме лежит	
острый бронхоспазм, гиперсекреция слизистой бронхов	+
влажный кашель	
гипосекреция слизистой бронхов	
отхождение большого количества мокроты	
В основе ревматоидного артрита лежит	
деструктивный полиартрит	+
дегенерация и деструкция суставного хряща	
нарушение пуринового обмена	
метаболическое поражение костей	
В ответ на введение вакцины могут возникнуть	
местные, общие реакции и осложнения	+
инфекционное заболевание против которого проводится вакцинация	
потеря слуха, обоняния	
В прививочном кабинете необходимо наличие следующих лекарственных средств	
противошоковые и средства экстренной профилактики ВИЧ-инфекции	+
противотуберкулёзные препараты	
специфические сыворотки	
В родах постоянно оценивается все, кроме	
жалобы роженицы	
состояние сердечно-сосудистой системы	
активность родовой деятельности и состояние плода	
функции кишечника	+
В течении хронического гломерулонефрита различают следующие клинические формы	
нефротическую, латентную, гипертензионную, гематурическую, нефротическую, смешанную	+
нефротическую, латентную, гематурическую, нефротическую, смешанную	
нефротическую, латентную, гипертензионную, генерализованную, нефротическую, смешанную	
гипертензионную, гематурическую, нефротическую, смешанную	
В этиологии сахарного диабета I типа играют роль	
бактериологическая инфекция	
ожирение	
наследственность	+
сниженный иммунитет	
Важное значение в диагностике ревматоидного артрита имеет	
общий анализ крови	
общий анализ мочи	
рентгенография грудной клетки	
рентгенография суставов	+
Вакцинатору при отказе пациента от вакцинации и письменного оформления отказа следует	
не предпринимать никаких мер	
зафиксировать данный факт в медицинской документации пациента и завизировать его	
оформить акт от отказа в присутствии второго медицинского работника, завизировать его обоим	+
Ведущий метод выявления туберкулёза органов дыхания	
иммуноферментный метод	

ФГ-обследование	+
туберкулодиагностика	
Ведущий симптом сквозной раны	
повреждение кожи	
наличие входного отверстия	
наличие выходного отверстия	
наличие входного и выходного отверстия	+
Венозные жгуты на конечности накладывают при	
бронхиальной астме	
стенокардии	
отёке легких	+
циррозе печени	
Виды ответственности медицинских работников	
дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая, административная	+
социальная ответственность	
материальная ответственность	
Вирусный гепатит С передается путями	
парентеральным	+
контактно-бытовым	
воздушно-капельным	
Витамин В12 называется	
рибофлавином	
пиридоксином	
цианкоболамином	+
фолиевой кислотой	
ВИЧ поражает в первую очередь	
сердечно-сосудистую систему	
иммунную систему	+
дыхательную систему	
Во флаконе разведено 1000000 ЕД бензилпенициллиновой соли в 5мл растворителя. Пациенту назначено ввести 750000 ЕД в/м. Необходимо набрать антибиотика на одну инъекцию	
0,75	
3,75	+
2	
Возбудителем дизентерии является	
сальмонелла	
коринебактерия	
вирус	
шигелла	+
Возможное осложнение аппендицита	
механическая кишечная непроходимость	
заворот кишечника	
разлитой перитонит	+
ущемление петли кишечника	
Возможные осложнения при кори	
стеноз гортани	+
неврит	
жидкий стул	
Возможные причины гематомы при в/в инъекции	
прокол обеих стенок вены	+
повышенная свертываемость крови	
нарушение правил асептики и антисептики	
Возможные причины предлежания плаценты не включают	
повышение трофобластических свойств плодного яйца	
дистрофические процессы в эндометрии	
воспалительные процессы в эндометрии	
аномалии развития плода	+
Возможные пути передачи ВИЧ инфекции	
контактно-бытовой	
фекально-оральный	
половой	+
воздушно-капельный	

Восприимчивость человека к туберкулёзу усиливается при наличии отрицательных факторов	
биологических	+
негативное отношение к флюорообследованию	
несбалансированное питание	
Выбор рекомендуемой диеты при мочекаменной болезни зависит от	
химического состава камней	+
веса больного	
частоты приступов почечной колики	
Галлюцинации – это	
чувство восприятия при отсутствии соответствующего внешнего объекта	+
искажение восприятия	
выпадение полей зрения	
чувство вины	
Герметичный непрокальваемый контейнер для острого инструментария может использоваться	
не более 24 часов	
не более 8 часов	
не более 72 часов	+
Госпитализация необходима при локализации фурункула	
в области живота	
в области плеча	
в области лица, носа	+
Гражданам, отнесенным к I и II группам состояния здоровья, для дальнейших рекомендаций врачей-специалистов по здоровому образу жизни рекомендуется посещение	
поликлиники по месту жительства	
диспансеру по месту жительства	
центра здоровья	+
офиса врача общей практики	
Гражданин Российской Федерации	
имеет право отказаться от прививок, не подписывая отказа от прививок	
имеет право отказаться от прививок за исключением прививок против особо опасных инфекций, проводимых по эпидемиологическим показаниям	+
имеет право отказаться от прививок, подписать отказ	
не имеет права отказаться от прививок	
Дезинфектант, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования	
лизафин	+
абактерил хлор	
хлормисепт люкс	
Дезинфектант, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования	
сайдекс	
септодор-форте	+
стераниос	
Деменция – это	
легкая степень слабоумия	
тоскливое угнетенное сознание	
слабоумие, приобретенное в результате органического поражения головного мозга	+
врожденное слабоумие	
Деформирующим остеоартрозом чаще болеют	
дети	
подростки	
женщины старше 40 лет	+
мужчины младше 40 лет	
Длительное угнетённо-подавленное настроение с мрачной оценкой прошлого и настоящего и пессимистическими взглядами на будущее называется	
эйфорией	
депрессией	+
дисфорией	
манией	
Длительность боли при стенокардии	
не более 20 минут	+

1	
3	
сутки	
Длительность инкубационного периода при гриппе	
1-10 дней	
от 12-24 часов - до 5 дней	+
2-7 дней	
Длительность приступа подагры	
5-7 дней	+
до 14 дней	
1	
30	
Для апоплексии яичника характерно все, кроме	
внизу живота	
внутреннего кровотечения	
отрицательных биологических реакций на беременность	
выраженного лейкоцитоза	+
Для блокирования поступления лекарства- аллергена в кровь, место его введения обкалывают	
раствором мезатона	
раствором адреналина	+
раствором новокаина	
наложить жгут на нижние конечности	
Для водянки беременных не характерно	
повышение АД	+
повышение содержания хлоридов в тканях	
гипопротеинемия	
снижение диуреза	
Для восстановления лиофилизированных вакцин следует использовать	
соответствующий растворитель любого производителя	
воду для инъекций в ампулах	
соответствующий растворитель того же производителя, поступивший вместе с данной партией вакцины	+
растворитель для любой другой лиофилизированной вакцины, который имеется в наличии	
Для гипофункции щитовидной железы характерны	
сухость кожных покровов, склонность к запорам, брадикардия, сонливость	+
потери в массе тела	
потливость	
повышение пульса	
Для грибковых поражений кожи характерно все перечисленное, кроме	
яркой гиперемии с нечеткими границами	+
незначительной гиперемии	
четких границ поражения	
слегка возвышающихся краев	
мелкоотрубевидного шелушения	
Для диагностики ВИЧ-инфекции используется	
иммуноферментный анализ	+
гемокультура	
анализ на бактериологическое исследование	
общий анализ мочи	
Для диагностики ранних сроков беременности наиболее важное значение имеют	
оценка сомнительных признаков беременности	
оценка вероятных признаков беременности	
данные влагалищного исследования	
иммунологические тесты на беременность	+
Для инфаркта миокарда характерны	
Сжимающие боли за грудиной, снимающиеся приемом нитроглицерина	
сжимающие и давящие боли за грудиной, длящиеся свыше 40- 60 минут, с холодным потом	+
боли в левой половине грудной клетки, кровохарканье	
приступ экспираторного удушья с дистанционными сухими храпами	
Для инфаркта миокарда характерны	

сжимающиеся боли за грудиной, снимающиеся приемом нитроглицерина	
боли в левой половине грудной клетки, кровохарканье	
приступ экспираторного удушья с дистанционными сухими хрипами	
сжимающие и давящие боли за грудиной длящиеся свыше 40-60 минут с холодным потом	+
Для крупозной пневмонии характерно	
румянец на лице с той стороны где воспалилась доля, синий оттенок кожи лица, губ, рук и ног	+
пульс 80-90 уд/мин	
одышка отсутствует	
влажный кашель	
Для купирования болей при стенокардии применяются	
внутримышечное введение но- шпы	
нитроглицерин	+
наркотические анальгетики	
ингаляции сальбутамола	
Для лечения больных ИБС применяют	
омез, но- шпу	
анальгин, спазган, верошпирон	
анаприллин, атенолол, беталок	+
изадрин, сальбутамол, алупент	
Для обработки кожи больного перед в/м инъекцией используют	
2 ватных шарика, смоченных 70 спиртом	+
1 ватный шарик, смоченный 90 спиртом	
1 ватный шарик, смоченный 70% спиртом, 2- ой ватный шарик сухой	
Для острого гломерулонефрита характерно	
отеки на ногах, цианоз	
отеки на лице, гематурия	+
снижение АД	
боли в пояснице, пиурия	
Для перелома основания черепа характерен симптом	
"очков	+
Кернига	
Брудзинского	
Для повышенной функции щитовидной железы характерны	
повышение массы тела	
гипотония	
постоянное сердцебиение, дрожание конечностей, мышечная слабость	+
повышение глюкозы в крови	
Для преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты характерны	
внутреннее и наружное кровотечение, гипоксия плода	
внутреннее кровотечение, гипоксия плода и гипертонус матки	
внутреннее кровотечение с возможным наружным кровотечением, гипоксия плода, гипертонус матки у беременной с гестозом	+
Для приступа стенокардии характерны	
колющие боли в области сердца при волнении	
давящие загрудинные боли с иррадиацией в левую руку, снимающиеся нитроглицерином	+
ощущение « кома» в горле	
боли не снимаются приемом нитроглицерина	
Для приступа стенокардии характерны	
боли в левой половине грудной клетки, усиливающиеся при наклоне туловища	
ноющие боли в области сердца при волнении	
сжимающие, давящие боли за грудиной при физической нагрузке, проходящие в покое	+
Колющие боли под левой лопаткой, усиливающиеся при кашле, глубоком дыхании	
Для приступа удушья при бронхиальной астме характерно	
вынужденное положение сидя, удушье носит экспираторный характер	+
холодный липкий пот	
отходит пенистая розовая мокрота	
Для профилактики гриппа используется	
вакцина	+
сыворотка	

иммуноглобулин	
Для сахарного диабета 1 типа характерны	
раздражительность, плаксивость	
зуд кожи, расчесы на коже	
повышенный аппетит	
тошнота, рвота, наличие запаха ацетона в выдыхаемом воздухе, усиленная жажда	+
Для сотрясения головного мозга характерно	
кома	
ретроградная амнезия	+
антероградная амнезия	
конградная амнезия	
Для шизофрении характерны следующие синдромы	
судорожный	
галлюцинаторно-параноидальный, депрессивный, кататонический	+
дистрофии	
Для эпилепсии характерны	
обстоятельное мышление, дисфория	+
галлюцинации	
агония	
Доврачебная помощь при гипертоническом кризе	
уложить больного, убрать яркий свет, шум, при эмоциональном возбуждении – 30 капель корвалола	+
уложить больного, дать ватку с нашатырным спиртом	
посадить больного, дать кислород, наложить жгуты на конечности	
посадить больного, дать под язык таблетку нитроглицерина	
Доврачебная помощь при обмороке	
вести строфантин, провести ингаляцию увлажненного кислорода	
уложить с приподнятым ножным концом, дать понюхать нашатырный спирт	+
дать нитроглицерин под язык, усадить	
горчичник на область сердца	
Доврачебная помощь при обмороке	
вести строфантин, ингаляция увлажненного кислорода	
дать нитроглицерин под язык, усадить	
горчичник на область сердца	
уложить с приподнятыми ножным концом	+
Доврачебная помощь при отёке легких	
уложить с приподнятым ножным концом	
придать положение ортопноэ, провести ингаляцию увлажненного кислорода, наложить жгуты-турникеты	+
горчичник на область сердца	
дать 30 капель корвалола	
пузырь со льдом на область сердца	
Документы прививочного кабинета для всех медицинских организаций	
журнал учета профилактических прививок; журналы поступления и расходования МИБП; копии отчетов о расходовании МИБП	
журналы контроля температурного режима работы холодильников для хранения вакцины; журнал учета выданных сертификатов профилактических прививок; журнал регистрации и учета сильных (необычных) реакций на прививки и поствакцинальных осложнений; экстренное извещение об инфекционном или паразитарном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, поствакцинальном осложнении	
все вышеперечисленное	+
Дополнительная диспансеризация проводится учреждениями здравоохранения	
Санитарно-эпидемиологическими службами	
государственной системы здравоохранения	+
частной системы здравоохранения	
Дополнительные консультации врачей-специалистов, дополнительное обследование и лечение в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях с целью установления диагноза и/или проведения соответствующего лечения не входят в объем дополнительной диспансеризации и оплачиваются отдельно за счет средств	
гражданина	
медицинской организации, направившей гражданина	
ОМС	+

ДМС	
Допускается замораживание	
живых вирусных вакцин	+
адсорбированных вакцин	
растворителей для лиофилизированных вакцин	
вакцин против гепатита В	
Единицей учета вакцинных препаратов является	
упаковка	
ампула	
доза	+
мл	
Если человек нуждается в вакцинации против кори и вирусного гепатита В, то соответствующие моновакцины разрешено ввести	
одновременно в одном шприце	
одновременно в разных шприцах	+
с интервалом в 3 месяца	
с интервалом в 6 месяцев	
Железодефицитные анемии	
нормохромные	
гиперхромные	
гипохромные	+
Желтуха характерна для анемии	
гипопластической	
гемолитической	+
железодифицитной	
витамин В12- дефицитной	
Желчь выполняет следующие функции	
расщепляет белки	
расщепляет углеводы	
способствует всасыванию жирорастворимых витаминов, повышает активность липазы	+
Задержка мочи (анурия) может возникнуть при	
сахарном диабете	
хроническом пиелонефрите	
острой почечной недостаточности, мочекаменной болезни	+
Замена перчаток при выполнении манипуляций в процедурном кабинете	
1 пара перчаток на 3-5 пациентов	
1 пара перчаток на 10 пациентов	
1 пара перчаток на 1 пациента	+
1 пара перчаток на смену	
Замораживание адсорбированных вакцин может произойти при	
при соприкосновении с поверхностью замороженного хладоэлемента	+
несоблюдении правил кондиционирования хладоэлементов	
при несоблюдении температурного режима	
использовании индикаторов замораживания	
Запах изо рта при гипергликемической коме	
тухлым	
ацетоном	+
сладковатый	
мочевины	
Заподозрить некроз миоматозного узла можно у пациентки имеющей в анамнезе	
роды	
прерывание беременности	
миому матки	+
кисту яичника	
Заражение при контакте с ВИЧ-инфицированным пациентом может произойти при	
уколе иглой	+
бытовом контакте	
укусе кровососущих насекомых	
посещении плавательного бассейна	
Из рациона питания при подагре необходимо исключить	
картофель	

морковь	
огурцы	
мясо	+
Изоляция для носителей ВИЧ-инфекции	
не нужна	+
необходима	
Инкубационный период гепатита "А"	
до 35 дней	+
до 6 месяцев	
до 1 года	
Инкубационный период при СПИДе	
7 дней – 14 дней	
3 недели – 3месяца- 1год	+
5-15 лет	
Инородное тело в наружном слуховом проходе удаляется	
медицинской сестрой	
ЛОР- врачом	+
любым врачом	
Инструментальные методы исследования при заболеваниях ЖКТ	
рентгенологическое исследование желудка, эндоскопическое исследование, ирригоскопия	+
компьютерная томография лёгких	
М-эхо, ЭКГ	
суточное мониторирование глюкозы	
Инсулин вводится	
строго внутримышечно	
внутрикожно, шарик со спиртом не прикладывать	
подкожно	+
Инфекционное заболевание, передающееся при выполнении небезопасной инъекции	
полиомиелит	
корь	
гепатит В	+
дифтерия	
Информировать прививаемых о возможных реакциях и осложнениях после введения вакцины	
не следует, это может привести к отказу от прививки	
следует	+
следует только в случае проведения прививок по эпидемическим показаниям	
Использовать вакцину, восстановленную растворителем, поступившим с другой партией вакцины	
можно	
можно, если растворитель, поступивший одновременно с данной серией вакцины закончился	
только в случае крайней необходимости	
нельзя	+
Источник инфекции при краснухе	
больной человек	+
носитель	
животное	
Источник туберкулёзной инфекции	
больной человек, больное домашнее животное	+
воздух	
почва	
вода	
Источниками инфекции при бруцеллезе являются	
птицы	
крупный рогатый скот, свиньи	+
крысы	
больной человек	
Источники инфекции при дифтерии	
больной человек, бактерионоситель	+
грызуны	
птицы	

крупный рогатый скот	
Источники инфекции при СПИДе	
человек больной или носитель	+
животное больное	
насекомые	
К I группе здоровья относятся	
практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении	+
граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий	
граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях для уточнения (установления)	
граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стационара	
К III A группе здоровья относятся	
практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении	
граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий	
граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях для уточнения (установления)	+
граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стационара	
граждане с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи	
К III Б группе здоровья относятся	
практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении	
граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий	
граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях для уточнения (установления)	
граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стационара	+
К антигистаминным препаратам относятся	
фенкарол	+
римантадин	
фолиевая кислота	
фурамаг	
К вербальным средствам общения относятся	
поза	
речь	+
взгляд	
жест	
К группе риска по туберкулёзу находятся	
городские жители	
мигранты, бомжи	+
сельские жители	
К клиническим симптомам острого сальпингоофорита относятся все, кроме	
повышение температуры, озноб	
нарушение менструального цикла	
боли в эпигастрии	+
гнойные выделения из половых путей	
К основным этиологическим факторам хронического гепатита относятся	
бактерии	
продукты питания	
аллергия	
аутоиммунные процессы	+
К показаниям для занятия лечебной гимнастикой беременной женщиной относится	
угроза прерывания беременности	
тяжелый токсикоз	
преэклампсия	
нормально протекающая беременность	+
К признакам кардиогенного шока относятся	

снижения АД, холодный липкий пот, мраморный рисунок периферических участков конечностей	+
бессознательного сознания	
повышение АД, частый пульс	
сухие кожные покровы, сухой кашель	
К развитию пневмонии предрасполагают	
повышенное артериальное давление	
наследственность	
сердечно - сосудистые заболевания	
хронический бронхит, переохлаждение	+
К ранним осложнениям инфаркта миокарда относятся	
воспаление легких, пневмония	
сахарный диабет	
кардиогенный шок	+
синдром Дресслера	
К рентгенологическим методам исследования мочевыделительной системы относятся	
цистоскопия	
сканирование	
катетеризация мочевого пузыря	
урография	+
К симптомам желудочно-кишечного кровотечения относятся	
рвота цвета «кофейной гущи» или кровавая рвота	+
головные боли, повышение АД, брадикардия	
жидкий обесцвеченный стул	
повышение уровня гемоглобина	
К симптомам острого гломерулонефрита относят	
полиурия	
моча цвета «мясных помоев»	+
моча мутная с хлопьями	
снижение АД	
К симптомам острого пиелонефрита относятся	
олиго-анурия	
повышение АД	
моча мутная с хлопьями	+
моча цвета «мясных помоев»	
К твердым повязкам относится	
бинтовая	
гипсовая	+
клеевая	
давящая	
К факторам риска гипертонической болезни относятся	
язвенная болезнь	
переохлаждение	
дефицит массы тела	
низкая физическая активность, хронический стресс, наследственное предрасположение	+
К факторам риска гипертонической болезни относятся	
избыточное потребление соли, наследственность	+
язвенная болезнь	
избыточный вес	+
бактерии , вирусы	
К факторам риска ИБС относятся	
артериальная гипертензия, ожирение, курение	+
переохлаждение	
резкий отказ от курения, алкоголя	
анорексия	
Каждый случай поствакцинального осложнения, при котором пациент попадает в больницу или наступает смерть	
подлежит расследованию в обязательном порядке главным врачом поликлиники	
подлежит расследованию в обязательном порядке врачом эпидемиологом	
подлежит расследованию в обязательном порядке комиссионно	+
расследованию не подлежит	

Классификация гастритов	
аутоиммунные типы А, бактериальные типы В, химические типы С	+
аллергические	
небактериальные	
травматические	
Клинические симптомы гипогликемической комы	
кожные покровы влажные, тонус мышц повышен, судороги	+
снижение артериального давления	
кожные покровы сухие	
запах ацетона изо рта	
Клиническая смерть продолжается	
несколько минут	+
несколько часов	
до суток	
несколько секунд	
Клинические проявления кетоацидотической комы	
кожный покров бледный, сухой, дыхание Куссмауля, запах ацетона в выдыхаемом воздухе	+
повышенная температура тела	
гипертензия	
кожные покровы влажные, гиперемированные	
Клинические проявления характерные для СПИДа	
увеличение лимфоузлов, диарея	+
увеличение веса тела	
булимия	
гематурия	
Ко II группе здоровья относятся	
практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении	
граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий	+
граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях для уточнения (установления)	
граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стационара	
Контактным с больными вирусным гепатитом "А" вводится	
иммуно-глобулин	+
интерферон	
сыворотка	
Контаминация вакцины может быть причиной	
"холодного" абсцесса	
афебрильных судорог	
токсического шока	
сепсиса	+
Корм для аквариумных рыбок относится к группе	
пищевых аллергенов	
бытовых аллергенов	+
пыльцевых аллергенов	
химических аллергенов	
Критерием степени выраженности местных вакцинальных реакций является	
все проявления возникшие в месте введения препарата	+
повышение температуры тела	
размер инфильтрата, наличие нагноения	
наличие нагноения, развитие лимфаденита	
Критериемоценки качества иммунопрофилактики являются	
снижение заболеваемости населения	
увеличение продолжительности жизни населения	
показатели заболеваемости инфекциями, "управляемыми", вакцинацией	+
Критериям эффективности непрямого массажа сердца является	
сужение зрачков	
появление пульсации на сонных артериях	+
максимальное расширение зрачков	
непроизвольная дефекация	
Кровохарканье может развиваться при	

рак лёгкого	+
ОРВИ	
хронический бронхит	
пневмония	
Курение может привести к	
не оказывает влияние на беременность	
может привести к чрезмерной родовой деятельности	
гипотрофия плода	+
гипертрофия плода	
Лейкопластырные повязки относятся к	
давящим	
клеевым	+
твердым	
жидким	
Лимфаденит – это воспаление	
потовых желез	
лимфатических узлов	+
сальных желез	
лимфатических сосудов	
Лица, находившиеся в контакте с инфекционными больными разобщаются со здоровыми людьми при	
сальмонеллезе	
инфекционном мононуклеозе	
менингококковой инфекции	+
вирусном гепатите	
Малый родничок является проводной точкой при	
переднем виде затылочного предлежания	+
заднем виде затылочного предлежания	
лобном предлежании	
переднетеменном предлежании	
Медицинская психология не изучает	
деятельность медицинского персонала	
психологию больных	
роль психических факторов в возникновении психосоматических заболеваний	
психологический климат учреждений	+
Медицинские отходы класса Б и В должны собираться	
в сертифицированную упаковку с цветовой маркировкой	
в сертифицированную герметичную упаковку с цветовой маркировкой	+
в мусорные контейнеры	
Медицинские работники, осуществляющие прививки, должны быть вакцинированы (с учётом возраста, а также инфекционного и прививочного анамнеза) против	
кори, гепатита В	
дифтерии, краснухи	
гепатита В, столбняка, дифтерии, кори, гриппа, краснухи	+
коклюша	
Медсестра рекомендует пациенту использовать карманный ингалятор при	
кровохаркании	
удушьи	+
болях в грудной клетке	
болях в сердце	
Мероприятия в инфекционном очаге брюшного тифа	
разобщение контактных на 21 день	
однократное бактериологическое исследование кала и мочи на наличие бактерий тифо-паратифозной группы	+
двухкратное бактериологическое исследование кала и мочи и однократное желчи на наличие бактерий тифо-паратифозной группы	
разобщение контактных на 7 дней	
Мероприятия в инфекционном очаге вирусного гепатита (болезнь Боткина)	
изоляция больного на 30 дней от начала болезни, «Д» наблюдение за переболевшими в течение 6 месяцев	+
разобщение контактных на 30 дней	
проводится разобщение контактных лиц на 45 дней	
разобщение контактных не проводится	

Мероприятия в инфекционном очаге гриппа	
очаговая дезинфекция	
влажная уборка и проветривание помещения	+
разобщение контактных на 7 дней после последнего случая заболевания	
бывшие в контакте с больными, не привитые и не болевшие подлежат срочной иммунизации	
Мероприятия в инфекционном очаге дифтерии	
дезинфекция помещения не проводится	
разобщение контактных не проводится	
очаговая дезинфекция помещения	+
прививают всех, не получивших прививку в течение последних 10 лет и не имеющих противопоказаний	
Мероприятия в инфекционном очаге кори	
влажная уборка, проветривание помещения	
экстренная профилактика иммуноглобулином	
разобщение контактных, не болевших и не привитых на 17 дней, а при введении иммуноглобулина - на 21 день	+
двухкратное бакобследование контактных	
Мероприятия в инфекционном очаге менингококковой инфекции	
изоляция больного клинического выздоровления и двухкратного отрицательного бактериологического исследования с интервалом 1-2 дня	+
изоляция больного на 21 день	
разобщение контактных на 10 дней после последнего случая заболевания в очаге	
двухкратное бакобследование контактных	
Мероприятия в очаге дизентерии	
дезинфекция помещения не проводится	
кварцевание и проветривание помещения	
дезинфекция посуды и остатков пищи, медицинское наблюдение за контактными в течение 7 дней после изоляции пациента	+
разобщение контактных на 14 дней	
Меры профилактики анафилактического шока	
ведение ЗОЖ	
прием активированного угля, энтеросорбента	
периодический прием антигистаминных препаратов	
уточнение аллергологического анамнеза непосредственно перед инъекцией	+
Методы диагностики анемий	
клинический анализ крови	+
пункция печени	
общий анализ мочи	
биохимический анализ крови	
Мойку холодильника в прививочном кабинете необходимо проводить не реже, чем	
раз в неделю	
раз в 1 мес	+
раз в 3 мес	
раз в 6 мес	
Моча "цвета пива" - симптом	
острого вирусного гепатита	+
желудочного кровотечения	
Моча цвета «мясных помоев» может быть при	
МКБ	
остром гломерулонефрите	+
раке почки	
тромбозе сосудов почек	
На микробактерии туберкулёза губительно действует	
замораживание	
высушивание	
ультрафиолетовое облучение	+
На обожженную поверхность накладывают	
сухую асептическую повязку	+
повязку с раствором чайной соды	
повязку с синтомициновой эмульсией	
На основании СанПиН 2.1.3.2630-10 не рекомендуется	
стирать спецодежду на дому	+

устраивать сквозные проветривания палат	
проводить кварцевание палат	
наносить дезинфицирующие средства на стены на высоту вытянутой руки	
Наиболее аллергизирующей способностью из лекарственных препаратов обладает	
зуфиллин	
пенициллин	+
преднизолон	
димедрол	
Наиболее безопасным способом прерывания беременности на малом сроке является	
медикаментозный аборт	+
эвакуация плодного яйца кюреткой	
введение гипертонического раствора в полость матки	
вакуум-аспирация матки	
Наиболее вероятные сроки развития поствакцинальных осложнений (кроме аллергических) после введения живых вакцин	
первые 24 ч	
первые 1-2 дня	
5-14 дни	+
2-6 мес	
Наиболее опасны для заражения ВИЧ-инфекцией биологические жидкости	
кровь, сперма	+
моча, кал	
слюна, пот	
Наиболее характерным признаком бронхиальной астмы является	
одышка при физической нагрузке	
кашель с отхождением «ржавой мокроты»	
приступы удушья	+
удушливый кашель	
кровохарканье	
Наиболее частая локализация внелёгочного туберкулёза	
периферические лимфоузлы, перикард, кости, суставы	
мочеполовая система, кости, суставы, периферические лимфоузлы	+
глаза, центральная нервная система, мочеполовая система	
Наиболее частой причиной кровотечения в первом триместре беременности является	
полип и рак шейки матки	
предлежание плаценты	
разрыв матки	
угрожающий или начавшийся самопроизвольный аборт	+
Наиболее частой причиной смерти при коме является	
аспирационные и обтурационные нарушения дыхания	+
запредельные угнетения АД и дыхания	
нарушение двигательных функций	
Наиболее частый путь заражения микобактерией туберкулеза	
пищевой	
аэрогенный	+
лимфогенный	
гематогенный	
Наиболее эффективные наружные средства при герпетических высыпаниях на губах	
мазь с преднизолоном	
мазь ацикловир, зовиракс	+
мазь тетрациклиновая	
мазь гепариновая	
Наказания, входящие в дисциплинарную ответственность	
Строгий выговор	
замечания, выговор, увольнение	+
Материальное взыскание	
Направление в работе участковой медицинской сестры, являющееся приоритетным, в соответствии с приказами МЗ №8 16 и № 490	
организационное	
лечебно-диагностическое	
профилактическое	+
повышение профессиональной квалификации	

обеспечение инфекционной безопасности	
Началом родов следует считать	
прижатие головки к входу в малый таз	
появление нерегулярных схваток	
появление регулярных схваток	
появление регулярных схваток, приводящих к укорочению и сглаживанию шейки матки	+
Не допускается замораживание	
живых комбинированных вакцин	
адсорбированных вакцин	+
лиофилизированных вакцин	
Независимое сестринское вмешательство при болях в суставах	
придать удобное положение в постели	+
ввести обезболивающее	
ввести противовоспалительные средства	
провести тепловые процедуры	
Необходимым условием оформления трудового отношения медицинских работников являются	
Сообщение на предыдущее место работы	
заключение трудового договора, ознакомление с должностными инструкциями, внесение записи в трудовую книжку	+
Выдача справки о месте работы	
Неотложная помощь м/с на догоспитальном этапе при кровотечениях из желудка и двенадцатиперстной кишки	
промыть желудок и госпитализировать	
строгий постельный режим, холод на эпигастрии, госпитализация	+
ввести сосудосуживающие средств и госпитализация	
усадить пациента, напоить сладким чаем	
Неотложная помощь при прободении язвы желудка	
холод на живот и внутрь кусочки льда	
обезболивающие и холодное питье	
промыть желудок и срочно госпитализировать	
холод на живот и срочно госпитализировать	+
Неотложная помощь при черепно-мозговой травме	
применение наркотиков	
применение противорвотных препаратов	
срочная госпитализация, пузырь со льдом на голову	+
применение кордиамина	
Неотложные состояния возникающие при гриппе	
острая дыхательная недостаточность	+
легочное кровотечение	
крапивница	
Непосредственно после прививки пациент должен находиться под наблюдением медицинского работника в течение	
1	
20	
30	+
15	
Непосредственной причиной возникновения приступа стенокардии может быть	
головокружение	
прогулка на свежем воздухе	
повышение артериального давления, волнение	+
горизонтальное положение больного	
Непрямой массаж сердца проводится в ритме	
10 – 20 надавливаний в минуту	
30 – 50 надавливаний в минуту	
60 – 70 надавливаний в минуту	
90 – 110 надавливаний в минуту	+
свыше 120 надавливаний в минуту	
Неспецифическая профилактика бешенства включает в себя следующие мероприятия	
пассивная иммунизация антирабическим иммуноглобулином	
местная обработка раны 20% мыльным раствором, струей с помощью катетера	+
прижигание раны	

накладывание швов на рану	
Нормальный уровень глюкозы в капиллярной крови натощак (по чистой глюкозе) составляет	
8,3 – 10,1 ммоль/л	
6,2 – 9,3 ммоль/л	
2,7 – 5,5 ммоль/л	
3,3 – 5,5 ммоль/л	+
Нормальными цифрами систолического давления являются	
60-70 мм. рт. ст	
75-85 мм. рт. ст	
100-120мм. рт. ст	+
145-160 мм. рт. ст	
Нормативно-правовая база медицинского права включает в себя	
конституцию РФ, основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека	+
Федеральные законы системы здравоохранения	
постановления и приказы правительства РФ в системе здравоохранения	
Нормативный документ МЗ, регламентирующий работу медицинского персонала по профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулёзом	
приказ № 490 от 2006г	
приказ № 408 от 1986г	
приказ № 342 от 1998г	+
приказ № 170 от 1994г	
Общение в деятельности медицинского работника – это	
обмен информацией	
обмен эмоциями	
обмен информацией и эмоциями	+
Общие принципы лечения подагры	
соблюдение антиподагрической диеты в течение всей жизни	+
голодание	
приём жаропонижающих	
приём антибиотиков	
Обязательность плановых прививок против инфекционных болезней определяется	
календарём прививок, рекомендованным ВОЗ	
Законом Российской Федерации "о лекарственных средствах	
Законом Российской Федерации "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней	+
Обязательные исследования при обострении хронического гастрита	
общий анализ крови и мочи, два теста на НР, УЗИ брюшной полости	+
анализ крови на скрытую кровь	
электрокардиография	
анализ крови на сахар	
Обязательным условием при проведении непрямого массажа сердца является	
наличие твердой поверхности	+
наличия валика под лопатками	
наличие двух реанимирующих	
Ожирение является фактором риска	
сахарного диабета	+
почечнокаменной болезни	
хронического гастрита	
Оклюзионная повязка применяется при	
венозных кровотечениях	
открытом пневмотораксе	+
ранение мягких тканей головы	
после пункции сустава	
Окончательная остановка кровотечения производится	
наложением жгута	
наложением зажима в ране	
перевязкой сосуда в ране	+
прижатием сосуда на протяжении	
Опасность возникновения воздушной эмболии существует при	
кровотечении из бедренной артерии	+
капиллярном кровотечении	

кровотечении из вен голени	
носовом кровотечении	
Опасность укушенных животными ран	
обширная зона повреждения	
сильное инфицирование, бешенство	+
обильное кровотечение	
повреждение кости	
Оптимальным положением для больного в коме является положение	
на спине с опущенным головным концом	
на спине с опущенным ножным концом	
на боку, на твердой горизонтальной поверхности	+
на животе	
Органы мишени при артериальной гипертензии	
желудок, кишечник	
головной мозг, сердце	+
легкие, мочевой пузырь	
печень, селезёнка	
Осложнением язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки не является	
рубцовый стеноз	
малигнизация	
кровотечение	
желтуха	+
Осложнения при переломе ключицы – это повреждение	
нижней доли легкого	
верхушки легкого	+
средостения	
сердца	
Осложнениями язвенной болезни являются	
кровотечение, прободение	+
цирроз	
панкреатит	
холецистит	
Основная жалоба при язвенной болезни 12-перстной кишки – это боль	
ранняя	
поздняя голодная, ночная	+
"кинжальная"	
опоясывающая	
Основная триада жалоб гинекологических пациентов	
боли, тошнота, кровотечения	
боли, бесплодие, бели	
боли, бели, кровотечения	+
бели, кровотечения, бесплодие	
Основной признак коматозного состояния	
утрата сознания, нарушение глубины дыхания, ослабление реакции на внешние раздражители	+
состояние зрачков и их реакция	
повышение АД	
кожные покровы красные, мокрые	
Основные жалобы больного при остром гастрите	
частое мочеиспускание	
запах ацетона изо рта	
тошнота и рвота съеденной пищей, боль в эпигастрии, слабость	+
повышение артериального давления	
Основные принципы терапии хронического гастрита	
воздействие на воспалительный процесс, купирование болевого синдрома, нормализация секреторной и моторной функций	+
стабилизация артериального давления	
нормализация глюкозы крови	
стабилизация пульса	
Основные симптомы ботулизма	
птоз	+
кишечное кровотечение	

жидкий стул	
желудочное кровотечение	
Основные симптомы выпадения прямой кишки	
боль при дефекации, примесь крови в каловых массах	+
интоксикация	
рвота	
Основные симптомы при клещевом энцефалите	
головная боль, лихорадка	+
катаральный синдром	
жидкий стул	
птоз	
Основные симптомы хронического гастрита	
повышенный аппетит	
синдром желудочной диспепсии, болевой синдром	+
изменение кожных покровов	
полифекалия	
Основным признаком остановки сердца является	
судороги	
отсутствие пульса на сонной артерии	+
узкие зрачки	
широкие зрачки	
Основными жалобами при гипертоническом кризе являются	
приступ удушья, кашель с пенистой мокротой	
головные боли, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, тошнота	+
головные боли, обморочные сознания, судороги	
тошнота, рвота с примесью желчи, боли в правом подреберье	
Основными клиническими симптомами острого панкреатита являются	
опоясывающий характер болей, тошнота	+
рвота, приносящая облегчение	
фибрильная лихорадка	
боли в пупочной области	
Основными принципами диеты больной с обострением язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки являются	
механически, химически, термически щадящая пища	+
ограничение поваренной соли	
питание 2-3 раза в день	
свежий хлеб	
Острые аллергические заболевания – это	
заболевания объемного характера	
системные заболевания аутоиммунной природы	
группа заболеваний, в основе которых лежит аллергическая реакция немедленного типа	+
Отвращение к мясной пище характерно для язвы	
малигнизированной	+
прободной	
неосложнённой	
стенозирующей	
Отсутствие пульса называется	
тахикардия	
брадикардия	
асистолия	+
экстрасистолия	
Отхаркивающим эффектом обладают	
трава термопсиса	+
настой листьев лопуха	
артишок	
корень женьшеня	
Отходы от больных туберкулёзом, анаэробной инфекцией и микологических больных согласно классификации, относятся к классу опасности	
В	+
Г	
Д	

Отходы процедурного кабинета, не требующие обязательной дезинфекции по вирусногепатитному режиму	
одноразовые шприцы	
перчатки	
постинъекционные шарики	
пустые ампулы лекарственных препаратов	+
пробирки с кровью	
Отходы, относящиеся к классу Г	
просроченные лекарственные препараты	+
органы удаленные при операции	
пищевые отходы инфекционных отделений	
отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 гр. патогенности	
Охлаждение ожоговой поверхности холодной водой показано	
в первые минуты после ожога в течении 10-15 минут	+
не показано	
при ожоге II степени	
Пациент имеет право	
на выбор палаты в ЛПУ	
на получение информации о правах, обязанностях и состоянии своего здоровья, отказ от медицинского вмешательства	+
на составление меню рациона питания	
Пациента с большой кровопотерей транспортируют	
сидя	
полусидя	
лежа с приподнятым головным концом на носилках	
лежа с опущенным головным концом на носилках	+
Пенистая кровь наблюдается	
при носовом кровотечении	
при пищеводном кровотечении	
при желудочном кровотечении	
при легочном кровотечении	+
Первая помощь при ушибе	
применение холода, хлорэтила	+
использование тепла	
госпитализация	
Первоочередным противошоковым мероприятием у больных с травмами является	
введение сосудосуживающих препаратов	
ингаляция кислорода	
остановка наружных кровотечений, обезболивание, иммобилизация	+
введение антибиотиков	
Первостепенными проблемами в острейшем периоде инсульта в первые часы являются	
контроль гемодинамики	+
уход за полостью рта, кормление	
контроль функции кишечника	
Перед использованием любой вакцины или растворителя к вакцине	
соответствует ли выбранная вакцина назначению врача; соответствует ли выбранный растворитель данной вакцине	
не истек ли срок годности вакцины и/или растворителя; нет ли видимых признаков повреждения флакона или ампулы	
нет ли видимых признаков загрязнения содержимого флакона или ампулы (наличие подозрительных на загрязнение плавающих частиц, изменение окраски, мутности и т. п.), соответствует ли внешний вид вакцины (до и после восстановления) ее описанию, приведенному в инструкции; для анатоксинов, вакцины против гепатита В и других сорбированных вакцин или для растворителей - нет ли видимых признаков того, что вакцина (растворитель) подвергалась замораживанию	
все вышеперечисленное	
Пероральный препарат, рекомендованный для борьбы с педикулезом	
бланизол	
неопин	
бутадион	+
Пневмотораксом называется скопление воздуха	
в пазуху носа	
в плевральной полости	+

в брюшной полости	
По Нечипоренко исследуют	
первую порцию мочи	
последнюю порцию мочи	
утреннюю, среднюю порцию мочи	+
По окончании обследования гражданина медицинские работники кабинета (отделения) медицинской профилактики получают из диагностических служб результаты проведенных лабораторных и функциональных исследований и передают их	
врачу-специалисту	
гражданину	
врачу-терапевту	+
старшему регистратору	
медицинскому эксперту	
Побочные реакции, наступающие после введения живых вирусных вакцин связаны с	
поствакцинальными осложнениями	
репликацией вакцинного вируса	+
индивидуальной реакцией организма на введение вакцины	
хроническими заболеваниями	
Повреждение нервных стволов может быть осложнением	
в/в вливаний	
п/к инъекций	
в/м инъекций	+
в/в капельных вливаний	
Повторно использовать одноразовые (уничтожаемые) шприцы	
можно для восстановления одинаковых вакцин	
нельзя использовать	+
можно для восстановления любых вакцин, если в наличии имеется только один шприц	
можно для иммунизации детей старше 2 лет	
Повязка, применяемая при носовом кровотечении	
лейкопластырная	
прямоугольная	+
"уздечка"	
циркулярная	
Под внедрением оплодотворенной яйцеклетки в эндометрий понимают	
имплантацию	+
менструацию	
овуляцию	
секрецию	
Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию сердца	
разъяснение сущности исследования	+
очистительная клизма	
проведение бронхоскопии	
проведение ЭКГ	
Показание к постановке влажного согревающего компресса	
боли в суставах	+
кожные заболевания	
высокая температура	
в животе	
Полное смещение суставных концов костей по отношению друг к другу -это	
перелом	
вывих	+
Краш-синдром	
растяжение	
Положения больного при носовом кровотечении	
лежа на спине, холод на спинку носа	
сидя с запрокинутой назад головой, холод на спинку носа	
сидя с наклоненной вперед головой, лоток под нос, холод на спинку носа	+
лежа на боку, лицом вниз, лоток под нос, холод на спинку носа	
Положительная реакция Манту у взрослого	
при наличии гиперемии 5мм	
при наличии папулы 2мм	

при наличии папулы 2мм и более	+
Пользоваться ингаляторами «Сальбутамол», «Астмолект», «Беротек» можно	
2 раза в сутки по 1 вдоху	
1-2 раза в сутки по 2 вдоха	
до 4 раз в сутки по 2 вдоха	+
Понятие "Врачебная тактика" предусматривается следующими нормативно-правовыми актами	
трудовой кодекс	
стандартами и порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями	+
приказами и постановлениями МЗ РФ	
Попадание конца иглы в просвет сосуда при подкожных и внутримышечных инъекциях может привести к	
масляной эмболии	+
тромбофлебиту	
абсцессу	
Поствакцинальным осложнением после введения вакцины ЖКВ является	
повышение температуры тела до 38,7оС	
макуло-папулезная сыпь	
гиперемия в месте введения препарата размером 1,5 см	
энцефалит	+
Поствакцинальными осложнениями после введения вакцины АДС-м являются	
повышение температуры тела до 38,7оС	
пронзительный крик ребёнка	
гиперемия в месте введения препарата размером 1,5 см	
афебрильные судороги	+
Потенциальная проблема при желчнокаменной болезни	
неукротимая, обильная рвота, не приносящая облегчения	
печеночная колика	+
дѣтеобразный стул	
Потрясавающий озноб, боли в грудной клетке, кашель с «ржавой» мокротой - симптомы	
ОРВИ	
крупозной пневмонии	+
бронхита	
очаговой пневмонии	
Появление внеочередного сердечного сокращения это	
экстрасистолия	+
брадикардия	
дефицит пульса	
асистолия	
Появление зудящих волдырей на коже после приема бисептола – это	
анафилактический шок	
отек Квинке	
крапивница	+
сывороточная болезнь	
Появление отека век и губ, после приема анальгина – это	
анафилактический шок	
Отек Квинке	+
крапивница	
сывороточная болезнь	
Появление симптома "очков" – кровоподтека в области глазниц характерно для	
ушиба уха	
ушиба глаза	
ушиба головы	
перелома основания черепа	+
Правами медицинских работников являются	
создание руководителем медицинской организации соответствующих условий для выполнения работником своих трудовых обязанностей, включая обеспечение необходимым оборудованием, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации; профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации	

профессиональную переподготовку за счет средств работодателя или иных средств, предусмотренных на эти цели законодательством Российской Федерации, при невозможности выполнять трудовые обязанности по состоянию здоровья и при увольнении работников в связи с сокращением численности или штата, в связи с ликвидацией организации; прохождение аттестации для получения квалификационной категории в порядке и в сроки, определяемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также на дифференциацию оплаты труда по результатам аттестации	
стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой и сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также конкретными результатами деятельности; создание профессиональных некоммерческих организаций; страхование риска своей профессиональной ответственности	
все вышеперечисленное	+
Правильность наложения компресса проверяют	
просунув палец под компресс	+
спросив пациента о состоянии компресса	
осмотрев компресс	
приложив термометр	
Предпочтительный метод стерилизации полимерных и резиновых материалов	
химический	
автоклавирование	+
плазменный	
воздушный	
Препарат для приёма внутрь, используемый в качестве противочесоточного средства	
спрегаль	
ивермектин	+
медифокс	
масло чайного дерева	
Препарат, оказывающий воздействие на спорообразующие микроорганизмы	
хлормисепт Р	
сайдекс	+
хлоргексидин	
Препараты, повышающие свёртываемость крови	
адреналин	
викасол, этамзилат	+
питуитрин	
фибринолизин	
гепарин	
При аллергических реакциях по типу крапивницы назначают препараты	
димедрол, тавегил, кетотифен	+
магния сульфат, эуфиллин	
мирамистин	
5% раствор глюкоз в/в капельно, витамины группы В	
При анафилактическом шоке необходимо ввести	
1% раствор диабозола внутривенно	
0,1% раствор адреналина на физиологическом растворе внутривенно, преднизолон 60- 90 мг внутривенно	+
1% раствор димедрола внутримышечно	
10% раствор кофеина п/к	
При аритмическом пульсе подсчет чаще производят в течение	
20 секунд, умножая на 6	
30 секунд, умножая на 2	
1	+
5	
При В12-дефицитной анемии в анализе крови характерно	
повышение количества эритроцитов	
снижение цветового показателя	
повышение моноцитов	
снижение количества гемоглобина, эритроцитов	+
При взятии крови из вены больной потерял сознание, кожные покровы бледные, АД 110/70 мм.рт. ст. пульс частый, удовлетворительных качеств. Это	
шок	
обморок	+

коллапс	
инфаркт	
все перечисленное верно	
При возникновении аварийной ситуации укола иглой медицинский работник в кратчайшие сроки обязан	
опросить пациента, обследовать пациента и медработника на ВИЧ-инфекцию, а также на HBsAg, анти-HCV	
при наличии ВИЧ у пациента – назначить экстренную ПКП заражения ВИЧ тремя антиретровирусными препаратами в течение первых 2-х часов, но не позднее 72 часов после аварийной ситуации по схеме	
при выявлении у пациента ВГВ, ВГС – консультация врача для выбора и назначения препаратов ПКП (начало приема препаратов – не позднее 72 часов после аварийной ситуации)	
поставить в известность руководителя отделения, учреждения, дежурного врача; связаться для консультации со специалистами СПИД-центра; зафиксировать ситуацию в журнале аварийных ситуаций	
все вышеперечисленное	+
При выборе термоконтейнеров для транспортировки вакцин учитывают	
производственную мощность термоконтейнера	
объем, продолжительность сохранения холода и тепла, вес, прочность хладагентов	+
наличие хлорфторуглеводородов в качестве хладагентов	
При гематоме кровь скапливается в	
полости сустава	
мягких тканях	+
плевральной полости	
околосердечной сумке	
При давящих болях за грудиной у больного ИБС медицинская сестра должна	
дать таблетку анальгина	
обеспечить физический и эмоциональный покой, доступ свежего воздуха	+
ничего из перечисленного	
дать таблетку парацетамола	
При деформирующем остеоартрозе отмечается	
усиление болей к вечеру	
утренняя скованность	
боль в пояснично - крестцовом отделе позвоночника	
стартовые боли	+
При деформирующем остеоартрозе в первую очередь поражаются	
лучезапястные суставы	
тазобедренные суставы	+
суставы кистей и стоп	
плечевые суставы	
При железодефицитной анемии в анализе крови отмечаются	
снижение количества эритроцитов, гемоглобина, повышение цветового показателя	
снижение количества эритроцитов, гемоглобина и цветового показателя	+
снижение количества эритроцитов и цветового показателя, содержание гемоглобина не изменено	
содержание эритроцитов не изменено, снижение гемоглобина и цветового показателя	
При использовании шприца, прикосаться руками можно	
к цилиндру шприца	+
к адаптеру шприца	
к кончику иглы	
При ишемической болезни сердца возможно развитие	
приступов стенокардии	+
гипертонического криза	
почечной колики	
инсульта	
При ишемической болезни сердца возможно развитие	
инфаркта миокарда	+
сахарного диабета	
приступа удушья	
почечной колики	

При классической форме ревматоидного полиартрита чаще поражаются	
коленные суставы	
тазобедренные суставы	
плечевые суставы	
мелкие суставы кистей и стоп	+
При кровотечении, с источником в желудке, кал бывает	
жирный, глинистый, мажущийся	
черный, дегтеобразный	+
светлый	
в виде "рисового отвара"	
При лечении средней степени ревматоидного артрита используют	
НПВП	+
антибиотики	
пребиотики	
антигистаминные	
При лечении тяжелых форм гриппа H1N1 применяют	
тамифлю	+
виферон	
циклоферон	
При массовом внутреннем кровотечении пульс	
урежается	
учащается	+
не изменяется	
При нарушении внеутробной беременности по типу трубного аборта отмечается все, кроме	
скудные кровянистые выделения	
боли внизу живота и в подвздошной области	
при влагалищном исследовании увеличение и болезненность придатков	
коллаптоидное состояние	+
При обмороке пациенту следует придать положение	
горизонтальное с приподнятыми ногами	+
горизонтальное без подушки	
сидя с опущенными ногами	
лежа на спине с опущенными ногами	
При обострении язвенной болезни противопоказан	
слизистый суп	
белый хлеб	
кисель	
наваристый бульон	+
При ожоге кисти кипятком накладывают повязку	
сходящуюся	
клеевую	
"варежка"	+
"перчатка"	
При острой задержке мочи выпускают	
быстро, надавливая на мочевого пузырь	
самотёком	
порциями по 800 мл с интервалом 5 мин	
порциями по 400 мл с интервалом 1-2 мин	+
При остром гломерулонефрите в моче отмечается	
протеинурия	+
глюкозурия	
лейкоцитоз	
пиурия	
При остром приступе глаукомы глаз	
бледный	
инъецирован с синюшным оттенком	+
обычного цвета	
желтый	
При остром приступе глаукомы глаз при пальпации	
мягкий	
твердый	+

жжение	
боль	
При остром приступе глаукомы зрачок имеет вид	
зрачок мутный	
зрачок узкий	
зрение снижено, зрачок широкий	+
острота зрения не изменена	
При остром приступе глаукомы появляются боли	
только в глазу	
во всей половине головы	+
болей не бывает	
при наклоне головы	
При перекруте ножки опухоли яичника наблюдается все, кроме	
сильные боли внизу живота	
неподвижная, резко болезненная опухоль внизу живота	
задержка мочеиспускания	+
синдром раздражения брюшины на стороне опухоли	
При переломе лодыжек, когда сохранен отек, накладывают гипсовую повязку	
мостовидную	
циркулярную	
При пиелонефрите питьевой режим	
ограниченный	
обычный	
усиленный	+
не имеет значения	
При подагре в анализе крови наиболее характерно	
увеличение СОЭ	
лейкоцитоз	
повышение уровня мочевой кислоты	+
появление ревматоидного фактора	
При подкожных инъекциях иглу вводят на глубину	
1/3 длины иглы	
2/3 длины иглы	+
чтобы скрылся просвет	
При подозрении на перитонит необходимо	
вести обезболивающее и госпитализировать	
вести антибиотик и положить грелку на живот	
дать холод на живот и госпитализировать	+
сделать очистительную клизму и промывание желудка	
При приеме препаратов железа у пациентов возможны	
поносы	
обесцвечивание кала	
потемнение зубов, окрашивание кала в чёрный цвет	+
желтушность склнр	
При приступе удушья у больного бронхиальной астмой медицинская сестра должна	
вызвать дежурного врача, помочь больному сесть в кровати, опереться руками на край кровати, наложить жгуты на нижние конечности	+
вести эуфиллин	
закрыть окно	
При прободении язвы желудка живот	
мягкий, слегка болезненный в нижних отделах	
доскообразный, резко болезненный в эпигастрии, кинжальная боль	+
умеренно напряжён, болезненный в правой подвздошной области	
доскообразный, слегка болезненный весь	
При проникающем ранении глаза, в рану вставлено инородное тело, его необходимо	
удалить, наложить бинокулярную повязку и лежа на носилках отправить в глазное отделение	
не трогать, наложить бинокулярную повязку и лежа на носилках отправить в глазное отделение	+
применить вату с целью наложения повязки	
промыть глаз	
При проникающих ранениях живота нельзя	

спешить с госпитализацией	
покрывать выпавшие органы салфеткой	
вправлять выпавшие органы	+
накладывать асептическую повязку	
При проявлении чесотки в коллективе необходимо	
сообщить в ЦГСЭН, провести профосмотр в коллективе	+
обработать все поверхности с моющим средством	
обработать кожу спиртом	
принять душ	
При ревматоидном артрите в анализе крови наиболее характерно	
увеличение СОЭ, лейкоцитоз	
повышение Нв	
повышение содержания С- реактивного белка	+
появление сиаловых кислот	
резкое снижение тромбоцитов	
При ревматоидном артрите возможно развитие	
желтухи	
влажного кашля	
деформации суставов	+
увеличение лимфоузлов	
При СПИДе наиболее пораженными являются	
лимфоциты	+
тромбоциты	
эритроциты	
При ущемлённой грыже необходимо	
вправить грыжу в брюшную полость	
готовить пациента к операции	+
ввести обезболивающее	
ввести спазмолитик	
При химических ожогах глаз экстренное промывание производится	
физиологическим раствором, водой комнатной температуры	+
водой	
крепким раствором марганцовокислого калия	
раствором альбуцида	
При хронических соматических заболеваниях изменение характера	
возможно	+
невозможно	
При хроническом гастрите – тип В основными принципами лечения являются	
эрадикация НР, антациды	+
спазмолитики	
анальгетики	
При язве двенадцатиперстной кишки боли появляются через	
0,5-1 час после еды	
2-3 часа после еды	+
сутки	
через 15 минут после еды	
Прием Креде – Лазаревича применяется для	
выделения неотделившегося последа	
выделения отделившегося последа	+
отделения плаценты наружным приемом	
Признак воздушной эмболии	
приступ удушья	+
судороги	
внезапное повышение АД	
Признак Шредера проявляется отклонением матки	
вправо и ниже пупка	
влево и ниже пупка	
вправо и выше пупка	+
влево и выше пупка	
Признак, характерный только для перелома	
кровоподтёк	
припухлость	

крепитация костных отломков	+
нарушение функции конечности	
Признаками эклампсии являются	
гипертензия	
альбинурия и отеки	
повышенная возбудимость	
судороги и кома	+
Признаки желудочной диспепсии	
тошнота, рвота, изжога	+
жжение за грудиной	
учащённый пульс	
понос, запор	
Признаком повышенного АД является	
пульс слабый, нитевидный	
пульс напряженный, ритмичный	+
пульс аритмичный, удовлетворительного наполнения	
пульс удовлетворительного наполнения и напряжения	
Приоритетная проблема пациента при ревматоидном артрите	
слабость	
одышка	
боли в эпигастрии	
утренняя скованность суставов	+
Приоритетная проблема при осложнении желчнокаменной болезни	
боль в животе	+
обезвоживание	
плохой аппетит	
спутанное сознание	
Приступ удушья, кашель с розовой пенистой мокротой - наиболее характерен для	
кардиогенного шока	
фибрилляции желудочков	
полной поперечной блокады	
отека легких	+
Причинами бронхиальной астмы являются	
вирусы, бактерии	+
свежий воздух	
физические нагрузки в тёплом помещении	
нерациональное питание	
Причинами поствакцинальных осложнений могут быть	
реактогенность препарата, индивидуальные особенности организма человека, ятрогенные факторы (технические погрешности и ошибки при проведении иммунизации)	+
проведение прививок в более поздние по сравнению с календарными сроками	
снижение прививочной дозы вакцины	
Причиной внезапной смерти может быть	
ХПН	
острый инфаркт миокарда	+
цирроз печени	
хронический гастрит	
Причиной местной воспалительной реакции на введение вакцины может быть	
нарушение техники проведения инъекции	
контаминация вакцины, контаминация иглы	+
введение вакцины в инкубационном периоде инфекционной болезни	
Причиной острого гломерулонефрита является	
золотистый стафилококк	
гемолитический стрептококк	+
кишечная палочка	
энтерококк	
Причины хронического воспаления двенадцатиперстной кишки	
употребление грубой пищи, острой, крепкие алкогольные напитки	+
гиподинамия	
повышенное артериальное давление	
повышение глюкозы крови	

Причины, вызывающие приступ почечной колики	
переохлаждение	
физические нагрузки	+
изменение метеоусловий	
чрезмерное употребление сахара	
Проба Зимницкого при хронической почечной недостаточности характеризуется	
высокой относительной плотностью во всех порциях	
нормальной относительной плотностью во всех порциях	
низкой относительной плотностью во всех порциях	+
Проблемы пациента при деформирующим остеоартрозе	
деформация суставов	+
припухлость суставов	
плохой аппетит	
боли в животе	
Продолжительность болевого синдрома при типичной клинике острого инфаркта миокарда	
5	
10	
20-30 минут, нескольких часов	+
несколько суток	
Продолжительность раннего послеродового периода	
1	
12	
2 – 4 ч	+
24	
Продукт который плохо переносят больные хроническим гастритом "А"	
творог	
сыр	
молоко	+
кефир	
Промывание желудка проводится	
при желудочном кровотечении	
при отравлениях таблетированными препаратами, суррогатами алкоголя	+
при переиздании	
Проникающее ранение живота – это повреждение	
кожи	
кожи и подкожной жировой клетчатки	
кожи, подкожной жировой клетчатки и мышц брюшной стенки	
кожи, подкожной жировой клетчатки, мышц и брюшины	+
Противопоказания при оказании неотложной помощи при повреждении барабанной перепонки	
введение в наружный слуховой проход сухой стерильной турунды или ватного шарика с борным спиртом	
промывание уха, удаление сгустков крови, высушивание	+
удаление сгустков крови	
Противопоказаниями для проведения плановой прививки являются	
иммунодефицитное состояние, иммуносупрессия, злокачественные болезни, беременность	
сильная реакция (температура выше 40С, отек на месте инъекции диаметром более 8 см) или серьезные осложнения на предыдущее введение вакцины	+
прогрессирующие заболевания нервной системы, наличие афебрильных судорог в анамнезе	
Профилактика воздушной эмболии	
тщательно вытеснить воздух из шприца	+
лекарственный препарат вводить медленно	
соблюдать правила асептики	
Профилактика гинекологических заболеваний включает в себя	
ограничение двигательной активности	
профилактический приём антибактериальных препаратов	
постоянное применение гинекологических орошений	
своевременное лечение последствий родовых травм	+
Профилактика острых пневмоний заключается в	
санации очагов инфекции	+
соблюдении диеты	

соблюдение режима дня	
соблюдение питьевого режима	
Профилактика поломки иглы при в/м инъекциях	
вводить иглу не до конца	+
вводить иглу под углом 45о	
вводить лекарственное средство только подкожно	
Профилактику столбняка необходимо провести при	
ушибе мягких тканей кисти	
закрытом переломе плеча	
колотой ране стопы	+
растяжении лучезапястного сустава	
Профилактические медосмотры на туберкулёз 1 раз в год проходят	
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву	
население в индивидуальном порядке	
работники родильных домов	
ВИЧ- инфицированные	
мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы	+
Профилактические медосмотры на туберкулёз 2 раза в год проходят	
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву	+
население в индивидуальном порядке	
больные сахарным диабетом	
мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы	
лица, находящиеся в тесном бытовом или профессиональном контакте с источником туберкулёзной инфекции	+
Проявление хронического гастрита с секреторной недостаточностью	
снижение аппетита, тошнота после приёма пищи, отрыжка с запахом тухлых яиц	+
частое мочеиспускание	
отрыжка кислым	
запах ацетона изо рта	
Проявления хронического гастрита с гиперсекрецией	
мучительная изжога, отрыжка кислым	+
понос	
отрыжка воздухом	
головная боль	
Пути передачи при бруцеллезе	
трансмиссивный	
парентеральный	
алиментарный	+
воздушно-капельный	
Пути попадания аллергена в организм	
с пищей, через рот, кожу	+
при прикосновениях	
рукопожатиях	
неправильной гигиены	
Пути распространения туберкулёза	
аэрогенный	+
через в/м инъекции	
через рентгеновский аппарат	
Путь передачи ветряной оспы	
воздушно-капельный	+
фекально-оральный	
контактно-бытовой	
половой	
Работа с медицинскими отходами регламентируется нормативным документом	
Сан ПиН 2.1.7.2790-10	+
СанПиН 2.1.3.1375-03	
ФЗ №89 "Об отходах производства и потребления	
кадастром отходов производства и потребления РФ	
Развитию атеросклероза и ИБС способствуют	
повышенная функция щитовидной железы	
ревматоидный артрит	
бронхиальная астма	

артериальная гипертензия	+
Развитию кандидоза способствуют	
прием витаминов группы «В»	
высокая температура	
иммунодефицит, сахарный диабет, прием антибиотиков	+
гипертоническая болезнь	
Развитию ожирения способствуют	
частое гипокалорийное питание небольшими порциями	
избыточное употребление растительной пищи	
избыточное потребление воды	
избыточное потребление углеводов, жиров	+
Развитию подагры способствуют	
однообразная мясная пища, наследственность	+
адинамия	
повышение АД	
заболевания ЖКТ	
Разница между количеством систол и пульсовых волн называется	
экстрасистолия	
брадикардия	
дефицит пульса	+
асистолия	
Растворы, использующиеся для обеззараживания кожи при попадании на них крови больного СПИДом	
6% перекись водорода	
70% спирт	+
5% раствор йода спиртовой	
1% иодонат	
Резкий позыв к дефекации после еды при хроническом энтерите сопровождается	
слабостью, дрожание рук, холодным потом	+
обильным мочеиспусканием	
повышением артериального давления	
головной болью	
Результаты дополнительной диспансеризации вносятся врачами-специалистами, принимающими участие в проведении дополнительной диспансеризации, в	
прививочный сертификат	
паспорт здоровья	
учётную форму №131У	+
ТАП	
Рентгенологическое исследование желудка позволяет оценить	
моторно-эвакуаторную функцию	+
секреторную функцию	
двигательную функцию	
дыхательную функцию	
С гемостатической целью применяют	
химотрипсин	
этамзилат	+
цепорин	
цефтриаксон	
Самое опасное осложнение перелома поясничного отдела позвоночника	
пневмония	
пролежни	
повреждение спинного мозга	+
кровотечение	
Самым эффективным противочесоточным средством наружного применения (более 95% излечения) является	
перметрин (медифокс)	+
бензилбензоат	
спрегаль	
ивермектин	
Сангвигин	
бурный, порывистый, резкий, горячий тип	
спокойный, вялый, медлительный, устойчивый тип	

живой, подвижный, отзывчивый, эмоциональный тип	+
Сахарный диабет I типа характеризуется	
постепенным началом заболевания	
развитием в пожилом возрасте	
не яркой симптоматикой	
склонность к кетоацидозу	+
Сахарный диабет I типа характеризуется	
постепенным началом заболевания	
пожилым возрастом	
развитием у лиц с ожирением	
инсулинозависимостью, поражением В-клеток	+
Сахарный диабет II типа характеризуется	
развитием в молодом возрасте	
склонностью к развитию кетоацидотической диабетической комы	
повышенным или нормальным содержанием инсулина в плазме	+
отсутствием склонностью к кетоацидозу	
Сахарный диабет II типа характеризуется	
чрезмерной жаждой и голодом, снижением веса	+
мочеиспускание редкое	
кожные покровы сухие	
желтухой	
Сестринские приоритетные проблемы при ревматоидном артрите	
ограничение подвижности суставов	+
плохой аппетит	
задержка стула (запоры)	
кашель	
Сестринский процесс при эпилептическом статусе должен быть ориентирован на	
профилактику западения корня языка, аспирации слюны и бронхиальной слизи	+
профилактику гипоксии и отёка мозга	
антиконвульсионную терапию	
Сильной местной реакцией на прививку считается отек и гиперемия в месте инъекции диаметром	
3	
5	
более 5см	
более 8см	+
Сильной общей реакцией на прививку считается подъем температуры тела у вакцинированного	
до 37,5о С	
до 38о С	
до 40о С	
выше 40о С	+
Симптом – предвестник при гипергликемической коме	
чувство голода	
жажда	+
внутренняя дрожь	
мочевинный иней	
Симптом "перемежающейся хромоты" характерен для	
варикозного расширения вен	
облитерирующего эндартериита	+
тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей	
тромбофлебит поверхности вен нижних конечностей	
Симптом Щеткина-Блюмберга	
при глубокой пальпации в левой подвздошной области появляются болевые ощущения	
при быстром отнятии руки от вдавленной брюшной стенки возникает гораздо более резкая болезненность, чем при надавливании	+
болезненность при поколачивании по правой рёберной дуге	
болезненность при поколачивании в область поясницы	
Симптомы бронхиальной астмы	
удушьё с затрудненным вдохом, кашель с мокротой	
кровохарканье	
удушьё с затрудненным вдохом, сухие свистящие хрипы	

удушьё с затрудненным выдохом, сухие свистящие хрипы	+
Симптомы дифтерийной ангины	
боль в горле при глотании	
налеты с миндалин легко удаляются	
ярко-красная гиперемия зева и слизистой миндалин	
наличие плотных, трудно-снимающихся серых налетов на миндалинах и дужках, распространённых на заднюю стенку глотки, гортань	+
гной в лакунах миндалин	
Симптомы желудочного - кровотечения	
стул с алой кровью	
рвота цвета кофейной гущи, дегтеобразный стул	+
рвота желчью	
рвота с пенистой кровью	
Симптомы классического приступа подагры	
внезапно ночью, резчайшие боли в большом пальце стопы	+
нарушение сознания	
желтушность склер	
жажда	
Симптомы претоксикоза не включают	
асимметрию показателей АД	
снижение диуреза	
патологическую прибавку массы тела	
тошноту, рвоту	+
Случай дополнительной диспансеризации считается законченным после	
прохождения гражданином установленного объема функциональных, лабораторных исследований и врачебных осмотров	+
после оформления медицинской карты амбулаторного пациента	
после внесения в паспорт здоровья личных данных	
Смена маркированных пакетов для медицинских отходов осуществляется	
каждые 3 часа	
каждые 8 часов	+
каждые 24 часа	
Смерть при анафилактическом шоке может наступить от	
перелома руки	
инфаркта	
острой сердечно-сосудистой недостаточности	+
острой печеночной недостаточности	
Соотношение между числом нагнетаний воздуха в легкие для искусственного дыхания и числом нажатий на грудную клетку при массаже сердца составляет	
1: 2	
1:5	
2:10	
2:30	+
Состояние выключения сознания - это	
кома, сопор, оглушенность	+
делирий	
сумеречное помрачение сознания	
обморок	
Состояние, относящееся к синдрому острой сердечной недостаточности	
обморок	
коллапс	
отёк легких	+
шок	
Сотрясение головного мозга от удара мозга отличается	
наличием "светлого промежутка"	
отсутствием очаговой симптоматики	+
наличием повышенного АД	
нарушением сна	
Специфическая профилактика бешенства	
пассивная иммунизация антирабическим иммуноглобулином или антирабической сывороткой с последующей активной иммунизацией вакциной	
активная иммунизация вакциной с последующим введением антирабического иммуноглобулина	

первую дозу вакцины вводят как можно скорее после укуса, одновременно с антирабическим иммуноглобулином	+
Специфические симптомы желудочного кровотечения	
резкая слабость	
боли в правом подреберье	
мелена, дегтеобразный стул, рвота «кофейной гущей»	+
учащённое сердцебиение	
Средняя физиологическая кровопотеря в родах	
1% от массы тела	
10% от массы тела	
0,5% от массы тела	+
Срок формирования иммунитета после вакцинации БЦЖ	
2	
3	
2	+
Стерилизационные методы обработки инструментария воздействуют	
на патогенную микрофлору	
на непатогенную микрофлору	
на спорообразующие микроорганизмы	
на все виды микроорганизмов, в том числе и спорообразующие	+
Столкновение интересов двух или нескольких людей называется	
конфликтом	+
стрессом	
переговорами	
Субъектами медицинского права являются	
гражданин, страхователь	
гражданин, страховая медицинская организация, медицинское учреждение	
гражданин, страхователь, страховая медицинская организация, медицинское учреждение	+
Сыпь при ветряной оспе чаще появляется	
на 1 день болезни	+
на 2 день болезни	
на 3 день болезни	
Типичное расположение аппендикса	
в эпигастральной области	
в левой подвздошной области	
в правой подвздошной области	+
в правом подреберье	
Транспортировка пострадавшего с сотрясением головного мозга осуществляется в положении	
горизонтальном	
с приподнятым головным концом	+
с опущенным головным концом	
Транспортируют пострадавшего с переломом ребер и грудины	
лежа на боку	
лежа на спине	
в положении сидя	+
Транспортная шина для фиксации перелома бедра	
Еланского	
Дитерихса	+
Белера	
Цито	
Требования к сотруднику для занятия медицинской деятельностью	
наличие диплома о медицинском образовании, наличие сертификата по специальности	+
наличие гражданства	
наличие стажа	
Туберкулёз – это заболевание	
острое инфекционное	
хроническое инфекционное	
хроническое инфекционное социальной значимости	+
не инфекционное	

У больных хроническим гастритом с секреторной недостаточностью при пальпации определяется	
разлитая болезненность в эпигастриальной области, умеренное вздутие живота	+
увеличение печени	
боль в правой подвздошной области	
изменение кожных покровов	
У здорового человека сахар в моче	
1	
0,5	
отсутствует	+
до 5%	
Увеличение частоты дыхания называется	
апноэ	
диспноэ	
гиперпноэ	
тахипноэ	+
Условия для заживления ран первичным натяжением	
ровные края раны, отсутствие нагноений, отсутствие в ране инородных тел	+
неровные края раны	
сгустки крови в ране	
Факторами риска заболеваний органов дыхания часто являются	
переохлаждение, курение	+
наследственность	
сахарный диабет	
артрит	
Фактором риска в развитии осложнений при проведении местной анестезии является	
дефицит массы тела	
злоупотребление алкоголем	
аллергия на анестетики	+
характер питания	
Факторы передачи гепатита "В"	
кровь	+
продукты питания	
воздух	
рукопожатие	
Факторы риска ревматоидного артрита	
варикоз нижних конечностей	
инфекции, наследственная предрасположенность	+
избыточная масса тела	
язвенная болезнь желудка	
Функциональные исследования, которые проводятся в рамках дополнительной диспансеризации	
флюорография	
электрокардиография	
УЗИ молочных желёз	
маммография	+
Характер воспалительного процесса при гастрите	
эрозивный	+
флегмонозный	
серозный	
подострый	
Характер мокроты при бронхиальной астме	
вязкая, скудная	+
серозно-гнойная	
с примесью крови	
Характер рвоты при остром панкреатите	
неукротимая рвота, не приносящая облегчения, независимо от приёма пищи	+
рвота сразу после приема пищи	
рвота желчью	
рвота приносящая облегчение	
Характер стула при ротавирусной инфекции	
жидкий скудный, с кровью	

жидкий со слизью, зеленью	
обильный водянистый	+
Характер стула при хроническом панкреатите	
склонность к запорам	
зловонный, с жирным блеском, светлый, мажущийся	+
оформленный	
в виде «рисового отвара»	
Характерное положение больных при прободении язвы желудка	
полусидячее неподвижное	
с приведенными к животу коленями	+
на правому боку	
Характерной локализацией иррадиацией болей при заболеваниях печени и желчного пузыря является	
область сердца и левой руки	
правый верхний квадрат живота, правая лопатка	+
поясница и пах	
область пупка	
Характерной локализацией иррадиации болей при заболеваниях почек являются	
область сердца и левой руки	
правый верхний квадрат живота и лопатки	
поясница и пах	+
область пупка	
Характерный признак отморожения 2 степени	
некроз всей толщи кожи	
образование пузырей со светлым содержимым, сильный зуд, отек	+
синюшность кожи	
кровяные пузыри	
Цели транспортной иммобилизации	
предупреждение дополнительных повреждений тканей и органов, профилактика шока о обеспечение оттока отделяемого	+
остановка кровотечения	
Частое осложнение язвенной болезни	
кишечная непроходимость	
кахексия	
обезвоживание	
желудочное кровотечение	+
Частота пульса	
зависит от возраста, заболеваний крови	
не зависит от возраста	
зависит от возраста и заболеваний сердечнососудистой системы	+
зависит от болезней мозга	
Частота сердечных сокращений выше 100 уд/мин является	
брадикардией	
тахикардией	+
нормой	
экстрасистолией	
Черный цвет кала бывает при кровотечении из	
12-перстной кишки	+
ободочной кишки	
сигмовидной кишки	
прямой кишки	
Число сердечных сокращений у взрослого человека в норме (ударов в минуту)	
85-90	
60-80	+
40-50	
90-100	
Что используется для обеззараживания слизистых при попадании на них крови ВИЧ-инфицированного пациента	
6% раствор перекиси водорода	
3% раствор хлорамина	
10% раствор аммиака	
проточная вода	+

Чума начинается	
с появления обильного жидкого стула	
с выраженных симптомов интоксикации	+
Эндоскопическое исследование позволяет оценить	
состояние слизистой, эрозий, их размер, количество и глубину	+
наличие НР	
количество лейкоцитов	
нарушение сердечного ритма	
Этиологическим фактором острой пневмонии могут быть	
менингококк	
микоплазма	
пневмококк	+
стрептококк	
Ятрогения – это болезненное состояние, возникающее в результате неправильного	
медикаментозного лечения психического заболевания	
ухода за больным с психическим заболеванием	
поведения медицинского работника в отношении больного	+