

УТВЕРЖДАЮ
 первый заместитель руководителя
 департамента здравоохранения Воронежской области
 О.Е. Минаков
 22 окт 2020 2020г.

Сестринское дело в педиатрии

Текст вопроса	Верный вариант
Текст варианта	
"Комплекс оживления" характерен для периода новорожденности	
периода младенчества	+
юношеского периода	
периода зрелости	
периода преклонного возраста	
« Не навреди» - это основной принцип этической модели Гиппократе	+
Парацельса	
деонтологической биоэтики	
«Дезинфекция» – это уничтожение патогенных микроорганизмов	
комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды	+
уничтожение грибов	
уничтожение вирусов	
«Стерилизация» – это уничтожение патогенных бактерий	
уничтожение микробов на поверхности	
уничтожение инфекции	
освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение	+
«Ядерная» желтуха характеризуется поражением сердца	
легких	
ЦНС	+
почек	
АКДС- вакцина вводится через рот	
внутрикожно	
подкожно	
внутримышечно	+
Активную иммунизацию против кори проводят детям живой коревой вакциной	+
человеческим иммуноглобулином	
туберкулином	
аскорбиновой кислотой	
Амнезия – это нарушение памяти	+
внимания	
мышления	
восприятия	
Ангина у детей является постоянным симптомом гриппа	
ветряной оспы	
скарлатины	+
риновирусной инфекции	
Антиретровирусные препараты, предназначенные для профилактики ВИЧ-инфекции медицинских работников должны храниться	

в сейфе	
в месте, доступном для сотрудников	+
в доступном месте для сотрудников и пациентов	
Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на предупреждение попадания микробов в рану	
полное уничтожение микробов и их спор	
стерильность	
предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом	
ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом	+
Аптечку «анти - ВИЧ», при аварийной ситуации с пациентом - носителем вирусного гепатита В или С	
Можно использовать	+
Нельзя использовать	
Артериальный жгут накладывают максимум на	
0,5-1 час	+
1,5-2 часа	
6-8 часов	
3-5 часов	
Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране	
полное уничтожение микробов и их спор	
стерильность	
ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом	
предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом	+
Асфиксия новорожденного тяжелой степени характеризуется в баллах по шкале Апгар	
1-3	+
4-5	
6-7	
8-9	
Атопический дерматит в раннем возрасте проявляется возникновением	
Увеличение щитовидной железы	
Молочным струпом	+
Неврастенией	
Бактерицидные лампы дезинфицируют	
Спиртом этиловым 70%	+
Дезинфицирующим средством	
Хлоргексидином спиртовым 0,5%	
Барьерные меры защиты медицинского персонала при выполнении любых медицинских манипуляций	
халат	
шапочка	
одноразовая маска	
перчатки	
сменная обувь	
все ответы верны	+
Благоприятное воздействие, оказываемое личностью медицинского работника на психику пациента носит название	
терапевтическим общением	+
нетерапевтическим общением	
Больной корью опасен как источник инфекции	
в продромальный период «В разгаре болезни»	+
в начале инкубации	
в период реконвалесценции	
Большой родничок закрывается к	
12-15 месяцам жизни	+
10-12 месяцам жизни	
15-18 месяцам жизни	
2-3 месяцам жизни	
Большой родничок зарастает	
к 8 мес	
к 12 мес	+
к 18 мес	

Большой родничок у новорожденного располагается между костями черепа	
лобной и теменными	+
теменными	
затылочной и теменными	
височной и теменной	
Большой родничок у ребенка закрывается в возрасте (мес.)	
4–7	
8–11	+
12–18	
20–22	
Брахицефалия, косой разрез глаз, плоское лицо, поперечная складка на ладони характерны для	
болезни Дауна	+
фенилкетонурии	
гемофилии	
рахита	
Брахицефалия, косой разрез глаз, плоское лицо, поперечная складка на ладони характерны для	
болезни Дауна	+
фенилкетонурии	
гемофилии	
рахита	
БЦЖ вводится с целью профилактики заболевания	
Туберкулеза	+
Пневмонии	
Гепатита	
В биксе с фильтром материал сохраняет стерильность в течение	
1	
3	
7	
20	+
В высохшей мокроте на различных предметах внешней среды микобактерии туберкулеза могут сохранять свои свойства в течение	
нескольких дней	
нескольких месяцев	+
несколько лет	
несколько часов	
В ежедневный рацион питания должны входить нижеперечисленные продукты, кроме	
Овощи	
Рыба	+
Масло сливочное	
В закрытый кювез помещают недоношенного новорожденного с массой тела менее (г)	
2 100	
1 900	
1 700	
1 500	+
В коже у детей вырабатывается	
витамин С	
провитамин Д	+
витамин Е	
Важнейшим компонентом лечения туберкулеза у детей является	
режим	
уход	
диета	
химиотерапия	+
Вакцина БЦЖ вводится	
через рот	
внутрикожно	+
подкожно	
внутримышечно	
Вакцина против кори вводится	
через рот	

подкожно	+
внутрикожно	
Вакцина против паротита вводится	
через рот	
подкожно	+
внутрикожно	
внутримышечно	
Вакцинация АКДС проводится	
в 1 год	
в 1,5 года	
с 3-х месячного возраста трехкратно	+
в первые дни жизни	
Вакцинация БЦЖ проводится здоровому новорождённому на день жизни	
1-3	
3-5	+
5-7	
6-8	
Вакцинация БЦЖ проводится здоровому новорожденному на сроке (дни жизни)	
1-3	
3-7	+
8-12	
15-19	
Введение новой пищи, постепенно заменяющей кормление грудью – это	
докорм	
прикорм	+
искусственное вскармливание	
смешанное вскармливание	
Введение новой пищи, постепенно заменяющей кормление грудью — это	
докорм	
прикорм	+
искусственное вскармливание	
смешанное вскармливание	
Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является	
учёба	
отдых	
игра	+
развлечения	
хобби	
Ведущий клинический симптом обструктивного бронхита у детей	
боль в грудной клетке	
лихорадка	
одышка	+
слабость	
Ведущий признак крупа	
Инспираторная одышка	+
Повышение температуры	
Покраснение лица	
Ведущим признаком крупа у детей является	
лихорадка	
гиперемия лица	
инспираторная одышка	+
экспираторная одышка	
Визуальное изменение мочи при пиелонефрите	
мутная с хлопьями	+
соломенно-желтая	
цвета «пива»	
бесцветная прозрачная	
Вирус гепатита В у детей отсутствует в	
крови	
слюне	
фекалиях	+
моче	

ВИЧ-инфицированный пациент, получающий только консультативные услуги	
должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе	
не должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе	+
Возбудителем ветряной оспы у детей является	
вирус	+
стафилококк	
микобактерия	
шигелла	
Возбудителем дифтерии у детей является	
вирус	
бактерия	+
микоплазма	
амеба	
Возбудителем кори является	
вирус	+
пневмококк	
микобактерия	
шигелла	
Возбудителем краснухи является	
вирус	+
стрептококк	
шигелла	
микоплазма	
Возбудителем скарлатины у детей является	
вирус	
стрептококк	+
стафилококк	
протей	
Возбудителем туберкулеза у детей является	
микобактерия Коха	+
столбнячная палочка	
протей	
синегнойная палочка	
Возбудителем эпидемического паротита у детей является	
вирус	+
кишечная палочка	
синегнойная палочка	
протей	
Возбудителями дизентерии у детей являются	
энтеровирусы	
сальмонеллы	
шигеллы	+
эшерихии	
Возникновение судорог у детей связано с	
предрасположенностью мозга к генерализованным реакциям	+
недостаточным кровоснабжением мозга	
пониженной судорожной готовностью	
высокой дифференциацией коры головного мозга	
Возрастными психологическими кризисами называют	
периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими изменениями внешности	
периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психологическими изменениями	+
периоды резкого изменения отношения к родителям	
периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психоэндокринными изменениями	
периоды резкого изменения отношения со сверстниками	
Воспаление пупочной ранки новорожденного	
гемангиома	
дерматит	
потница	
омфалит	+
Вторичная профилактика бронхиальной астмы	
прием антибиотиков	
увеличение физической нагрузки	

исключить контакт с аллергиком, дыхательная гимнастика	+
Вторичный обструктивный пиелонефрит у детей развивается на фоне	
аномалии почек и мочевых путей	+
обменных нарушений в организме	
частичного иммунодефицитного состояния	
свободного оттока мочи	
Второй прикорм вводят грудному ребенку на естественном вскармливании в возрасте (мес.)	
3	
4	
6	+
7	
Выведение нижней челюсти при ИВЛ	
предупреждает регургитацию желудочного содержимого	
устраняет западение языка, восстанавливает проходимость ДП (гортани и трахеи)	+
создает герметичность между ртом оказывающего помощь и ртом пациента	
Выделения из влагалища, гиперемия вульвы, зуд и следы расчесов наблюдаются у девочек при	
цистите	
уретрите	
вульвовагините	+
пиелонефрите	
Вынужденное положение ребенка на боку с запрокинутой головой и согнутыми ногами характерно для	
кори	
краснухи	
дифтерии	
менингококкового менингита	+
Высыпания на коже в виде пузырьков характерны для инфекционного заболевания	
Корь	
Скарлатина	
Ветряная оспа	+
Гельминтоз, способствующий заболеваниям половых органов и мочевыводящих путей у детей	
энтеробиоз	+
трихоцефалез	
аскаридоз	
лямблиоз	
Гельминтозы у детей – это заболевания, вызываемые	
бактериями	
грибами	
простейшими	
паразитическими червями	+
Геморрагическая сыпь звездчатой формы характерна для	
кори	
краснухи	
скарлатины	
менингококковой инфекции	+
Генерализованная форма гнойно-септических заболеваний новорожденных	
везикулопустулез	
парапроктит	
сепсис	+
омфалит	
Гепатит А вызывается	
бактериями	
вирусом	+
грибами	
простейшими	
Гипертермия требует неотложного сестринского вмешательства, т.к. возможно развитие	
диареи	
судорог	+
стеноза гортани	
синдрома дыхательных расстройств	

Гипертонус сгибательных нижних конечностей исчезает к	
3-4 месяцам жизни	+
2-2,5 месяцам жизни	
1-2 месяцам жизни	
5-6 месяцам жизни	
Главный диагностический критерий менингита	
головная боль	
высокая температура	
боль в животе	
регидность мышц затылка	+
Главный признак вывиха	
Боль	
Изменение формы сустава	
Отёк сустава	
Невозможность движения в суставе	+
Глубокий свистящий вдох при коклюше, прерывающий кашлевые толчки, - это	
апноэ	
асфиксия	
брадипноэ	
реприз	+
Глюкотест используется для определения	
ацетона в моче	
ацетона в крови	
сахара в моче	+
сахара в крови	
Гнойное поражение кожи у новорожденных проявляется в виде	
Болезни Риттера	
Фурункулеза	
Везикулоступулеза	+
Грудной период продолжается после рождения	
1	+
6	
Сколько женщина будет кормить ребенка грудью	
Дезинсекция это	
Борьба с паразитирующими на людях и предметах их обихода членистоногими	+
Борьба с грызунами в лечебном учреждении	
Дезинфекция жгута в процедурном кабинете проводится	
После каждой пациента	+
После загрязнения биологической жидкостью пациента	
в конце рабочей смены	
Дезинфекция посуды в очаге кишечной инфекции	
промыть под проточной водой	
замочить в 1% растворе хлорамина на 30 мин	+
замочить в 5% растворе хлорамина на 1 час	
Дератизация это	
Борьба с паразитирующими на людях и предметах их обихода членистоногими	
Борьба с грызунами в лечебном учреждении	
Дети до 10 лет, бывших в контакте с больным эпидемическим паротитом и не болевших наблюдают	
7	
14	
21	+
Дети с гипотрофией наблюдаются у	
педиатра	+
эндокринолога	
врача ЛФК	
Детям от года до 3 лет рекомендуется молоко	
Детское промышленное модифицированное	+
Парное цельное коровье	
Массового промышленного выпуска	
Детям, бывших в контакте с больным скарлатиной проводят	
осмотр кожи, носоглотки, термометрию	+

определение границ печени	
определение диуреза	
Диета при гломерулонефрите	
гипоаллергенная	
с ограничением солей калия	
Гипохлоридная	+
Диета при заболеваниях сердца у детей	
гипоаллергенная	
богатая солями калия	+
бедная солями калия	
Диспансеризация детей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта предусматривает	
своевременную санацию хронических очагов инфекции	
занятия в основной группе по физкультуре	
наблюдение гастроэнтерологом, противорецидивное лечение	+
освобождение от профилактических прививок	
Диспансеризация при хронических гастродуоденитах и язвенной болезни исключает	
соблюдение диеты	
промывание желудка	+
назначения противорецидивного лечения	
Диспансерное наблюдение после перенесенного ревматического эндомиокардита включает	
лечебную физкультуру	
сезонную бициллинопрофилактику	+
наблюдение эндокринологом	
занятия в основной физической группе	
Длительная рвота при пилоростенозе приводит к развитию	
пневмонии	
токсикоза	
эксикоза	
гипотрофии	+
Длительное угнетённо-подавленное настроение с мрачной оценкой прошлого и настоящего и пессимистическими взглядами на будущее называется	
эйфорией	
депрессией	+
дисфорией	
манией	
Длительное повышение АД при гломерулонефрите вызывает	
астигматизм	
миопию	
изменения в глазном дне	+
дальнозоркость	
Для бактериологического исследования на дифтерию берут	
слизь из носа и ротоглотки	+
кровь из вены	
слизь из задней стенки глотки	
Для врожденного гипотиреоза характерны	
гипервозбудимость, тремор конечностей	
опережение физического и нервно-психического развития	
преждевременное половое развитие	
задержка физического и нервно-психического развития	+
Для врожденного гипотиреоза характерны	
гипервозбудимость, тремор конечностей	
опережение физического и нервно-психического развития	
преждевременное половое развитие	
задержка физического и нервно-психического развития	+
Для выявления туберкулеза у детей проводятся следующие мероприятия	
Рентген грудной клетки	
Реакция Манту	+
Бронхоскопия	
Для детей с тромбоцитопенической пурпурой типичны	
носовые кровотечения	+

желудочно-кишечные кровотечения	
легочные кровотечения	
гематурия	
Для диагностики аскаридоза исследуют	
фекалии	+
рвотные массы	
перипростальный соскоб	
мочу	
Для диагностики энтеробиоза используют	
метод Робинвича	+
бактериологическое исследование кала	
кал на дисбактериоз	
как на яйца глистов	
Для исследования на энтеробиоз м/с приготовить	
чистую стеклянную посуду	
чашку Петри с питательной средой	
липкую ленту	+
Для кефалогематомы характерно	
опухоль не переходит границ одной кости	+
опухоль переходит границы одной кости	
опущение угла рта на стороне поражения	
генерализованный цианоз	
Для контроля за динамикой отека при гломерулонефрите у детей следует	
ограничить прием жидкости	
назначить бессолевую диету	
регулярно определять массу тела ребенка и ежедневно измерять диурез	+
назначить принудительный ритм мочеиспусканий	
Для обеззараживания использованного инструментария с целью профилактики СПИДа применяют	
1% раствор хлорамина	
3% раствор хлорамина	+
5% раствор хлорамина	
Для определения уровня глюкозы в крови ребенка следует направить в лабораторию	
через 10 мин. после еды	
через 20 мин. после еды	
через 30 мин. после еды	
натощак	+
Для очищения наружных слуховых проходов у детей раннего возраста используют	
сухие ватные жгутики	+
жгутики, смазанные стерильным маслом	
ватные шарики	
марлевые шарики	
Для очищения носовых ходов здорового новорожденного используют	
ватные жгутики, смазанные стерильным маслом	+
ватные жгутики с фурацилином	
ватные жгутики с детским кремом	
сухие ватные жгутики	
Для подтверждения диагноза менингококковой инфекции необходимо сделать	
взятие слизи из зева и носа	
взятие спинномозговой жидкости	
взять кровь (для выявления возбудителя)	
все ответы верны	+
Для подтверждения фенилкетонурии исследованию подлежат	
Кровь	
Моча	+
Кал	
Для проведения искусственной вентиляции легких необходимо в первую очередь	
Голову пострадавшего запрокинуть с выдвиганием вперед нижней челюсти	+
Закрывать нос пострадавшему	
Сделать пробное вдувание воздуха	
Нажать на грудину	
Для профилактики дисбактериоза необходимо	

сохранить грудное вскармливание	+
соблюдать режим кормления	
раннее введение соков	
Для профилактики дифтерии и коклюша применяют вакцину	
АДС	
ОПВ	
АКДС	+
БЦЖ	
Для профилактики опрелостей складки кожи новорожденного обрабатывают	
стерильным растительным маслом	+
физраствором	
раствором фурацилина	
раствором полиглюкина	
Для профилактики офтальмобленнореи применяется раствор	
фурацилина	
хлорида натрия	
сульфацил-натрия	+
полиглюкина	
Для профилактики педикулеза и чесотки осмотрам подлежат дети домов ребенка, детских домов, школ интернатов, школ, ДДУ, загородных детских учреждений	
еженедельно	+
2 раз в месяц	
1 раз в месяц	
1 раз в год	
Для сотрясения головного мозга характерно	
кома	
ретроградная амнезия	+
антероградная амнезия	
конградная амнезия	
Для стерилизации применяются средства, обладающие	
статическим действием	
вирулицидным действием	
спороцидным действием	+
фунгицидным действием	
родентицидным действием	
Для тромбоцитопенической пурпуры у детей характерны	
асимметрично расположенные петехиально-пятнистые геморрагические элементы	+
симметрично расположенные петехиально-пятнистые геморрагические элементы	
асимметрично расположенные пятнисто-папулезные элементы	
симметрично расположенные пятнисто-папулезные элементы	
Для улучшения усвоения пищи детям с гипотрофией назначают	
ферменты	+
антибиотики	
десенсибилизирующие	
спазмолитики	
Для электротравм 1 степени тяжести характерно	
потеря сознания	
расстройства дыхания и кровообращения	
судорожное сокращение мышц	+
клиническая смерть	
Докорм – это	
Разнообразие пищевого рациона	
Дополнительная пища, даваемая ребенку первого года жизни, которому недостаточно грудного молока	+
Введение в пищевой рацион новых продуктов, с целью восполнения энергетических затрат малыша	
Допишите формулу определения молочных зубов: $x=n-?$ (n- количество месяцев)	
1	
2	
3	
4	+
Дошкольный период включает	

от 0 до 1 года	
от 1 года до до 3 лет	
от 3 лет до 7 лет	+
от 7 лет до 12 лет	
от 12 лет до 15 лет	
Ежегодная прибавка массы тела с 2 года жизни	
1	
2	+
3	
4	
Емкость желудка у новорожденного составляет (в мл)	
30-35	+
50-55	
100-155	
250-300	
Емкость желудка у ребенка 1 года составляет (в мл)	
30-35	
50-100	
100-150	
250-300	+
Жидкий стул с примесью слизи и прожилков крови у детей («ректальный плевок») характерен для	
дизентерии	+
сальмонеллеза	
энтеровирусной инфекции	
эшерихиоза	
Журнал учета работы ультрафиолетовой бактерицидной установки заполняется	
ежедневно	
1 раз в неделю	
1 раз в месяц	
при каждом включении установки	+
Замедленные движения, одутловатость лица, гипотермия, запоры, ухудшение памяти и ухудшение успеваемости в школе характерны для детей, страдающих	
эутиреоидной гиперплазией щитовидной железы	
диффузным токсическим зобом	
приобретенным гипотиреозом	+
гиповитаминозом В6	
Запах ацетона в выдыхаемом воздухе появляется при коме	
гипергликемической	+
гипогликемической	
печеночной	
уремической	
Запрокинутая голова в положении лежа может свидетельствовать о заболевании	
Миокардит	
Пневмония	
Менингит	+
Зуд в перианальной области, как основной симптом гельминтоза у детей, характерен для	
энтеробиоза	+
описторхоза	
аскаридоза	
трихоцефалеза	
ИВЛ при реанимации детей до 14 лет проводится	
50% кислородом	
100% кислородом	+
не проводится	
нет правильного ответа	
Игровая деятельность, во время которой на длительный период человек способен «переволлотиться» в животное, выдуманный образ или неодушевленный предмет, называется	
фантазированием	
патологическим фантазированием	+
воображением	
галлюцинозом	

иллюзорной деятельностью	
Из всех видов аллергий в детском возрасте чаще встречается	
Пищевая	+
Лекарственная	
Ингаляционная	
Из диеты у детей, больных геморрагическим васкулитом, исключают	
животные жиры	
белковое питание	
сенсibiliзирующие продукты	+
глюкозу и другие сахара	
Из питания ребенка с обострением язвенной болезни исключают	
мясные и рыбные бульоны	+
молочные и слизистые супы	
молоко и творог	
сливочное и оливковое масло	
Изменение мочи при гломерулонефрите свидетельствует о	
глюкозурии	
протеинурии	+
лейкоцитурии	
бактериурии	
Измерения микроклимата в лечебном учреждении	
проводят 2 раза в год	+
проводят 1 раз в год	
не проводят	
Измерения освещенности в лечебном учреждении	
проводят 2 раза в год	
проводят 1 раз в год	+
не проводят	
Имеет большую энергетическую ценность, содержание питательных веществ, насыщено различными факторами иммунитета – это	
Грудное молоко	
Адаптированная молочная смесь	
Молозиво	+
Инвалидность оформляют детям, больным	
гемофилией	+
железодефицитной анемией	
гемолитической анемией	
тромбоцитопенической пурпурой	
Инкубационный период гепатита «А»	
до 35-45 дней	+
до 6 месяцев	
до 1 года	
Инкубационный период при вирусном гепатите В (в днях)	
1-10	
10-45	
60-180	+
180-360	
Инкубационный период при вирусном гепатите А у детей продолжается (в днях)	
1-10	
10-45	+
60-180	
180-360	
Истинный круп развивается у детей при	
гриппе	
кори	
коклюше	
дифтерии	+
Истинный круп развивается у детей при	
гриппе	
кори	
коклюше	
дифтерии	+

Источником инфекции при гепатите А у детей являются	
грызуны	
больные животные	
вирусоносители	
больные люди	+
К нарушениям адаптации в дошкольном учреждении относятся	
агрессивность, плач	+
может долго играть с детьми	
сон спокойный, глубокий	
К третьему этапу скрининг – программы относятся	
осмотр кардиолога	+
антропометрия	
измерение АД	
исследование глазного дна	
К антропометрии ребенка относятся	
Измерение роста, длины тела, окружности грудной клетки, головы	+
Подсчет зубов	
Рентген грудной клетки	
К вербальным средствам общения относится	
поза	
речь	+
взгляд	
жест	
К году ребенок должен произносить	
слоги	
8-10 слов	+
связную речь	
К группе риска по сахарному диабету относятся	
дети с наследственной отягощенностью	+
недоношенные	
с аномалией конституции	
с гипотрофией	
К достоверному признаку асфиксии новорожденного относится	
Отсутствие дыхания	+
Снижение мышечного тонуса	
Арефлексия	
К достоверным признакам гипогалактии относятся	
беспокойный сон	
низкая прибавка в массе тела	
редкие мочеиспускания	
все выше перечисленное	+
К методам временной остановки кровотечения относятся	
перевязка сосуда в ране	
перевязка сосуда на протяжении	
наложение кровоостанавливающего жгута	+
К наиболее опасным для заражения ВИЧ – инфекцией биологическим жидкостям можно отнести	
кровь, сперма	+
моча, кал	
слюна, пот	
К первой группе здоровья относят детей	
с гипотрофией	
часто болеющих	
с atopическим дерматитом	
здоровых	+
К пограничным состояниям новорожденных относится	
гипотрофия	
анемия	
половой гормональный криз	+
апноэ	
К признакам живорождения не относят	
пульсацию пуповины	+

розовый цвет кожных покровов	
наличие дыхания	
наличие сердцебиения	
К противоэпидемическим мероприятиям в очаге инфекции относятся	
дезинфекция	
наблюдение за контактными	
изоляция заболевшего	
все ответы верны	+
К ранним признакам рахита относятся	
Повышенная потливость	+
Изменение формы черепа	
Искривление костей нижних конечностей	
К реактивным состояниям новорожденных относится все, кроме	
Мелена	+
Нагрубание молочных желез	
Физиологическая желтуха	
К рефлексам орального автоматизма относятся	
поисковый	+
ползания	
опоры	
хватания	
К симптомам вегето-сосудистой дистонии относятся	
головокружение, мигрень	
диспепсия	
снижение гемоглобина	
гипотензия или гипертензия	+
К симптомам экзикоза относятся	
жажда, сухость кожи и слизистых	+
полиурия	
олигурия, потеря массы тела	
повышение аппетита	
Какая из функций кожи у детей развитие лучше, чем у взрослого	
дыхательная	+
выделительная	
защитная	
Карантин на детей, имевших контакт с больным корью, составляет (дней)	
7-10	
10-14	
17-21	+
22-27	
Карантин при ветряной оспе составляет	
7	
10	
14	
21	+
Карантин при гепатите А составляет	
30	
35	+
40	
60	
Клиническая форма туберкулёза, развивающаяся у ребёнка в ответ на первичное внедрение микобактерий - это	
диссеминированный туберкулёз лёгких	
очаговый туберкулёз лёгких	
первичный туберкулёзный комплекс	
туберкулёзная интоксикация	+
Клинически симптомы II периода лихорадки	
чувство жара	+
озноб	
резкое снижение АД	
Клинические признаки врожденного гипотиреоза включают	
большую массу тела при рождении	

вялое сосание, адинамию	+
возбуждение ЦНС (центральной нервной системы)	
склонность к гипертермии	
Клинические симптомы I периода повышения температуры	
чувство жара	
снижение АД	
озноб	+
Клинические симптомы III периода лихорадки	
кожа влажная, холодная	+
возбуждение ЦНС	
повышение АД	
Клинические симптомы аскаридоза	
зуд вокруг ануса	
боли в пояснице	
боли в животе вокруг пупка	+
расчесы перианальных складок	
Клинические симптомы дизентерии	
запор	
увеличение селезенки	
тенезмы	+
боли в правом подреберье	
Клинические симптомы менингита у детей до 2-х лет	
симптом Кернига	
симптом Мацевина	
симптом «подвешивания» Лессажа	
симптом «верхней конечности»	
все вышеперечисленные	+
Клинические симптомы обморока	
головокружение «розовые» круги перед глазами	+
головная боль, мелькание «мушек» перед глазами	
повышение АД, тахикардия	
Клинические симптомы рахита в период разгара	
повышение температуры тела	
искривление голеней, гипотония мышц	+
систолический шум в сердце	
Клинические симптомы энтеробиоза	
зуд вокруг ануса	+
«тенезмы»	
боли в животе вокруг пупка	
Клиническими симптомами гепатита являются	
иктеричность склер и кожи	
увеличение печени	
диспептические расстройства	
все ответы верны	+
Кожный антисептик применяют для	
Гигиенической обработки рук	
Хирургической обработки рук	
все ответы верны	+
Количество воды для очищения кишечника (очистительная клизма) в возрасте 6-9 месяцев	
100-120 мл	+
1 000	
до 50 мл	
500	
все верно	
Количество молочных зубов у ребенка 1 года	
4	
6	
8	+
10	
Количество слов в акте у 2-х летнего ребенка	
10-20	

80-100	
200-300	+
Комплекс противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции предполагает	
наложение карантина на контактирующих	+
плановая вакцинация контактирующих	
плановая вакцинация заболевших	
Контактные по ветряной оспе лица наблюдаются (карантин)	
до 10 дней	
до 15 дней	
до 21 дня	+
до 24 дней	
Контактным с больными вирусным гепатитом "А" вводится	
иммуно-глобулин	+
интерферон	
сыворотка	
Контроль стерилизационного оборудования	
проводят не реже 2 раз в год	+
проводят 1 раз в год	
не проводят	
Концентрационная способность почек у детей определяется результатом пробы	
по Аддису-Каковскому	
по Нечипоренко	
ортостатической	
по Зимницкому	+
Конъюнктивиты, вовлечение лимфатической системы у детей характерны для клиники	
аденовирусной инфекции	+
гриппа	
риновирусной инфекции	
респираторно-синцитиальной инфекции	
Конъюнктивиты, вовлечение лимфатической системы у детей характерны для клиники	
аденовирусной инфекции	+
гриппа	
риновирусной инфекции	
респираторно-синцитиальной инфекции	
Краснуха, возникшая в I триместре беременности, опасна развитием	
бронхиальной астмы у женщин	
обострения пиелонефрита у женщин	
сахарного диабета у женщин	
врожденных пороков у ребенка	+
Краснуха, возникшая в I триместре беременности, опасна развитием	
бронхиальной астмы у женщины	
обострения пиелонефрита у женщины	
сахарного диабета у женщины	
врожденных пороков у ребенка	+
Кратковременная остановка дыхания у детей	
апноэ	+
брадипноэ	
тахипноэ	
асфиксия	
Кратность обработки кабинетов бактерицидными лампами в рабочее время	
4 раза в смену по 30 минут	+
2 раза в смену по 30 минут	
6 раз в смену по 30 минут	
Кратность обследования медицинского работника на антииела к ВИЧ после аварийной ситуации	
только после аварийной ситуации	
после аварийной ситуации и далее, через 1;3;6 месяцев	
После аварийной ситуации и далее, через 3;6;12 месяцев	+
Кризис первого года жизни характеризуется	
проявлением социальных навыков	
потребностью к самостоятельности	
потребностью в близких отношениях с матерью	

становлением «комплекса оживления»	
становлением ходьбы и речи	+
Критерий перевода недоношенного новорожденного с зондового кормления на кормление из бутылочки	
появление сосательного рефлекса	+
прибавка массы тела	
увеличение комочков Биша	
исчезновение физиологической диспепсии	
Кровь дозируется точно при заборе	
Вакуумными пробирками	+
Стеклянными пробирками	
Лекарственные препараты для профилактики ВИЧ-инфекции	
Неовир (оксодигидроакридилацетат натрия)	
Циклоферон (меглюмин акридоацетат)	
Лопинавир (ритонавир)	+
Лечебно-профилактические мероприятия при ОРВИ	
витаминация пищи	+
антигистаминные препараты	
антибактериальная терапия	
Лечебное питание ребенка с пиелонефритом строится по принципу	
молочно-растительной диеты с умеренным ограничением белка и соли	+
усиленного белкового питания	
бессолевой диеты	
молочно-растительной диеты с ограничением сахара	
Лечебный стол при сахарном диабете	
1	
2	
5	
9	+
Лимфатико-гипопластический диатез у детей характеризуется увеличением лимфатических узлов и ...	
сердца	
щитовидной железы	
вилочковой железы	+
почек	
Масса тела в граммах доношенного ребенка должна составлять	
3300-3600	+
3900 – 4200	
2700 – 2900	
Маточные кровотечения у девочек старшего возраста отмечают при	
алиментарных анемиях	
гемофилии	
тромбоцитопенической пурпуре	+
геморрагическом васкулите	
Медицинская психология не изучает	
деятельность медицинского персонала	
психологию больных	
роль психических факторов в возникновении психосоматических заболеваний	
психологический климат учреждений	+
Медицинская сестра должна знать, что при подкожном введении инсулина в одно и то же место может развиваться	
гематома	
абсцесс	
липидистрофия	+
отечность	
Медицинская сестра при уходе за ребенком с ОРВИ для уменьшения симптомов интоксикации применит	
банки, горчичники	
оксигенотерапию	
обильное теплое питье	+
обливание прохладной водой	
Медицинский работник, инфицированный ВИЧ	
Может работать в лечебном учреждении, если он не проводит манипуляций	+

Не может работать в лечебном учреждении, даже если он не проводит манипуляций	
Медсестра отделения новорожденных обязана купать ребенка	
Измерять артериальное давление	
Обрабатывать пупочную ранку, взвешивать ребенка	+
Мероприятия по профилактике профессионального инфицирования медработников	
Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима	
Безопасная организация труда	
Обучение персонала методам профилактики	
все ответы верны	+
Мероприятия, облегчающие адаптацию детей к условиям детского дошкольного учреждения	
индивидуальный режим дня с учетом анамнеза, данных осмотра	+
общий режим дня с первого дня посещения	
исключить насильственное кормление при плохом аппетите	
перевести в другую группу при тяжелой адаптации	
Многочесным промыванием желудка ребенку с острым энтероколитом	
купируют болевой синдром	
нормализуют КЩС	
нормализуют функцию кишечника	
максимально быстро удаляют зараженную пищу	+
На первом этапе сестринского процесса требуется	
умение проводить беседу с пациентом и его родственниками	+
согласие лечащего врача	
согласие старшей медсестры	
согласие заведующего отделением	
Название шкалы, с помощью которой оценивается состояние новорожденного	
Ватерлоо	
Баллард	
Апгар	+
Назовите температуру воды для купания новорожденного ребенка	
36-370 С	+
38-390С	
30-320С	
Наиболее важным объективным симптомом для начального периода вирусного гепатита А у детей является	
увеличение размеров и болезненность печени	+
появление катаральных явлений	
появление диспепсических явлений	
наличие симптомов интоксикации	
Наиболее опасное проявление немедленной аллергии	
Крапивница	
Бронхоспазм	
Анафилактический шок	+
Отёк Квинке	
Наиболее частая причина сепсиса у новорожденных	
потница	
пузырчатка новорожденных	+
гемангиома	
аллергический дерматит	
Наиболее часто микобактерии туберкулеза поступают в организм ребенка через	
желудочно-кишечный тракт	
верхние дыхательные пути	+
кожу	
раны	
Наиболее часто пищевую аллергию вызывает следующие овощи	
Томаты	+
Кабачок	
Морковь	
Наиболее часто пищевую аллергию вызывает следующие ягоды	
Смородина	

Клубника	+
Крыжовник	
Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений	
Наложение жгута	
Тампонада раны	
Тугая давящая повязка	+
Закрутка	
Наиболее частое осложнение ОРВИ у детей	
пневмония	+
лейкоз	
сахарный диабет	
туберкулез	
Наиболее частое осложнение язвенной болезни у детей	
перфорация	
кровотечение	+
малигнизация	
пенетрация	
Наиболее частый признак заболеваний органов пищеварения у детей	
боль в животе	+
нарушение аппетита	
диарея	
потеря массы тела	
Наружная кефалогематома – это кровоизлияние	
в мягкие ткани головы	
над твердой мозговой оболочкой	
под твердой мозговой оболочкой	
под надкостницу	+
Начальные признаки рахита	
деформация грудной клетки	
возбудимость ребенка, потливость	+
деформация черепа	
Недомогание, снижение аппетита, анемия, аллергические реакции, эозинофилия у детей характерны для	
энтеробиоза	
аскаридоза	
описторхоза	
большинства гельминтозов	+
Недоношенным является ребенок, родившийся с длиной тела менее (см)	
43	
45	+
47	
49	
Недоношенным является ребенок, родившийся с массой тела менее (г)	
2 000	
2 300	
2 500	+
2 700	
Недоношенным является ребенок, родившийся с массой тела менее (г)	
2 000	
2 300	
2 500	+
2 700	
Неотложная помощь при тяжелой электротравме, приведшей к остановке сердца	
выполнить ИВЛ, прекардиальный удар, непрямой массаж сердца	+
инъекция адреналина	
дать вдыхать пары нашатырного спирта, вызвать бригаду скорой помощи	
Непрямой массаж сердца новорожденному проводится с частотой	
40 в минуту	
100 в минуту	
60 в минуту	
120 в минуту	+
Новорожденным проводят скрининг-тест для выявления	

тиреотоксикоза	
врожденного гипотиреоза	+
сахарного диабета	
адреногенитального синдрома	
Нормальные показатели частоты дыхания у детей 1-3 лет	
28-35	+
40-60	
24-26	
21-23	
16-18	
Нормативный документ, утративший силу	
СанПин 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, роддомов и других лечебных стационаров»	+
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»	
СанПин 2.1.7.2790-10 Санитарно–эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами	
СанПин 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	
Ночное недержание мочи у ребенка – это	
анурия	
олигурия	
поллакиурия	
энурез	+
Обморок – это	
проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания	
аллергическая реакция	
потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса	+
Обработка пупочной ранки относится к	
Независимому сестринскому вмешательству	+
Зависимому сестринскому вмешательству	
Взаимозависимому сестринскому вмешательству	
Общее инфекционное заболевание, протекающее с преимущественным поражением толстого кишечника, характеризующееся развитием дистального колита у детей, - это	
сальмонеллез	
дизентерия	+
эшерихиоз	
энтеровирусная инфекция	
Общей тяжелой реакцией на введение вакцины являются	
фебрильные судороги	
инфильтрат на месте введения вакцины	
анафилактический шок	+
субфебрильная температура тела в течение нескольких часов	
Общение в деятельности медицинского работника – это	
обмен информацией	
обмен эмоциями	
обмен информацией и эмоциями	+
Объем жидкости для одномоментного введения при промывании желудка в возрасте 5-6 месяцев составляет	
100-110 мл	+
1 000	
до 50 мл	
500	
все верно	
Объем реанимационной помощи на догоспитальном этапе при клинической смерти	
придать выгодное положение телу реанимируемого	
провести искусственное дыхание «изо рта в рот»	
провести искусственную вентиляцию легких, закрытый массаж сердца	+
Обязательное обследование в первый день болезни ангины	
общий анализ крови	
общий анализ мочи	
мазок из носа и зева на дифтерийную палочку	+
мазок из носа и зева на стрептококк	
Одним из признаков «синего порока» у грудного ребенка является	

Потливость	
Посинение губ, пальцев, шеи	+
Одышка	
Одной из важнейших задач сестринской помощи является	
диагностика и лечение с учетом сестринского дела	+
уточнение причины заболевания	
Одной из наиболее частых причин гастрита у детей является	
длительный прием салицилатов	
пищевая аллергия	
нерегулярное и неполноценное по составу питание	+
хронические заболевания печени и желчевыводящих путей	
Оздоровление детей с экссудативно-катаральным диатезом	
гипоаллергенная диета, закаливание	+
лечебная физкультура	
физиотерапия	
Оклюзионную повязку накладывают при	
Закрытом переломе ребер	
Открытом переломе ребер	+
Ушибе грудной клетки	
Переломе ключицы	
Окружность головы и грудной клетки сравнивается к	
2-3 месяцам жизни	+
3-4 месяцам жизни	
5-6 месяцам жизни	
1	
Оптимальная температура воздуха в палате для недоношенных (гр.)	
18-20	
26-28	
28-29	
24-26	+
Ослабленное дыхание, цианоз носогубного треугольника, снижение мышечного тонуса характерны для асфиксии новорожденного степени тяжести	
легкой	
средней	
тяжелой	+
Осложнения у детей острого гнойного среднего отита	
мастоидит	+
наружный отит	
стеноз гортани	
Основная предпосылка родовой травмы ЦНС у новорожденного	
гипоксия	+
гиперкапния	
гипопротеинемия	
гипергликемия	
Основная причина родовой травмы ЦНС у детей	
гипоксия	+
гиперкапния	
гипопротеинемия	
гипергликемия	
Основная цель сестринской помощи	
оценка качества ухода	
обследование больного	
диагностика и лечение заболевания	
создание условий для достижения пациентом гармоничного состояния с миром и с самим собой	+
Основной признак кровотечения из желудка или 12-ти перстной кишки	
Мелена	+
Боль в области ЖКТ	
Рвота	
Основной путь передачи инфекции при вирусном гепатите В у детей	
парентеральный	+
фекально-оральный	

контактно-бытовой	
водный	
Основной режим стерилизации в сухожаровом шкафу	
120 градусов – 25 мин	
160 градусов – 15 мин	
180 градусов – 60 мин	+
Основной режим стерилизации при автоклавировании	
110 градусов 60 мин	
132 градуса 20 мин	+
160 градусов 15 мин	
180 градусов 60 мин	
Основной симптом бронхиальной астмы у ребенка	
Судороги	
Приступ удушья	+
Отеки	
Основной симптом розовой гипертермии - это	
гиперемированные, теплые, влажные кожные покровы	+
озноб, бледные кожные покровы	
похолодание конечностей, акроцианоз	
цианотичный оттенок губ	
Основные действия медсестры на 1 этапе	
оказание помощи в осуществлении самоухода	
расспрос пациента	+
Основные действия медсестры на 2 этапе	
сбор информации о пациенте	
выявление проблем пациента	+
определение целей сестринского ухода	
реализация плана ухода	
Основные действия медсестры на 4 этапе	
расспрос пациента	
формулировка плана ухода	
реализация плана ухода	+
оценка качества ухода	
Основные клинические проявления синдрома Дауна	
монголоидный разрез глаз	+
квадратная форма головы	
уплощенная переносица	
интеллект развит по возрасту	
Основные клинические симптомы анемии у детей	
повышение аппетита	
повышение температуры тела	
бледность кожи и слизистых	+
Основные клинические симптомы сахарного диабета	
жажда, полиурия	+
олигурия	
отеки	
Основные моменты ухода за новорожденным при внутричерепной родовой травме	
прикладывание к груди	
холод над головой	+
тугое пеленание	
смена положения	
Основные признаки гипотрофии	
повышение температуры тела	
дефицит массы тела	+
сухость кожи и слизистых	
западение большого родничка	
Основные признаки энтеробиоза	
сниженный аппетит	
боли в животе	
зуд и расчесы в области ануса	+
рвота	
Основные симптомы «гипергликемической комы»	

кожа влажная, горячая на ощупь	
запах мочевины изо рта	
кожа сухая, холодная, запах ацетона изо рта	+
Основные симптомы коллапса	
кожные покровы бледные, холодные, влажные	+
сухость, гиперемия кожи и слизистых	
повышение АД, тахикардия	
Особенности диеты при гломерулонефрите	
увеличение количества жидкости	
обогащение животным белком	
ахлоридная, гипохлоридная	+
высококалорийная	
Особенности неврологического статуса новорожденного ребенка	
наличие врожденных рефлексов	+
отсутствие врожденных рефлексов	
громкий эмоциональный крик, длительный сон	
отсутствие реакции на болевые раздражители	
Особенности пневмонии у детей раннего возраста	
периоральный цианоз, усиливающийся при беспокойстве	
спазматический кашель	
патологическое дыхание типа Куссмауля	
втяжение уступчивых мест грудной клетки	+
Особое значение в развитии вторичных дискинезий желчевыводящих путей у детей придается	
лямблиозу кишечника	+
перенесенной дизентерии	
перенесенному сальмонеллезу	
хроническому тонзиллиту	
Острый стенозирующий ларинготрахеит характеризуется следующими признаками	
начало постепенное	
при дыхании затруднен выдох	
при дыхании затруднен вдох	+
все перечисленное верно	
Отсутствие «комплекса оживления» считается характерным признаком	
синдрома раннего детского аутизма	+
подростковой шизофрении	
шизофрении в позднем возрасте	
детских страхов	
пубертатного криза	
Отходы от лекарственных препаратов и дез. средств с истёкшим сроком годности относятся к	
класс А (эпидемиологически безопасные)	
класс Б (эпидемиологически опасные)	
класс В (эпидемиологически чрезвычайно опасные)	
класс Г (токсикологически опасные)	+
класс Д (радиоактивные)	
Охлаждение ожоговой поверхности холодной водой показано	
в первые минуты после ожога в течении 10-15 минут	+
не показано	
при ожоге II степени	
Оценка по шкале Апгар не проводится по	
частоте сердечных сокращений	
частоте дыхательных движений	
цвету кожных покровов	
массе тела	+
Паратрофия – это	
Недостаточная масса тела в пределах 10%	
Избыточная масса тела более чем на 10%	+
Избыточный рост более чем на 10%	
Парентеральным путем передаются заболевания	
грипп	
простой герпес	

гепатит А	
гепатит В	+
Первая медицинская помощь при ранениях вен шеи	
пальцевое прижатие	
наложение давящей воздухопроницаемой повязки	+
обезболивание	
прошивание раны	
Первичная обработка кожных покровов новорожденного ребенка в родильном доме	
не проводится	
проводится только в случае загрязнения меконием и кровью	+
проводится только доношенным	
проводится обязательно недоношенным	
Первичная профилактика бронхиальной астмы	
отказ от содержания домашних животных	
закаливание	+
отказ от вакцинации	
Первичное инфицирование туберкулезом — это	
туберкулез глаз	
милиарный туберкулез легкого	
туберкулезный бронхоаденит	
вираж туберкулиновой пробы	+
Первое прикладывание здорового новорожденного к груди матери проводят	
сразу после рождения	+
через 6 часов	
через 12 часов	
через 24 часа	
Первое прикладывание к груди матери должно быть осуществлено	
На вторые сутки после рождения	
Через 4 часа после родов	
В первые 30 минут после рождения	+
Первоначальная убыль массы тела новорожденного наблюдается в первые (дни жизни)	
1-2	
3-4	+
5-6	
7-8	
Первый прикорм с целью профилактики дефицита витамина Д должен включать продукт	
Хлеб	
Желток	+
Мясо	
Первый этап сестринского процесса включает	
прогнозирование результатов ухода	
беседу с родственниками пациента	+
определение существующих и потенциальных проблем пациента	
профилактику осложнений	
Первый этап скрининг - программы включает в себя	
антропометрию	+
определение остроты зрения	
осмотр невропатологом	
исследование глазного дна	
Первый этап скрининг-программы диспансеризации проводится	
медицинской сестрой и педиатром	
медицинской сестрой	+
педиатром	
узкими специалистами	
Первым из физиологических изгибов позвоночника формируется	
шейный лордоз	+
грудной кифоз	
поясничный лордоз	
Первыми признаками развивающегося травматического шока являются	
психомоторное возбуждение, неадекватная оценка своего состояния	+
судороги, апатия, потоотделение	
гиперемия, сухость кожи, пенное отделение изо рта, галлюцинации	

Перед подготовкой к УЗИ органов брюшной полости за три дня рекомендуют исключить продукты	
отварное мясо	
сдобу, молоко	+
сыр, творог	
рыбу	
Передозировка инсулина при лечении сахарного диабета у детей ведет к развитию комы	
гипергликемической (диабетической)	
гипогликемической	+
печеночной	
уремической	
Перенесенный двусторонний орхит при эпидемическом паротите у детей может привести к развитию	
гломерулонефрита	
пиелонефрита	
цистита	
бесплодия	+
Перинатальным называется период	
с момента рождения до 1 года	
с момента рождения до 28 дней	
с 28 недель беременности до 7 дней жизни	+
с рождения до 7 дней жизни	
Период новорожденности длится	
один год после рождения	
6 месяцев после рождения	
1 месяц после рождения	+
Пигментация сыпи у детей наблюдается при	
ветряной оспе	
кори	+
скарлатине	
краснухе	
План лечения анемии включает	
препараты железа	+
сульфаниламиды	
антигистаминные препараты	
Платяная вошь во внешней среде без пищи живет при низкой температуре	
до 0 суток	+
до месяца	
до года	
Позднее выявление сахарного диабета может привести к развитию комы	
Гипогликемической	
Кетоацидотической	+
Уремической	
Показание для введения докорма ребенку	
гипогалактия	+
паратрофия	
срыгивание	
дисфагия	
Показание для введения докорма ребенку	
гипогалактия	+
паратрофия	
срыгивание	
дисфагия	
Показание к наложению жгута	
Венозное кровотечение	
Артериальное кровотечение	+
Внутреннее кровотечение	
Кровотечение в просвет полого органа	
Показателями эффективной реанимации являются	
появление пульса на сонных артериях, сужение зрачков и появление их реакции на свет	+
расширенные зрачки	

правильный массаж сердца	
Полиморфизм сыпи (пятно, папула, везикула) характерен для кори	
краснухи	
ветряной оспы	+
скарлатины	
Половой криз у новорожденного проявляется повышением температуры тела	
увеличением массы тела	
увеличением грудных желез	+
снижением температуры тела	
Положительное окрашивание фенолфталеиновых проб синее	
розовое	+
коричневое	
Положительным окрашиванием азопирамовой пробы считается синее	
розовое	
коричневое	
розовое, синее или коричневое	+
Полость рта здоровому новорожденному обрабатывают ватным шариком	
ватно-марлевым шариком	
марлевым шариком	
не обрабатывают	+
Помощь при обмороке возвышенное положение головного конца	
холод к голове	
обрызгать лицо холодной водой	+
все перечисленное верно	
Понятие "врачебная тайна" предусматривается трудовым кодексом	
конституцией РФ	
законом об адвокатской деятельности	
ФЗ об основах охраны здоровья граждан	+
законом о полиции	
Понятие жизненно важная потребность человека означает способность функционировать независимо	
дефицит того, что существенно для здоровья и благополучия человека	+
любое осознанное желание	
потребность человека в самоактуализации	
После инъекции инсулина у ребенка появились чувство голода, потливость, тремор. Это гипергликемическая кома	
гипогликемическая кома	+
первый период лихорадки	
третий период лихорадки	
После перенесенного инфекционного заболевания формируется иммунитет активный, искусственный	
пассивный, искусственный	
пассивный, естественный	
активный, естественный	+
Последовательность оказания помощи при сдавливании конечности наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, асептическая повязка, иммобилизация, наружное охлаждение конечности, инфузия	+
асептическая повязка, наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, иммобилизация, наружное охлаждение конечности, инфузия	
освобождение сдавленной конечности, обезболивание, инфузия, наложение жгута, иммобилизация	
иммобилизация, обезболивание, наложение жгута, инфузия	
Последовательность появления симптомов при острой остановке кровообращения выключение сознания, появление судорог, расширение зрачков	+
расширение зрачков, появление судорог, выключение сознания	

появление судорог, расширение зрачков, отключения сознания	
Потемнение мочи у детей, больных вирусным гепатитом А, отмечается к концу периода	
преджелтушного	+
разгара	
постжелтушного	
реконвалесценции	
Потемнение мочи у детей, больных вирусным гепатитом А, отмечается к концу периода	
преджелтушного	+
разгара	
постжелтушного	
реконвалесценции	
Потенциальной проблемой при пиодермии является	
Опрелости	
Потница	
Сепсис	+
Потенциальные проблемы детей, страдающих анемией	
частые ОРВИ	+
лейкозы	
экзема	
эндокринные заболевания	
Потливость, облысение затылка у ребенка наблюдаются при	
рахите	+
потнице	
опрелости	
менингите	
Появление «заедов» в уголках рта, может быть причиной патологического состояния	
Пневмония	
Железодефицитная анемия	+
Атопический дерматит	
Появление папулы после введения вакцины БЦЖ возникает	
спустя неделю	
Через 3 месяца	+
Через 4 недели	
Появление язвочки на уздечке языка в результате сильного кашля у детей наблюдается при	
кори	
коклюше	+
ветряной оспе	
риновирусной инфекции	
Правила введения прикорма с целью перевода на общий стол	
до кормления грудью	
постепенно, начиная с малых количеств	
на всех видах вскармливания	
все перечисленной верно	+
Правила проведения физических упражнений детям раннего возраста	
проводить после кормления	
создавать положительные эмоции	
постепенно увеличивать нагрузки	+
проводить 2 раза в неделю	
Правила формирования речи у ребенка	
говорить с ребенком правильно	+
заменять трудные слова жестами	
подбирать книги по возрасту	
пользоваться облегченными стереотипными фразами	
Практически никогда не вызывает аллергии мука	
Манная	
Овсяная	
Соевая	+
Предвестники гипогликемической комы	
сухость кожи	
гипотонус мышц	
потливость, тремор конечностей	+

Предрасполагающие факторы развитие рахита у детей раннего возраста	
недостаток витамина А	
недостаточный сп	
однообразное молочное вскармливание	+
Преимущественное поражение трахеи у детей происходит при	
аденовирусной инфекции	
гриппе	+
риновирусной инфекции	
респираторно-синцитиальной инфекции	
Преимущество грудного молока перед коровьим	
высокое содержание белка	
высокое содержание витаминов	
высокая калорийность	
оптимальное соотношение пищевых веществ	+
Препараты железа м/с дает ребенку одновременно : с	
5% раствором глюкозы	
соком citrusовых	+
молоком	
Препараты железа рекомендуют запивать	
молоком	
соком	+
чаем	
минеральной водой	
При «белой» гипертермии у детей отмечается все, кроме	
мраморные кожные покровы	
бледные кожные покровы	
холодные конечности	
гиперемия кожных покровов	+
При «розовой» гипертермии у ребенка медсестра	
разденет ребенка и оботрет кожу теплым раствором	+
разотрет кожу спиртом и тепло укутает ребенка	
укутает одеялом ребенка	
сделает до прихода врача инъекцию с анальгином	
При аллергическом диатезе в первую очередь из рациона исключается	
Яблочный сок	
Апельсины	+
Кефир	
При анафилактическом шоке ребенка надо уложить	
на живот	
на спину	
на бок с приподнятыми ногами	+
с приподнятым изголовьем	
При внезапном снижении объема циркулирующей крови появляются	
бледность, гипертензия, напряженный пульс, головокружение	
цианоз, гипотензия, аритмия, тахипноэ, слабость, потеря сознания	
бледность, головокружение, слабость, гипотензия, пульс слабого наполнения, аритмия	+
При всех клинических формах туберкулеза легких у детей наблюдается	
синдром интоксикации	+
сухой кашель	
влажный кашель с мокротой	
боль в груди	
При гемолитической болезни новорожденных токсическое действие на организм оказывает	
фенилаланин	
билирубин	+
глюкоза	
холестерин	
При гемолитической болезни новорожденных токсическое действие на организм оказывает	
белок	
билирубин	+

глюкоза	
холестерин	
При геморрагическом васкулите	
сыпь симметричная петехиальная	+
симптом «шкурки леопарда»	
в крови снижено количество антигемофильного фактора	
характерны гемартрозы	
При гипотиреозе отмечается функциональная недостаточность железы	
поджелудочной	
щитовидной	+
гипофиза	
вилочковой	
При гипотрофии I степени дефицит массы тела ребенка составляет (в %)	
1-5	
5-10	
11-20	+
21-30	
При гипотрофии III степени дефицит массы тела ребенка составляет (в %)	
5-10	
11-20	
21-30	
свыше 30	+
При гипотрофии первой степени в постнатальный период масса тела снижена	
20	+
Более 35%	
5	
При гломерулонефрите в моче ребенка обнаруживается	
Бактериурия	
Гематурия	+
Кристаллурия	
При естественном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают	
бифидобактерии	+
кишечная палочка	
лактобактерии	
энтерококки	
При желудочно-кишечном кровотечении у ребенка медсестра в первую очередь обеспечит	
экстренную транспортировку в стационар	+
промывание желудка раствором аминокaproновой кислоты	
проведение гемостатической терапии	
направление на ФГДС	
При заболевании почек ребенку назначается диета под номером	
3	
10	
7	+
При закаливании ребенка необходимо	
добиваться положительных эмоциональных реакций	
учитывать национальность	
учитывать пол ребенка	
подходить индивидуально к каждому ребенку	+
При искусственном вскармливании в качестве заменителей женского молока используют	
фруктовые соки	
овощное пюре	
фруктовое пюре	
молочные смеси	+
При искусственном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают	
бифидобактерии, лактобактерии	
кишечная палочка, энтерококки	+
стафилококки, пневмококки	
протей, синегнойная палочка	

При каком заболевании с диагностической целью проводится соскоб с перинатальных складок	
Энтеробиоз	+
Аскаридоз	
Трихоцефалез	
При лечении ребенка с дискинезией желчевыводящих путей из диеты исключают	
шоколад, цитрусовые	+
молоко, творог, неострый сыр	
растительное масло (подсолнечное, оливковое)	
овощи, фрукты	
При лечении сахарного диабета у детей в питании разрешается	
банан	
виноград	
свекла	+
хурма	
При лечении сахарного диабета у детей сахар заменяют	
фруктозой	+
медом	
вареньем	
конфетами	
При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у ребенка должен быть	
1-2 см	
2-4 см	+
4-5 см	
6-8 см	
При носовом кровотечении	
уложить больного горизонтально	
посадить, запрокинув голову назад	
посадить, слегка наклонив голову вниз	+
возвышенное положение головного конца	
При носовом кровотечении ребенка необходимо	
уложить горизонтально	
усадить, запрокинув голову назад	
усадить, слегка наклонив голову вниз	
уложить с возвышенным изголовьем	+
При оказании неотложной помощи на обожженную поверхность накладывают	
сухую асептическую повязку	+
повязку с раствором чайной соды	
повязку с синтомициновой эмульсией	
При остром бронхолите у детей развивается выраженная недостаточность	
дыхательная, сердечно-сосудистая	+
дыхательная, почечная	
печеночная, почечная	
печеночная, надпочечниковая	
При пальцевом прижатии сонной артерии её прижимают к	
Ребру	
Поперечному отростку VI шейного позвонка	+
Середине грудино-ключично-сосцевидной мышцы	
Ключице	
При Пиелонефрите в моче ребенка обнаруживается	
Бактериурия	+
Гематурия	
Кристаллурия	
При подозрении на коклюш берут	
слизь из носа	
слизь из носоглотки	
капельки слизи при кашле или слизь с задней стенки глотки	+
При постановке пробы Манту ребенку туберкулин вводят	
внутрикожно	+
подкожно	
внутримышечно	
внутривенно	

При применении мочегонных препаратов рекомендуется употреблять	
молочные продукты	
мясо, рыбу	
изюм, курагу	+
свежие фрукты	
При проведении инсулинотерапии ребенок должен поесть через	
15-20 минут до инъекции	
30-40 минут до инъекции	
15-20 минут после инъекции	+
30-40 минут после инъекции	
При простудных заболеваниях детям с гемофилией нельзя назначать	
парацетамол	
ацетилсалициловую кислоту	+
аскорбиновую кислоту	
димедрол	
При развитии асфиксии у новорожденного медсестра должна прежде всего	
согреть ребенка	
придать ему возвышенное положение	
освободить дыхательные пути от слизи	+
холод над головой	
При рахите у ребенка нарушается обмен	
калия, магния	
кальция, фосфора	+
калия, железа	
кальция, железа	
При реанимации детей до 14 лет адреналин или атропин вводится в дозе	
0.04 на мг на кг	
0.01 на мг на кг	+
1 на мг на кг	
10 на мг на кг	
При реанимации детей до 14 лет дефибрилляцию нужно начинать	
с 2 ДЖ на кг	+
с 4 ДЖ на кг	
с 10 ДЖ на кг	
с 5 ДЖ на кг	
При сахарном диабете у детей на коже появляется	
фурункулез	+
желтуха	
анулярная эритема	
акроцианоз	
При скрытой форме спазмофилии ребенку назначают внутрь	
калия хлорид	
кальция хлорид	+
магния сульфат	
натрия хлорид	
При судорожном синдроме детям вводят	
седуксен 0,5-процентный р-р	
сернокислую магнезию 25-процентный р-р	
ГОМК /оксибутират натрия	
все перечисленное верно	+
При токсической дифтерии зева наблюдается	
жидкий стул	
отек подкожной клетчатки шеи	+
состояние ребенка не нарушено	
температура субфебрильная	
При уборке процедурного кабинета кушетка дезинфицируется	
после каждого пациента	
2 раза в день	+
в конце рабочего дня	
При угрозе стеноза гортани вне лечебного учреждения тактика медицинской сестры	
Срочная госпитализация	+
Оксигенотерапия	

ИВЛ	
При уходе за детьми с лейкозом особенно большое внимание уделяют	
лечебной физкультуре	
санитарно-эпидемиологическому режиму	+
диетотерапии	
режиму дня	
При уходе за новорожденным с травмой головного мозга исключают	
строгий покой	+
кислородотерапию	
тугое пеленание	
согревание	
При уходе за ребенком в острый период гломерулонефрита необходимо следить за	
числом сердечных сокращений	
характером стула	
числом дыхательных движений	
количеством выпитой и выделенной жидкости	+
При уходе за ребенком с острым бронхитом для лучшего отхождения мокроты медсестра осуществляет	
оксигенотерапию	
оксигенотерапию через пеногасители	
постановку горчичников на грудную клетку	
вибрационный массаж, постуральный дренаж	+
При уходе за ребенком с сердечной недостаточностью в питании следует ограничить	
белки, жиры	
белки, углеводы	
жидкость, жиры	
жидкость, поваренную соль	+
При уходе за ребенком с энтеробиозом сестра порекомендует	
диету №5	
спать в трусиках, коротко постричь ногти	+
обильное питье	
При хронизации пиелонефрита у детей	
прогноз благоприятный	
может развиваться ОПН	
может развиваться вторичное сморщивание почек (ХПН)	+
всегда наступает выздоровление	
При экхимозе для пероральной регидратации применяют	
«Цитроглюкосолан»	
«Линекс»	
«Регидрон»	+
«Лактулозу»	
Пригодность рабочего раствора азопирама проверяют нанесением	
2-3-х капель раствора на кровяное пятно	+
2-3-х капель раствора на стерильный ватный шарик	
Признак артериального кровотечения	
Медленное вытекание крови из раны	
Темно-вишнёвый цвет крови	
Сильная пульсирующая струя крови	+
Образование гематомы	
Признаками клинической смерти являются	
нитевидный пульс, цианоз, агональное дыхание	
потеря сознания, нитевидный пульс, цианоз	
потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, остановка дыхания, расширение зрачков	+
потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии	
Признаки недоношенности включают все, кроме	
кожа морщинистая, плохо развит подкожно-жировой слой	
большой родничок открыт	
отсутствует или снижен сосательный рефлекс	
крик громкий, настойчивый	+
Признаки ревматизма могут появиться после перенесенной	
кори	

скарлатины	+
дифтерии	
ветряной оспы	
Признаком недокорма грудного ребенка является	
малая прибавка массы тела	+
частое мочеиспускание	
обильный стул	
лихорадка	
Приказ о нормативах потребления этилового спирта	
№ 245	+
№ 238	
№ 510	
Прикорм – это	
Разнообразиие пищевого рациона	
Дополнительная пища, даваемая ребенку первого года жизни, которому не достаточно грудного молока	
Введение в пищевой рацион новых продуктов, с целью восполнения энергетических затрат малыша	+
Прикорм начинают вводить ребенку	
перед кормлением грудью	+
после кормления грудью	
полностью заменяя одно кормление грудью	
между кормлениями грудью	
Прикорм начинают давать ребенку	
перед кормлением грудью	+
после кормления грудью	
полностью заменяя одно кормление грудью	
между кормлениями грудью	
Принципы лечения эпидемического паротита	
симптоматическое лечение	+
антибиотикотерапия	
десенсибилизирующие средства	
препараты «Са»	
Приоритетом в борьбе с инфекциями в системе первичной медико-санитарной помощи детям является	
диагностика инфекционных заболеваний	
лечение инфекционных заболеваний	
применение средств иммунопрофилактики	+
карантинные мероприятия	
Приступообразный спазматический кашель характерен для	
риновирусной инфекции	
ветряной оспы	
коклюша	+
эпидемического паротита	
Причина внезапной смерти у детей с лимфатико-гипопластическим диатезом – недостаточность	
дыхательная	
сердечная	
почечная	
надпочечниковая	+
Причина гемолитической болезни новорожденных	
гипоксия	
гиперкапния	
внутриутробное инфицирование	
резус-конфликт	+
Причина относительно низкого АД у детей	
малый объем левого желудочка, широкие артерии	+
малый объем левого желудочка, узкие артерии	
большой объем левого желудочка, широкие артерии	
большой объем левого желудочка, узкие артерии	
Причинами носового кровотечения у детей могут быть	
травма носа	
заболевания крови	

гиповитаминозы	
все выше перечисленное	+
Причины гемофилии	
повышенная проницаемость сосудистой стенки	
уменьшение количества тромбоцитов в крови	
недостаток в крови антигемофильного гаммоглобулина	+
инфекционно-аллергическая природа заболевания	
Причины рахита	
недостаток витамина Д	+
недостаток витамина С	
недостаток железа	
Проба Манту считается положительной	
гиперемия 5 мм и более	
папула 3 мм	
папула 5 мм и более	+
гиперемия 15 мм	
Проба Феллинга проводится ребенку для диагностики	
болезни Дауна	
гемофилии	
фенилкетонурии	+
сахарного диабета	
Провести профилактику ВИЧ-инфекции медработнику после аварийной ситуации с ВИЧ-инфицированным пациентом антиретровирусными препаратами следует в период, не позднее	
72	+
1	
24	
Проводить дезинфекцию использованного одноразового инструментария	
Необходимо	+
не обязательно	
Продолжительность инкубационного периода при ветряной оспе у детей (дни)	
1-10	
10-21	+
22-30	
30-40	
Продолжительность инкубационного периода при сальмонеллезе у детей от нескольких часов до (дней)	
3	
7	+
10	
14	
Продолжительность инкубационного периода при эпидемическом паротите у детей составляет (дни)	
1-10	
11-21	+
21-30	
31-40	
Продолжительность периода внутриутробного развития составляет (в неделях беременности)	
18-20	
22-24	
30-32	
38-40	+
Продолжительность периода новорожденности составляет (в мес.)	
1	+
4	
6	
12	
Продукты, препятствующие жизнедеятельности лямблий в кишечнике	
сладкие блюда	
мучные блюда	
крупы	
брусника и клюква	+

Простой инсулин при лечении сахарного диабета вводится	
за 5-10 минут до еды	
за 15-25 минут до еды	+
за час до еды	
через 20 минут после еды	
Противопоказания к ревакцинации БЦЖ	
реконвалесцент ОРВИ	
туберкулез	+
ушиб нижней конечности	
Профилактика гипокинезии у детей включает	
организацию массовых спортивных соревнований	+
уменьшение динамического компонента на уроках физкультуры	
исключение занятия на спортивных снарядах на уроках физкультуры	
Профилактика рахита недоношенным детям проводится	
с момента рождения	
с конца первой недели	
с трех недель	+
с 4-х недель	
Проявление пищевой аллергии является	
энтерит	
желтуха	
Крапивница	+
Проявление у детей одновременно с гематурией гипертензии, отеков характерно для	
гломерулонефрита	+
цистита	
пиелонефрита	
нефроптоза	
Проявлению атопического дерматита у детей способствует избыточное употребление	
углеводов	+
поваренной соли	
жиров	
жидкости	
Пульс у грудного ребенка в минуту	
70-80	
90-100	
110-120	+
120-140	
Пуповинный остаток отпадает у новорожденного на сроке (день жизни)	
1-2	
3-4	+
4-5	
6-7	
Пути оздоровления детей с ревматизмом	
режим, закаливание, бициллинопрофилактика	+
физиотерапия, фитотерапия	
аэрозольтерапию	
Пути передачи вирусного гепатита В	
воздушно-капельный	
парэнтеральный	+
пищевой	
трансплацентарный	
Пути передачи ВИЧ-инфекции	
Половой путь	
Парентеральный путь	
Вертикальный путь	
Все ответы верны	+
Пути распространения ветряной оспы	
контактно-бытовой	
воздушно-капельный	+
воздушно-пищевой	
Пятна Бельского-Филатова-Коплика появляются на	
лице	

туловище	
конечностях	
слизистой оболочке щек	+
Развитие гломерулонефрита у детей в последнее время чаще отмечается после инфекции	
стафилококковой	
стрептококковой	+
колибацилярной	
протейной	
Развитие ларингита с синдромом крупа у детей наблюдается при	
аденовирусной инфекции	
парагриппе	+
риновирусной инфекции	
респираторно-синцитиальной инфекции	
Раствор для дезинфекции термометров необходимо менять	
ежедневно	+
через день	
1 раз в 3 дня	
1 раз в неделю	
Растворы, использующиеся для обеззараживания кожи при попадании на них крови больного СПИДом	
6% перекись водорода	
70% спирт	+
1% иодонат	
Расход спирта этилового 95% списывается в	
Гр	+
Мл	
Кг	
Рахит у детей развивается вследствие дефицита витамина	
А	
И	
С	
Д	+
Рвота «кофейной гущей» у детей возникает при	
кровотечении из язвы	+
деформации луковицы двенадцатиперстной кишки	
пенетрации язвы	
перфорации язвы	
Реакция эмансипации характерна для	
пожилых	
младенцев	
престарелых	
подростков	+
Реакция, выражающаяся настойчивым стремлением подростка добиться успеха в той области, в которой он слаб, называется	
реакцией компенсации	
реакцией гиперкомпенсации	+
реакцией оппозиции	
реакцией эмансипации	
реакцией достижения	
Реанимацию обязаны проводить	
только врачи и медсестры реанимационных отделений	
все специалисты, имеющие медицинское образование	+
все взрослое население	
Реанимация показана	
в каждом случае смерти больного	
только при внезапной смерти молодых больных и детей	
при внезапно развивающихся терминальных состояниях	+
Реанимация это	
раздел клинической медицины, изучающей терминальные состояния	
отделение многопрофильной больницы	
практические действия, направленные на восстановление жизнедеятельности	+

Ребенка рекомендуется отнимать от груди	
в жаркий период года	
холодное время года	+
при заболеваниях	
при контакте с инфекционными больными	
Ребенку с любой формой гломерулонефрита в первую очередь назначают	
антибактериальную терапию	
строгий постельный режим и диету	+
гипотензивные и диуретические препараты	
препараты цитостатического действия	
Ребенку с острым панкреатитом в первые дни назначается	
голод	+
диета № 5а	
диета № 5	
диета № 9	
Ребенок к школьному обучению не готов, если	
биологический возраст соответствует паспортному	
имеются отклонения в поведении	
имеются множественные дефекты звукопроизношения	+
умеет четко и правильно выразить свою мысль	
Ребенок начинает держать голову	
в 1,5 месяца	+
в 3 месяца	
в 6 месяцев	
Ребенок начинает сидеть	
в 1,5 месяца	
в 3 месяца	
в 6 месяцев	+
Ребенок начинает удерживать голову в возрасте (мес.)	
1-2	+
3-4	
5-6	
7-8	
Ребенок начинает ходить	
в 6 месяцев	
в 7-8 месяцев	
в 11-12 месяцев	+
Ребенок с гемофилией должен постоянно наблюдаться	
детским травматологом	
гематологом специализированного центра	+
детским хирургом	
главным врачом поликлиники	
Ребенок с заболеваниями органов дыхания наблюдается у	
педиатра и пульмонолога	+
кардиоревматолога	
аллерголога и дерматолога	
Ребенок с рахитом наблюдается у	
педиатра	+
эндокринолога	
невропатолога	
Ребенок с ревматизмом наблюдается у	
педиатра, кардиоревматолога	+
аллерголога	
невропатолога	
Редко болеют дизентерией дети	
до 1 года	+
1-3 лет	
3-5 лет	
5-7 лет	
Результатом правильного наложения жгута при кровотечении является	
прекращение кровотечения, отсутствие пульса, бледность кожи	+
уменьшение кровотечения, сохранение пульса, увеличение цианоза	

прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза	
уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи	
Реинвазии характерны при заражении	
аскаридами	
карликовым цепнем	
острицами	+
лямблиями	
Рекомендуемое суточное количество молочных продуктов детям от одного года до двух лет составляет	
300 – 400 мл	
100 – 200 мл	
500 – 600 мл	+
Родовая травма возникает по одной из причин	
Переносимая беременность	
Не соответствие размеров таза женщины и головы плода	+
Аномалии в строении генов	
С помощью пробы по Зимницкому можно определить	
Цвет, объем, плотность мочи	
Глюкозу в моче	
Концентрационную функцию почек	+
С целью снятия судорог у ребенка при спазмофилии применяют	
пенициллин, ампициллин	
седуксен, хлорид кальция	+
димедрол, тавегил	
коргликон, строфантин	
Санаторно-курортное лечение детям с заболеваниями органов пищеварения рекомендуют	
в период обострения	
сразу после стихания обострения	
не ранее чем через 6 мес. после обострения	+
не ранее чем через 2 мес. после обострения	
Сангвиник является типом темперамента	
бурным, порывистым, резким, горячим	
спокойным, вялым, медлительным, устойчивым	
живым, подвижным, отзывчивым, эмоциональным	+
Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий	
по профилактике экзогенных интоксикаций	
направленных на пропаганду «Здорового образа жизни»	
по профилактике ИСМП	+
Сбор отходов класса Б (не колеще-режущий инструментарий) осуществляется в	
одноразовые пакеты белого цвета	
одноразовые пакеты желтого цвета	+
одноразовые пакеты красного цвета	
Светлая кожа, голубые глаза, рыжие волосы, «мышинный» запах характерны для	
болезни Дауна	
гемофилии	
рахита	
фенилкетонурии	+
Свободное вскармливание – это	
Прикладывание к груди по требованию ребенка	+
Прикладывание к груди через каждые 3 часа с перерывом в ночное время	
Прикладывание каждые три часа, включая ночь	
Сдавленный "петушинный" крик на выдохе у ребенка наблюдается при	
бронхиальной астме	
бронхите	
ларингоспазме	+
фарингите	
Сенсибилизирующие факторы возникновения аллергозов	
однообразное вскармливание	
рахит, анемия	
пыльца растений, домашняя пыль	+

Сердцебиение, дрожь тела, повышенная потливость, эмоциональная лабильность, потеря массы тела при повышенном аппетите характерны для детей, страдающих	
диффузным токсическим зобом	+
гипотиреозом	
гиповитаминозом В1	
гиповитаминозом В6	
Сестринские вмешательства при уходе за недоношенным с массой тела менее 1500 г в первые сутки жизни включают	
согревание в кувезе или в кровати с подогревом	+
открытое пеленание	
кормление через зонд грудным молоком	
прикладывание к груди матери	
Сестринские рекомендации матери при гипогалактии	
употребление жидкости более 2 литров	
эмоциональный комфорт, достаточный отдых	+
прием пива	
Сестринские рекомендации при анемии	
диета №7	
обильное питье	
контроль за приемом препаратов железа	+
Сестринские рекомендации ребенку с вегетососудистой дистонией	
соблюдение режима труда, отдыха, питания	+
регулярно измерять температуру тела	
измерять суточный водный баланс	
опекать ребенка, освободить от физкультуры	
Сестринские рекомендации с язвенной болезнью желудка	
поддерживать психологический комфорт, слизистые каши	+
очистительные клизмы на ночь	
крепкие мясные бульоны	
Сестринский уход при опрелостях	
проведение ежедневных воздушных и гигиенических ванн	+
поддержание температурного режима в помещении 24 - 26°С	
применение гормональных мазей	
подбор рациональной одежды	
Сестринское вмешательство в I период лихорадки	
напоить теплым чаем	+
согреть	
растереть кожу 40 % спиртовым раствором	
Симметрично расположенные пятнисто-папулезные высыпания на коже типичны для	
тромбоцитопатии врожденной	
тромбоцитопенической пурпуры	
геморрагического васкулита	+
гемофилии	
Симптом Бельского-Филатова-Коплика характерен для	
аденовирусной инфекции	
гриппа	
ветряной оспы	
кори	+
Симптом врожденных пороков сердца	
тошнота, рвота	
боли в мышцах и суставах	
повышение температуры до 39 град	
грубый систолический шум в сердце	+
Симптомами начального периода рахита являются	
рахитические четки	
беспокойство, потливость	+
«лягушачий» живот	
«куриная» грудь	
Симптомы железодефицитной анемии	
сухость кожи, румянец на щеках	
костные деформации	
снижение кальция в сыворотке крови	

бледность кожи, снижение гемоглобина	+
Симптомы кишечного эксикоза	
сухость кожи, олигурия	+
полиурия, влажность кожи	
одышка, тахикардия	
судороги	
Симптомы скарлатины	
ангина, интоксикация	+
мелкоточечная сыпь	
спазматический кашель	
пятнисто-папулезная сыпь	
Склонность детей к срыгиванию обусловлена	
слабым развитием кардиального сфинктера	+
хорошим развитием кардиального сфинктера	
слабым развитием пилорического сфинктера	
хорошим развитием пилорического сфинктера	
Содержание гемоглобина у ребенка грудного возраста в норме составляет (в г/л)	
115–120	
120–140	+
140–170	
170–240	
Специализированная медицинская помощь – это	
оказание помощи по жизненным показаниям	
оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным	
само- и взаимопомощь, помощь спасателей	
полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами	+
Специфический признак кори в катаральный период	
насморк	
боль в горле	
пятна Филатого-Бельского на слизистой рта	+
Специфическое осложнение ГБН	
отит	
пневмония	
сепсис	
билирубиновая энцефалопатия	+
Спиртовой компресс ребенку накладывают на	
1-2 часа	
4-6 часов	+
8-10 часов	
12-24 часа	
Среднее значение длины ребенка в год	
95	
75	+
60	
Среднее значение окружности головы новорожденного	
30 – 32 см	
32 – 34 см	
33 – 35 см	+
Среднее значение окружности груди ребенка после рождения	
32 – 34	+
33 – 36	
35 – 37	
Среднее значение частоты пульса у новорожденного составляет	
90 в минуту	
100 в минуту	
130 – 140 в минуту	+
Среднее значение частоты пульса у ребенка 10 лет составляет	
100 в минуту	
90 в минуту	+
120 в минуту	
Среднюю порцию мочи собирают для исследования	
по Нигипоренко	+

по Амбурже	
по Зимницкому	
по Аддис-Каковскому	
Средняя продолжительность инкубационного периода при коклюше у детей составляет (дни)	
4	
10	
14	+
20	
Срок введения соков при естественном вскармливании	
с 2-х недель	
с 1-го месяца	
с 4-х месяцев	+
с 5-ти месяцев	
Срок гестации недоношенности первой степени (в неделях)	
35-37	+
34-32	
31-29	
менее 29	
Срок диспансерного наблюдения при энтеробилзе	
1	+
2	
3	
Срок заращения большого родничка в пределах нормы	
1,5 – 2 года	+
6	
2, 5 года	
Срок изоляции ребенка больного скарлатиной посещающего детский сад	
22 дня от начала заболевания	+
17 дней от начала заболевания	
14 дней от начала заболевания	
7 дней от начала заболевания	
Срок карантина для контактных по гепатиту А	
35	+
7	
14	
21	
Срок карантина при дифтерии	
3	
7	+
14	
21	
Срок первого патронажа новорожденного	
на первой неделе	
на первом месяце жизни	
в первые 2 дня после выписки	+
не обязателен	
Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в невскрытом биксе со штатным фильтром	
3	
20	+
30	
Стерильный стол накрывают	
на сутки	
на 12 часов	
на 6 часов	+
Стойкий пожизненный иммунитет формируется у детей после перенесенного гепатита	
D	
C	
B	
A	+
Столкновение интересов двух или нескольких людей называется	

конфликтом	+
стрессом	
переговорами	
Строгий постельный режим показан ребенку с пиелонефритом	
в первые три дня болезни	
в острый период заболевания	+
до полного выздоровления	
в период бактериурии	
Судороги при спазмофилии у детей обусловлены тем, что в составе крови происходит	
повышение уровня железа	
понижение уровня железа	
повышение уровня кальция	
понижение уровня кальция	+
Судорожный синдром у детей чаще возникает при	
аденовирусной инфекции	
гриппе	+
риновирусной инфекции	
респираторно-синцитиальной инфекции	
Суточное количество жидкости для кормящей матери (л)	
1-1,5	
2-2,5	+
3-3,5	
4-4,5	
Суточный объем молока для детей первых 10 мес. жизни не должен превышать (л)	
0,5	
1	+
1,5	
2	
Суточный объем питания для детей первых 10 мес. жизни не превышает (л)	
0,5	
1	+
1,5	
2	
Сцеживание остатков грудного молока проводится с целью	
профилактики гипогалактии	+
профилактики гипотрофии	
снижения иммунитета	
повышения иммунитета	
Сыпь при кори у детей	
геморрагическая	
везикулезная	
пустулезная	
пятнисто-папулезная	+
Тактика медицинской сестры при обнаружении у новорожденного ребенка мелены	
вызвать врача, пеленки с меленой сохранить	+
провести гемостатическую терапию, вызвать врача	
отсосать слизь, вызвать врача	
промыть желудок, вызвать врача	
Тактика медицинской сестры при угрозе стеноза гортани у ребенка вне лечебного учреждения	
направление в поликлинику	
срочная госпитализация	+
проведение оксигенотерапии	
назначение физиотерапевтических процедур	
Тактика сестринского вмешательства в период максимального повышения температуры тела	
растереть кожу раствором столового уксуса	+
горячие ножные ванны	
грелка к ногам	
Тактика сестринского вмешательства при анафилактическом шоке	
промыть желудок	
приложить грелку на место инъекции	

приложить холод на место введения инъекции, обколоть место введения раствором адреналина	+
Тактика сестринского вмешательства при гипогликемии	
провести оксигенотерапию	
ввести назначенную дозу инсулина	
напоить сладким чаем	+
Тактика сестринского вмешательства при коллапсе	
уложить ребенка с приподнятым ножками	+
подать кислород с пеночастителем	
наложить венозные жгуты	
Тактика сестринского вмешательства при критическом снижении температуры тела	
согреть	+
обеспечить высококалорийное питание	
растереть кожу 40% раствором спирта	
Тактика сестринского вмешательства при носовом кровотечении	
наклонить голову вперед, наложить переднюю тампонаду носа	+
приложить грелку в область переносицы	
запрокинуть голову назад	
Тактика сестринского вмешательства при судорогах	
предотвратить прикуса языка, уложить ребенка на мягкую поверхность	+
применить грелку	
применить холод к голове	
Тактика сестринского процесса при обмороке	
применить горячие кожные ванны	
расстегнуть стесняющую одежду, вдыхать пары нашатырного спирта	+
уложить ребенка с приподнятым головным концом	
Тело в длину новорожденного должно оставлять	
46-48 см	
50 – 52 см	+
53 – 55 см	
Температура воды для купания новорожденного	
40-42 С	
28-30 С	
36-37,5 С	+
20-24 С	
Температура воды для первой гигиенической ванны здоровому новорожденному составляет (в гр.)	
25	
30	
37	+
40	
Температура воздуха в палате новорожденных должна быть (в гр.)	
18-19	
20-21	
22-23	+
24-25	
Температура воздуха в палате новорожденных должна быть (в град. Ц.)	
18–19	
20–21	
22–23	
26–28	+
Тенезмы характерны для	
колиинфекции	
сальмонеллеза	
дисбактериоза	
дизентерии	+
Терминальные состояния - это	
обморок, коллапс, клиническая смерть	
преагония, агония, клиническая смерть	+
агония, клиническая смерть, биологическая смерть	
Термометры дезинфицируют	
0,5 % раствор хлорамина	

0,5% хлорной извести	
2% раствор хлорамина	+
5% раствор хлорамина	
Типичная локализация сыпи при скарлатине	
разгибательная поверхность конечностей, ягодицы	
сгибательная поверхность конечностей, в естественных складках кожи	+
только на лице	
равномерное расположение	
Транспортировка больных с повреждением таза	
лежа на носилках, поза «лягушки»	+
в устойчивом боковом положении	
полусидя	
лежа на носилках с валиком под поясницей	
Третий прикорм вводят грудному ребенку в возрасте (мес.)	
5	
7	
8	+
9	
Третий этап сестринского процесса включает	
планирование объема сестринских вмешательств	+
срочное оказание неотложной помощи	
выявление проблем пациента	
сбор информации	
Третьим прикормом для ребенка грудного возраста является	
фруктовый сок	
овощное пюре	
молочная каша	
кефир	+
Тройной прием по Сафару включает	
поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову	
освобождение от стесняющей одежды области шеи	
отгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта	+
Туберкулин применяют	
для активной иммунизации	
для пассивной иммунизации	
для аллергодиагностики туберкулеза	+
Туберкулинодиагностика проводится	
для выявления инфицированных	+
для лечения туберкулеза	
У глубоко недоношенных детей состояние родничков	
все закрыты	
открыт большой	
открыт большой и малый	
открыт большой, малый и боковые	+
У детей находящимся под диспансерным наблюдением с пиелонефритом, исследуют	
общий анализ мочи; пробу по Нечипоренко; анализ крови	+
биохимический анализ крови	
ЭКГ и ФКГ	
У детей находящимся под диспансерным наблюдением с ревматизмом исследуют	
ЭКГ; ФКГ, общий анализ крови	+
анализ крови и реакцию Сулковича	
мочу и кровь на сахар	
У детей проба Манту считается гиперэргической при диаметре папулы	
12	
15	+
17	
10	
У недоношенного новорожденного отмечается	
громкий крик	
мышечный гипертонус	
мышечная гипотония	+
спонтанная двигательная активность	

У новорожденного отмечается физиологическая	
гипертония мышц-разгибателей	
гипертония мышц-сгибателей	+
гипотония мышц-сгибателей	
нормотония мышц	
У ребенка раннего возраста цистит возникает при несоблюдении	
правил гигиены промежности	+
режима кормления	
режима сна	
температурного режима в помещении	
У ребенка страдающего малой хореей при ревматизме отмечается	
двигательное беспокойство	
непроизвольные движения отдельных мышц	
изменение почерка	
все перечисленной верно	+
Увеличение околоушных слюнных желез у детей характерно для	
кори	
краснухи	
ветряной оспы	
эпидемического паротита	+
Укажите сестринские рекомендации ребенку с сахарным диабетом после стационарного лечения	
обучаться в «Диабет-школе»	+
заниматься физкультурой в основной группе	
принимать жидкости больше физиологической нормы	
выработать оптимальный объем физических нагрузок	
Улучшить отхождение мокроты при продуктивном кашле возможно, если	
Провести вибрационный массаж	+
Поставить горчичники	
Ввести антибиотики	
Ультрафиолетовые лучи убивают микобактерии за	
2 – 3 секунды	
2 – 3 минуты	+
2 – 3 часа	
2 – 3 дня	
Уменьшение суточного объема мочи у ребенка – это	
олигурия	+
анурия	
полиурия	
поллакиурия	
Условия проведения пробы Манту	
проводится сухим туберкулином	
проводится туберкулином в стандартном разведении	
вводится подкожно 0,1 мл туберкулина	
вводится внутривенно 0,1 мл туберкулина	+
Факторы риска при заболеваниях почек в раннем возрасте	
искусственное вскармливание	
аномалии развития мочевыводящих путей	+
перегревание	
Факторы риска развития анемии у детей раннего возраста	
однообразное молочное вскармливание	+
недостаточный сон	
нарушение кальциевого обмена	
Факторы, способствующие акту сосания грудного ребенка	
комочки Биша, большой язык	+
комочки Биша, маленький язык	
обильное слюноотечение, большой язык	
обильное слюноотечение, маленький язык	
Физиологическое снижение массы тела новорожденного составляет до (в %)	
10	+
20	
30	

40	
Физиологическое снижение массы тела новорожденного составляет до (в %)	
10	+
20	
30	
40	
Форма 112 это	
Дневник группы	
История развития ребенка	+
Журнал изолятора	
Фуразолидоном и метронидазолом проводят специфическое лечение детей с	
описторхозом	
лямблиозом	+
трихоцефалезом	
аскаридозом	
Характер сыпи при кори	
розовая мелкоточечная	
красная пятнисто – папулезная	+
мелкая пятнисто- папулезная	
Характер сыпи при скарлатине	
везикулярная	
пятнисто-папулезная	
мелкоточечная	+
пустулезная	
Характеристике доношенного новорожденного ребенка соответствует	
пушковые волосы по всему телу	
мягкие ушные раковины	
ногти, достигающие до конца ногтевого ложа	+
Характерное проявление нервно-артритического диатеза у детей	
приступ рвоты	+
приступ удушья	
отеки	
желтуха	
Характерными признаками спазмофилии у детей являются	
отеки	
судороги	+
запоры	
кровоизлияния	
Цель введения прикорма	
удовлетворение возросших потребностей в пищевых веществах	+
обеспечение потребности в жирах	
обеспечение потребности в углеводах	
обеспечение потребности в поваренной соли	
Цель введения прикорма	
удовлетворение возросших потребностей в пищевых веществах	+
обеспечение потребности в жирах	
обеспечение потребности в углеводах	
обеспечение потребности в поваренной соли	
Цель сестринского процесса	
диагностика и лечение заболевания	
обеспечение приемлемого качества жизни в период болезни	+
решение вопроса об очередности мероприятий ухода	
активное сотрудничество с пациентом	
Целью первого этапа реанимации при асфиксии новорожденного является	
искусственная вентиляция легких	
закрытый массаж сердца	
коррекция метаболических расстройств	
восстановление проходимости дыхательных путей	+
Частота дыхания новорожденного в минуту	
15-20	
25-30	
40-60	+

80-100	
Частота дыхательных движений у новорожденного в пределах нормальных значений составляет	
60 – 70 в минуту	
40 – 50 в минуту	+
16 – 20 в минуту	
Частота дыхательных движений у ребенка 5 лет в пределах нормальных значений составляет	
30 – 35 в минуту	
20 – 25 в минуту	+
15 – 20 в минуту	
Частота ИВЛ новорожденному методом «изо рта в рот» проводится со скоростью	
20	
40	
60	+
Частота искусственных вдохов при ИВЛ у детей должна быть	
4-5 в минут	
12-16 в минуту	
20 в минуту	+
60-80 в минуту	
Частота пульса у ребенка 1 года составляет в 1 мин	
140-160	
110-120	+
90-100	
70-80	
Чесоточный клещ вне тела человека живет	
до 5 часов	
до 2 суток	
до 5 суток	+
до 2 недель	
Четвертый этап сестринского процесса – это	
реализация плана сестринских вмешательств	+
обследование-сбор информации о больном	
оценка эффективности действий, причин, ошибок и осложнений	
постановка сестринского диагноза	
Число дыхательных движений у новорожденного составляет	
18-20 в минуту	
20-30 в минуту	
20-40 в минуту	
40-60 в минуту	+
Эндоскопическое исследование всех отделов толстой кишки у детей	
дуоденоскопия	
колоноскопия	+
ректороманоскопия	
ирригоскопия	
Эпидемический паротит в дальнейшем может привести к	
Бесплодие	+
Цистит	
Пиелонефрит	
Эффективная помощь при асфиксической стадии истинного крупа	
гемотрансфузия	
интубация	+
гемосорбция	
гемодиализ	
Эшерихиозом чаще болеют дети в возрасте	
13-15 лет	
11-12 лет	
от 2 до 7 лет	
первого года жизни	+
Ядерная желтуха у новорожденного обусловлена высоким содержанием в крови	
белка	
билирубина	+

глюкозы	
холестерина	
Язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки наиболее подвержены дети	
первого года жизни	
раннего возраста	
дошкольного возраста	
школьного возраста	+