

Стоматология ортопедическая

Текст вопроса	Верный вариант
Текст варианта	
"Вакуумное литье" - это заполнение формы сплавом за счет разрежения воздуха в форме избыточного давления на сплав центробежных сил	+
"Ограничитель" - это выступ между дугой и седлом каркаса бюгельного протеза, где заканчивается граница базиса	+
ответвление от дуги в сторону клыка, препятствующее опрокидыванию верхнего бюгельного протеза	
приспособление, ограничивающее толщину бюгельного протеза	
«Дезинфекция» – это уничтожение патогенных микроорганизмов	
комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды	+
уничтожение грибков	
уничтожение вирусов	
«Клиническая» шейка зуба – это место перехода коронки зуба в корень	+
перехода эмали в цемент	
сужения на зубе	
«Стерилизация» – это уничтожение патогенных бактерий	
уничтожение микробов на поверхности	
уничтожение инфекции	
освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение	+
Адсорбент, применяемый при отравлениях	
раствор крахмала	
раствор сернистой магнезии	
активированный уголь	+
Анатомический экватор зуба – это наибольший периметр	+
наименьший периметр	
наибольшая площадь	
Антиретровирусные препараты, предназначенные для профилактики ВИЧ-инфекции медицинских работников должны храниться	
в сейфе	
в месте, доступном для сотрудников	+
в доступном месте для сотрудников и пациентов	
Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на предупреждение попадания микроорганизмов в рану	
полное уничтожение микробов и их спор	
стерильность	
предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом	
ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом	+
Аппарат, воспроизводящий все движения нижней челюсти, называется	
окклюдатором	
артикулятором	+
АппаратХургиной относится к аппаратам механического действия	

функционального действия	
комбинированного (сочетанного) действия	+
Аптечку «анти - ВИЧ», при аварийной ситуации с пациентом - носителем вирусного гепатита В или С	
Можно использовать	+
Нельзя использовать	
Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на	
уничтожение микробов в ране	
полное уничтожение микробов и их спор	
стерильность	
ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом	
предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом	+
Бактерицидные лампы дезинфицируют	
Спиртом этиловым 70%	+
Дезинфицирующим средством	
Хлоргексидином спиртовым 0,5%	
Барьерные меры защиты медицинского персонала при выполнении любых медицинских манипуляций	
халат	
шапочка	
одноразовая маска	
перчатки	
сменная обувь	
все ответы верны	+
Бензина в лаборатории должно быть	
1	
дневная норма	+
1	
Больные с электротравмами после оказания помощи	
направляются на прием к участковому врачу	
не нуждаются в дальнейшем обследовании и лечении	
госпитализируются скорой помощью	+
Бюгельная коронка-это	
восстановительная коронка	
коронка с выраженным экватором и углублением на проксимальной стороне жевательной поверхности	+
экваториальная коронка	
В балочной конструкции в несъемном протезировании жевательное давление передается на	
опорные зубы	+
слизистую оболочку полости рта	
В боковом участке нижней челюсти тело мостовидного паяного: протеза изготавливается	
седловидной формы	
касательной формы	
промывной формы	+
В высохшей мокроте на различных предметах внешней среды микобактерии туберкулеза могут сохранять свои свойства в течение	
нескольких дней	
нескольких месяцев	+
несколько лет	
несколько часов	
В зависимости от принципа действия ортодонтические аппараты делятся на	
механические (активные), функционально-действующие (пассивные), комбинированные	+
реципрокные, стационарные, комбинированные	
дуговые, капповые, блоковые	
В качестве опорных зубов в несъемном протезировании интактные зубы	
могут быть использованы	+
не могут быть использованы	
В лаборатории загорелась электропроводка силовой цепи. Ваше первоочередное действие	
тушить проводку с помощью огнетушителя	

выключить электроприборы, находящиеся рядом очагом	
выключить рубильник. Обесточив всю цепь	+
В металлопластмассовой коронке сплав и пластмасса соединяются в основном	
механически	+
химически	
комбинированно	
В одной заводской упаковке (коробке) воска для базисов	
250	
500	+
750	
В очаге поражения аммиаком для защиты органов дыхания следует надеть повязку, смоченную	
этиловым спиртом	
5% раствором уксусной кислоты	+
2% раствором питьевой соды	
2% раствором новокаина	
В помещениях зуботехнической лаборатории применяется вентиляция	
вытяжная	
общая	
приточно-вытяжная	+
Верхние боковые естественные зубы закрываются базисом на	
1/3	
1/2	
2/3	+
Верхние передние естественные зубы закрываются базисом на	
1/3	+
1/2	
2/3	
Вестибулярная поверхность металлической основы коронки Белкина перед формовкой пластмассы маскируются покровным лаком	
для улучшения сцепления металла и пластмассы	
во избежание просвечивания металла	+
с целью упрочнения пластмассы	
Вещество, которым непосредственно покрывают восковую композицию перед литьем КХС называют	
облицовочным	
упаковочным	
формовочным	+
Вещество, составляющее основную массу зуба – это	
пульпа	
цемент	
дентин	+
Вид поломки пластинчатого протеза, требующий обязательного получения оттиска с протеза	
при линейном переломе	
при приварке зуба с переносом кламмера	+
при трещине в базисе протеза	
ВИЧ погибает	
При нагревании до 56 градусов в течении 30 минут	+
При дезинфекции, в соответствующем режиме	
В замороженной крови, сперме	
ВИЧ-инфекция не передается при	
Рукопожатии	
Использовании одного шприца, несколькими лицами	
Кашле, чихании	
Пользовании туалетами или душевыми	
от инфицированной матери плоду	
Укусах комаров или других насекомых	
первый, третий, четвертый, шестой ответ	+
ВИЧ-инфицированный пациент, получающий только консультативные услуги	
должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе	+
не должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе	
Во время примерки металлическая коронка должна	

свободно накладываться	
накладываться со щелчком	
накладываться с небольшим усилием	+
Воздушный метод стерилизации применяется для изделий из	
металла	
хлопчатобумажной ткани	
стекла	
силиконовой резины	
первый, третий ответ	+
Войдя в з/т лабораторию, в которой используется газовое оборудование, в первую очередь нужно	
включить свет	
включить холодильник	
понюхать воздух	+
Высока вероятность инфицирования ВИЧ при	
половом контакте с ВИЧ-инфицированным	
проживании в одной квартире с ВИЧ-инфицированным	
совместном парентеральном введении с ВИЧ-инфицированным наркотических веществ	
рождении ребенка ВИЧ-инфицированной женщиной	
первый, третий, четвертый ответ	+
Где располагается дуга бюгельного протеза на нижней челюсти	
выше уздечки языка и ниже шейки зубов	+
выше уздечки языка	
ниже шеек зубов	
Главное требование, предъявляемое к моделям	
не иметь повреждений и пор на площади будущего протеза	+
иметь высоту модели в ее основании не менее 1-1,5 см	
не быть массивной и громоздкой	
Главный недостаток бюгельных протезов, по сравнению с несъемными мостовидными, состоит в том, что	
они занимают больше места в полости рта	
у них ниже жевательная эффективность	+
они менее эстетичны	
Глазурование цельнолитого каркаса с фарфоровой облицовкой проходит	
без вакуума	+
в вакууме	
в атмосферных условиях	
Глубокий прикус характеризуется	
щелью между передними зубами	
обратным перекрытием	
крайней степенью перекрытия верхними резцами нижних резцов и травмированием слизистой оболочки за шейками верхних резцов	+
Готовность расплавленного сплава к заполнению литейной формы определяют	
по моменту достижения наивысшей текучести-разрыву оксидной пленки	+
по температуре нагрева сплава	
по времени нагревания и расплавления	
Готовому металлокерамическому протезу придают естественный блеск	
красители	
обработка протеза алмазными борами с тонкой насечкой	
глазурь	+
Граница частичного съемного протеза в боковом участке по отношению к естественным зубам проходит	
по переходной складке	
в области шеек зубов	
перекрывают зубы на 2/3	+
Группы риска инфицирования ВИЧ	
потребители инъекционных наркотиков	
больные, получающие кортикостероиды	
коммерческие секс-работники	
мужчины, имеющие секс с мужчинами	
первый, третий, четвертый ответ	+
Дезиконт (индикаторные полоски) используют для	

Определения концентрации дезинфицирующего средства	+
Определения неправильно приготовленного дезинфицирующего раствора	
Определения % соотношения дезинфицирующего средства и воды	
Дезинсекция это	
Борьба с паразитирующими на людях и предметах их обихода членистоногими	+
Борьба с грызунами в лечебном учреждении	
Дератизация это	
Борьба с паразитирующими на людях и предметах их обихода членистоногими	
Борьба с грызунами в лечебном учреждении	+
Длина штифта у штифтового зуба должны быть не менее	
1/3 длины коронки	
1/2 длины коронки	
полной длины коронки	+
Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо соблюдать следующие условия	
коротко подстриженные ногти	
отсутствие лака на ногтях	
отсутствие искусственных ногтей	
отсутствие на руках ювелирных украшений	
все ответы верны	+
Для изготовления металлокерамической коронки изготавливается модель	
обыкновенная	
разборная	+
Для изготовления прикусного шаблона высота прикусного валика в переднем отделе должна быть	
1,5	
1	+
2	
Для металлической коронки в результате препаровки зуб принимает	
цилиндрическую форму	+
овальную форму	
прямоугольную форму	
Для обработки рук перед выполнением инъекции можно использовать	
70% этиловый спирт	+
Одноразовые спиртовые салфетки	
Хлоргексидин спиртовой раствор 0,5%	
раствор хлормисепта 0,5%	
Для оценки состояния пострадавших на месте происшествия используют	
измерение АД, подсчет пульса за 1 мин., аускультацию	
расспрос, осмотр, пальпацию, подсчет пульса за 10-15 сек	+
лабораторные экспресс-методы	
УЗИ, рентгенографию, ЭКГ	
Для получения разборной модели используются	
ретенционные шарики	
штифты	+
кляммерная проволока	
Для предотвращения просвечивания металлического каркаса в металлокерамическом протезе обжиг грунтового слоя проводят	
без вакуума	
в вакууме 1 раз	
в вакууме дважды	+
Для промывания желудка необходимо приготовить чистую воду с температурой	
12 градусов С	
18-20 градусов С	+
24-36 градусов С	
Для снятия функционально оттиска нужна	
стандартная ложка	
индивидуальная ложка	+
Для стерилизации применяются средства, обладающие	
статическим действием	
вирулицидным действием	
спороцидным действием	+

фунгицидным действием	
родентицидным действием	
Для того чтобы зубы с «живой» пульпой не реагировали на термические и термические раздражители не обходимо	
постоянно полоскать рот содовым раствором	
принимать бальзам Биттнера	
покрыть их временными протезами	+
Для удушья характерны	
Сильная головная боль	
Сильный кашель, синюшность и отёчность лица	+
Беспокойство, потливость, дрожь	
Боли в сердце	
Для успешного ортодонтического лечения необходимо	
приложение определенной силы в нужном направлении	
отсутствие препятствий на пути перемещаемых зубов	
готовое место для перемещаемого зуба	
все ответы верны	+
Для штамповки коронок гильза	
прожигается до соломенно-желтого цвета	+
прожигается докрасна	
не прожигается	
Для электротравм 1 степени тяжести характерно	
потеря сознания	
расстройства дыхания и кровообращения	
судорожное сокращение мышц	+
клиническая смерть	
Долг медицинского работника	
никогда и ни под каким предлогом не участвовать в действиях, направленных против здоровья людей	+
участвовать в подобных действиях в военное время	
Если на модели колпачок плотный, а во рту широкий, значит	
на культю был нанесен толстый слой лака	+
на культю был нанесен тонкий слой лака	
произошла деформация оттиска или модели	
Естественные пути передачи ВИЧ-инфекции	
половой	
вертикальный	
трансфузионный	
первый, второй ответ	+
Жевательные мышцы	
меняют положение языка	
приводят в движение нижнюю челюсть	+
Журнал учета работы ультрафиолетовой бактерицидной установки заполняется	
ежедневно	
1 раз в неделю	
1 раз в месяц	
при каждом включении установки	+
За нарушения трудовой дисциплины медработники могут привлекаться	
к дисциплинарной ответственности	+
уголовной ответственности	
наказанию не подлежат	
Зуб человека состоит из	
коронки	
шейки	
корня	
все ответы верны	+
Зубной техник, работающий в государственном учреждении, заполняет документы	
амбулаторная история болезни, рабочий лист зубного техника, заказ (наряд), документы по списанию материалов	
заказ (наряд), рабочий лист зубного техника, документы по списанию материалов	+
заказ (наряд), направление в кассу, документы по списанию материалов	
Зубы верхней челюсти наклонены коронками	

к наружи	+
в небную сторону	
Зубы нижней челюсти наклонены коронками	
к наружи	
в язычковую сторону	+
Измерения микроклимата в лечебном учреждении	
проводят 2 раза в год	+
проводят 1 раз в год	
не проводят	
Измерения освещенности в лечебном учреждении	
проводят 2 раза в год	
проводят 1 раз в год	+
не проводят	
Изучением, предупреждением и лечением зубочелюстных аномалий занимается	
ортодонтия	+
стоматология	
ортопедия	
Иммобилизация при подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника	
петля Глиссона	
не требуется	
ватно-марлевый воротник	+
працевидная повязка	
Инструктаж работников осуществляющих уборку помещений по вопросам санитарно-гигиенического режима и технологии уборки необходимо проводить	
1 раз в год	
2 раза в год	
при приеме на работу	
при приеме на работу и потом 1 раз в год	+
Интенсивы в металлокерамическом протезе наносятся для	
отражения индивидуальных особенностей цвета зуба	+
прочности керамического покрытия	
уменьшения усадки керамики	
Искусственные пути передачи ВИЧ-инфекции	
трансфузионный	+
при употреблении в/в наркотиков	
через медицинские отходы, не прошедшие дезинфекцию	
аэрогенный	
Искусственные зубы ставятся на приточке при	
прогении	
прогнатии	+
прямом прикусе	
К методам временной остановки кровотечения относятся	
перевязка сосуда в ране	
перевязка сосуда на протяжении	
наложение кровоостанавливающего жгута	+
форсированное сгибание конечностей	
К технологическим свойствам материалов относится	
ковкость	+
усталость	
упругость	
К химическому свойству материалов относится	
спаиваемость	
истираемость	
окисление	+
Как лучше разместить окклюзионную накладку на поверхности премоляра, ограничивающего концевой дефект при протезировании дугowymi протезами	
на дистальной поверхности	
на медиальной поверхности	+
на дистальной и медиальной поверхности	
Какие материалы применяются для получения огнеупорной модели	
супергипс, гипс	
гелин, огнеупорная масса	+

супергипс	
Каркасбюгельного протеза отливают из	
нержавеющей стали	
хромо-кобальтового сплава	+
золото-платинового сплава	
Касательная форма промежуточной части применяется	
во фронтальном участке н/ч и в/ч, в боковом участке в/ч	+
в боковом участке н/ч	
в любом участке	
Категории лиц, не имеющих право на отказ от медицинского вмешательства	
больные инфекционными эпидемиологическими болезнями	
больные СПИДом	
проходящие судебно- медицинскую экспертизу	
первый, третий ответ	+
Кислоты, щелочи, бензин, метилметакрилат, ртуть должны храниться	
в стандартных сосудах с притертыми пробками	+
во флягах	
в бочках из нержавеющей стали	
Кламмер (нем.) – это	
крючок	+
петля	
дуга	
Кожный антисептик применяют для	
Гигиенической обработки рук	
после приготовления пищи	
Хирургической обработки рук	
первый, третий ответ	+
Количество питателей и их сечение зависят от	
размера восковых деталей	
того, из какого материала производится отливка	
сечения восковых деталей, их удаления от стояка, способа плавки и заливки сплава	+
Конденсация керамической массы проводится для	
придания прочности протезу	
уменьшению усадки	+
придания анатомической формы зубу	
Консольные и мостовидные протезы состоят из	
опорных частей	
тела протеза	
кламмерной системы	
все ответы верны	+
Контроль стерилизационного оборудования	
проводят не реже 2 раз в год	+
проводят 1 раз в год	
не проводят	
Коронковая часть зуба состоит из тканей	
эмали, дентина	
дентина, цемента	
эмали, дентина, пульпы	+
Край базиса съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов не доходит до переходной складки, чтобы	
протез, укрепленный жестко кламмерами, не травмировал мягкие ткани в области края	+
протез, укрепленный жестко кламмерами, не сбрасывался	
пациент быстрее привык к протезу	
Кратность обработки кабинетов бактерицидными лампами в рабочее время	
4 раза в смену по 30 минут	
2 раза в смену по 30 минут	+
6 раз в смену по 30 минут	
Кратность обследования медицинского работника на антитела к ВИЧ после аварийной ситуации	
только после аварийной ситуации	
после аварийной ситуации и далее, через 1;3;6 месяцев	

После аварийной ситуации и далее, через 3;6;12 месяцев	+
Кто должен расчерчивать каркас бюгельного протеза	
зубной техник	
врач стоматолог	+
медсестра	
Лаково-красная моча – признак	
синдрома длительного сдавления	+
асфиксии	
перегревания	
переохлаждения	
Лекарственные препараты для профилактики ВИЧ-инфекции	
Неовир (оксодигидроакридилацетат натрия)	
Циклоферон (меглюминакридонацетат)	
Лопинавир (ритонавир)	+
Зидовудин(ламивудин)	
Литники устанавливаются с целью	
как можно быстрее заполнить форму расплавленным сплавом	
обеспечить качественное литье	+
не допустить частичного заполнения формы	
Максимальная температура пламени горелки паяльного аппарата	
600	
1 200	+
1 800	
Медицинский работник, инфицированный ВИЧ	
Может работать в лечебном учреждении, если он не проводит манипуляций	+
Не может работать в лечебном учреждении, даже если он не проводит манипуляций	
Межевая линия находится с помощью	
калибровочного стержня	
парраллелометра	+
аппарата Паркера	
Мероприятия по профилактике профессионального инфицирования медработников	
Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима	+
Безопасная организация труда	
Обучение персонала методам профилактики	
Металлический колпачок может получиться широким, если	
моделировку проводили с тонким слоем лака	
перед моделировкой провели гравировку модели	
на культуру был нанесен толстый слой лака	+
Метод выявления среднего наклона продольных осей зубов	
произвольный	
метод выбора	
анализирующий	+
Моделирование каркаса металлокерамического протеза без гирлянды возможно при	
заболеваниях пародонта	
патологической стираемости	+
недостаточной высоте коронок опорных зубов	
Моюще-дезинфицирующее средство используют для	
Дезинфекции использованного инструментария	
Дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой инструментария	+
Дезинфекции и стерилизации инструментария	
На верхней челюсти шире дуга	
альвеолярная	
базальная	
зубная	+
На ВИЧ-инфекцию обследуются обязательно	
беременные женщины	
больные с поражениями легких	
больные парентеральными вирусными гепатитами	
доноры крови и органов	
первый, третий, четвертый ответ	+
На нижней челюсти уже дуга	

альвеолярная	
базальная	
зубная	+
На обожженную поверхность накладывают	
сухую асептическую повязку	+
повязку с раствором чайной соды	
повязку с синтомициновой эмульсией	
Нажатие на грудину при непрямом массаже сердца проводят	
всей ладонной поверхностью кисти	
запястьем	+
пальцами	
Назначение муфты на литнике	
для отвода воздуха	
как депо жидкого сплава для компенсации усадки	+
для прочности литника	
Назовите причину (фактор), из-за которой цвет металлокерамической коронки, определенный врачом, не изменится	
металлический каркас имеет толстые стенки	
неправильный подбор грунта	
загрязнение порошка в результате запыленности воздуха рабочей комнаты	+
Наиболее точные коронки, изготовленные методом	
гальванопластическим	+
литья	
штамповки	
Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений	
Наложение жгута	
Тампонада раны	
Тугая давящая повязка	+
Закрутка	
Наибольшая выпуклость по периметру зуба называется	
шейкой	
экватором	+
бугром	
Наказания, не относящиеся к дисциплинарной ответственности	
замечание	
выговор	
строгий выговор	
увольнение	
лишение материнских прав	
лишение свободы	
все, кроме первого, второго. Третьего	+
Нанесение красителей на жевательную поверхность премоляров и моляров металлокерамического протеза проводят (по показаниям) после	
обжига грунтового слоя	
обжига дентинного слоя	+
глазурования	
Наука о профессиональном поведении медработника - это	
медицинская этика	
медицинская деонтология	+
медицинская статистика	
Небный торус	
может быть причиной балансировки	+
значения при фиксации протеза не имеет	
Небный торус на верхней челюсти при протезировании	
изолируется	+
не изолируется	
проводят лечение	
Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского работника являются	
сообщение на предыдущее место работы	
заключение трудового договора	+
внесение записей в трудовую книжку	

выдача справки о месте работы	
Неотложная помощь при тяжелой электротравме, приведшей к остановке сердца	
освободить пострадавшего от действия тока	
выполнить ИВЛ, прекардиальный удар, непрямой массаж сердца	
инъекция адреналина	
дать вдыхать пары нашатырного спирта, вызвать бригаду скорой помощи	
первый, второй ответ	+
Неотложная помощь при носовом кровотечении	
Запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду	
Нагнуть голову больного вперед, положить холод на переносицу, сделать тампонаду	+
Немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, сделать тампонаду	
Приложить тепло к переносице	
Неотложная помощь при ожогах	
обезболивание	
асептическая повязка	
обильное питье	
димедрол	
грелка	
первый, второй, третий ответ	+
Неотложная помощь при остром отравлении через желудочно-кишечный тракт	
промыть желудок 10-12 л. воды, дать активированный уголь 1 гр. внутрь	+
вызывать рвоту	
дать слабительное	
поставить клизму	
Неотложная помощь при отравлениях неприжигающими ядами	
водная нагрузка	
промывание желудка	
клизма	
слабительное	
все ответы верны	+
Неотложная помощь при травматическом шоке	
обезболивание	
иммобилизация	
остановка кровотечения	
седуксен	
эфедрин	
первый, второй, третий ответ	+
Несъемный протез, в котором опорные части располагаются по обе стороны дефекта зубного ряда – это	
консольный протез	
мостовидный протез	+
винир	
Нижние боковые естественные зубы закрываются базисом на	
1/3	
1/2	
2/3	+
Нижние передние естественные зубы закрываются базисом на	
1/3	
1/2	
2/3	+
Нижняя челюсть соединена с височной костью	
неподвижно	
посредством височно-нижнечелюстного сустава	+
Нормативно-правовая база медицинского права включает в себя	
ФЗ об основах охраны здоровья граждан	
арбитражное право	
ФЗ о системе государственной службы РФ	
первый, второй ответ	+
Нормативный документ, утративший силу	
СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, роддомов и других лечебных стационаров»	+

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»	
СанПин 2.1.7.2790-10 Санитарно–эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами	
СанПин 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	
Обеззараживание использованного перевязочного материала проводится	
раствором хлорамина 3% на 1 час	
раствором Жавель Солид 0,1-0,2 % на 2 часа	+
раствором перекиси водорода 6% на 1 час	
раствором сульфохлорантина «Д» 0,2% 2 часа	
Обжиг дентинного и прозрачного слоев фарфоровой массы проводят	
без вакуума	
в вакууме	+
в атмосфере	
Обморок – это	
проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания	
аллергическая реакция	
потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса	+
Обязательному ФЛГ-обследованию 2 раза в год подлежат	
лица, находящиеся в тесном бытовом или профессиональном контакте с источниками туберкулезной инфекции	
ВИЧ-инфицированные	
больные сахарным диабетом	
мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы	
лица, освобожденные из СИЗО и ИУ, - в первые 2 года после освобождения	
лица, проживающие совместно с беременными женщинами и новорожденными	
первый, второй, пятый ответ	+
Огнеупорная модель применяется для	
изготовления штифтовых зубов	
изготовления металло-керамических протезов	
изготовления шинирующих бюгельных протезов	+
Огнеупорную модель применяют для	
компенсации усадки металла	+
для удобства моделировки	
для того чтобы восковая композиция не деформировалась	
Оказывая помощь при ожоге первой степени, в первую очередь необходимо обработать обожжённую поверхность	
96% этиловым спиртом	
Холодной водой до онемения	+
Стерильным новокаином	
Жиром	
Окклюзионная поверхность образована	
окклюзией	
режущими краями передних зубов и жевательными площадками боковых зубов	+
Опорная часть зуба на нижней челюсти находится	
ниже межевой линии	
выше межевой линии	+
между экватором и шейкой зуба	
Оптимальное время оказания медицинской помощи с момента травмы	
1	
2	
5-30 минут	+
Оптимальное положение кламмерной линии для нижней челюсти при частичном протезировании	
сагиттальная	
трансверзальная	
диагональная	+
Основное преимущество цельнолитых мостовидных протезов	
эстетичность	
простота изготовления	
прочность, надежность	+
Основной недостаток пластмассовых коронок	
быстро стираются	+

быстро расцементируются	
вредны для организма	
Основные части штифтового зуба	
коронковая часть	
корневая защитная пластинка	
штифт	
все ответы верны	+
Основные элементы бюгельного протеза	
базисы, каркас, искусственные зубы	+
дуга, кламмеры, базисы, зубы	
дуга, седловидные части, базисы, зубы	
Основным направлением стоматологической помощи является	
профилактика	
лечение	
лечебно-профилактическое	+
Основным положительным свойством цельнолитых металлических протезов является	
эстетический вид	
исключение припоя	+
сокращение числа посещений больным	
Основным требованием к слепку считается	
при хранении не давать усадки	
легко вводится в полость рта	
давать точное отображение тканей протезного ложа	+
Основоположником научной ортодонтии считают	
Цельса	
Фошара	
Энгля	+
Основу восковой смеси для базисов составляет	
парафин	+
пчелиный воск	
церезин	
Основу липкого воска составляет	
канифоль	+
монтанский воск	
пчелиный воск	
Остановке кровотечения способствует	
Новокаин	
Гепарин	
Викасол	+
Аспирин	
Открытый прикус характеризуется	
обратным перекрытием	
отсутствием смыкания передних зубов, а иногда и премоляров	+
глубоким перекрытием	
Отходы от лекарственных препаратов и дез. средств с истёкшим сроком годности относятся к	
класс А (эпидемиологически безопасные)	
класс Б (эпидемиологически опасные)	
класс В (эпидемиологически чрезвычайно опасные)	
класс Г (токсикологически опасные)	+
класс Д (радиоактивные)	
Пайка мостовидного протеза начинается с прогрева	
более массивных частей	+
с коронок	
формовочной массы	
Паяльный аппарат при воспламенении тушат	
песком	+
огнетушителем	
водой	
Первая медицинская помощь при ранениях вен шеи	
пальцевое прижатие	
наложение давящей воздухопроницаемой повязки	+

обезболивание	
прошивание раны	
Первичный реанимационный комплекс включает	
восстановление проходимости дыхательных путей, ИВЛ, закрытый массаж сердца	+
прекардиальный удар, закрытый массаж сердца	
регистрацию ЭКГ, введение адреналина внутрисердечно, дефибриляцию	
Первый клинический этап при протезировании частичными съёмными протезами	
снятие слепков	+
определение высоты прикуса	
Первый моляр верхней челюсти ставится слева на нижнюю челюсть, а левый моляр верхней челюсти-на правую сторону нижней челюсти	
при прогении	+
при прогнатии	
при ортогнатии	
Первыми признаками развивающегося травматического шока являются	
резкое побледнение кожных покровов, липкий холодный пот	
психомоторное возбуждение, неадекватная оценка своего состояния	+
судороги, апатия, потоотделение	
гиперемия, сухость кожи, пенистое отделение изо рта, галлюцинации	
Передзагипсовкой в кювету восковая композиция приклеивается по границе будущего протеза воском	
чтобы восковая композиция не упала с модели	
чтобы между воском и моделью не попал гипс	+
чтобы воск не деформировался во время гипсовки	
Периодонт зуба- это	
десна	
связки зубов	+
Пластинка Катца с наклонной плоскостью относится к аппаратам	
механического действия	
функционального действия	+
комбинированного (сочетанного) действия	
Пластмассовые мостовидные протезы применяются	
во фронтальном участке	+
в боковом участке	
на все виды зубов	
Платяная вошь во внешней среде без пищи живет при низкой температуре	
до 0 суток	+
до месяца	
до года	
Плечо-кламмера должно касаться зуба	
в максимальном количестве точек	+
одной точке	
в трех точках	
Площадь производственного помещения на каждого работающего не менее	
3 м ²	
4 м ²	+
5 м ²	
По использованному материалу кламмеры бывают	
металлические, пластмассовые, сочетанные	+
восковые, парафиновые	
гипсовые	
По методу изготовления кламмеры различают	
штампованные	
гнутые	
литые	
все ответы верны	+
По сравнению с пластмассовыми бюгельные протезы в основном	
позволяют большую часть жевательного давления передавать естественным путем	+
меньше нарушают все виды чувствительности в полости рта	
способствуют быстрому привыканию пациента к протезу	
По функции кламмеры различают	

удерживающие	
опорные	
опорно –удерживающие	
все ответы верны	+
Поверхность обезжиренного и высушенного каркаса металлокерамического должна быть	
глянцева	
серо-матовая	+
с зеленоватым оттенком	
Поверхность соприкосновения с губой или щекой называется	
жевательной (окклюзионной)	
вестибулярной	+
оральной	
боковой медиальной	
боковой дистальной	
Поверхность соприкосновения с зубами противоположной челюсти, называется	
жевательной (окклюзионной)	+
вестибулярной	
оральной	
боковой медиальной	
боковой дистальной	
Поверхность соприкосновения с расположенным сзади зубом называется	
жевательной (окклюзионной)	
вестибулярной	
оральной	
боковой медиальной	
боковой дистальной	+
Поверхность соприкосновения с соседним впереди стоящим зубом называется	
жевательной (окклюзионной)	
вестибулярной	
оральной	
боковой медиальной	+
боковой дистальной	
Поверхность, обращенная в полость рта, называется	
жевательной (окклюзионной)	
вестибулярной	
оральной	+
боковой медиальной	
боковой дистальной	
Податливость слизистой оболочки полости рта – это смещение слизистой	
при сокращении расположенных под ней мышц	
под действием края протеза	
под воздействием приложенной силы	+
Подвижное соединение дуги с опорными элементами осуществляется с помощью	
кламмеров	
аттачменов	+
телескопических коронок	
Пол в основных помещениях зуботехнической лаборатории покрывают	
линолеумом	+
полимерцементной мастикой	
керамической плиткой	
Получению качественной комбинированной разборной модели способствует	
добавка в гипс поваренной соли	
добавка в гипс буры	
замешивание гипса в мультиваке и отливка модели на вибростоле	+
Помещение зуботехнической лаборатории подразделяется на	
основные	
специальные	+
подсобные	+
Понятие "врачебная тайна" предусматривается	
трудовым кодексом	
конституцией РФ	
законом об адвокатской деятельности	

ФЗ об основах охраны здоровья граждан	+
законом о полиции	
Порекомендовать больному хранить съемный протез	
сухим	+
в той же среде, как и в полости рта	
в горячей воде	
После отлития модели шейки зуба под штампованную коронку	
гравировается	+
не гравировается	
После получения литья перлы(бисер), нанесенные на восковую композицию при изготовлении металлопластмассового протеза, срезаются на половину их высоты	
для лучшего сцепления с пластмассой	
чтобы уменьшить ретенционные зоны	
чтобы уменьшить слой пластмассы	+
После припасовки в полости рта фарфоровую коронку подвергают обжигу для	
увеличения прочности	
глазурования	+
увеличения твердости	
Последовательность оказания помощи при сдавливании конечности	
наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, асептическая повязка, иммобилизация, наружное охлаждение конечности, инфузия	+
асептическая повязка, наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, иммобилизация, наружное охлаждение конечности, инфузия	
освобождение сдавленной конечности, обезболивание, инфузия, наложение жгута, иммобилизация	
иммобилизация, обезболивание, наложение жгута, инфузия	
Права медицинского работника	
на условия выполнения своих трудовых обязанностей	
бесплатного проезда в общественном транспорте	
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет работодателя	
все, кроме второго ответа	+
Права пациента	
на выбор врача и медицинской организации	
на выбор палаты в медицинской организации	
на получение информации о своих правах и обязанностях	
на получение информации о состоянии своего здоровья	
на составление меню рациона питания	
на отказ от медицинского вмешательства	
первый, четвертый, шестой ответ	+
Правильно подобрать цвет керамической коронки можно при	
искусственном освещении	
естественном освещении	+
искусственном освещении, но в солнцезащитных очках	
Правовые требования к занятию индивидуальной медицинской деятельностью	
наличие медицинского образования	
наличие лицензии	
наличие гражданства	
наличие стажа	
первый, второй, третий	+
Преимущества аттачменов перед обыкновенными опорно-удерживающими кламперами	
эстетичнее	
могут быть подвижными и жесткими	
все ответы верны	+
При заболеваниях пародонта и атрофии лунки клиническая коронка зуба	
не изменяется	
увеличивается	+
уменьшается	
При изготовлении комбинированной коронки «окошко» вырезается	
сразу после изготовления коронки	
после пайки протеза	
после полировки протеза	+

При изготовлении комбинированной промежуточной части восковые петли устанавливаются для	
удержания пластмассы	+
для укрепления восковой композиции	
При изготовлении коронок моделировка воском производится с избытком под	
металлическую коронку	
пластмассовую	+
цельнолитую	
При изготовлении металлокерамического мостовидного протеза промежуточной части в жевательном участке придается	
касательная форма	
седловидная форма	+
промывная форма	
При изготовлении металлопластмассового протеза пластмасса укрепляется с помощью	
петель	
ретенционного материала	+
насечек	
При изготовлении цельнолитной коронки зуб препарируется	
конусовидной формы	+
цилиндрической формы	
прямоугольной формы	
При изготовлении цельнолитной коронки, зуб препарируется	
конусовидной формой	+
цилиндрической формой	
прямоугольной формой	
При изготовлении штифтового зуба штифт должен иметь	
круглую форму	
многогранную форму	+
любую форму	
При моделировании каркаса с оральной стороны создается выступающая полоса «гирлянда» шириной	
0,5	
1	
около 2 мм	+
При наличии большого дефекта зубного ряда тело мостовидного протеза изготавливается по ширине	
равной опорным зубам	
шире чем опорные зубы	
уже чем опорные зубы	+
При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у взрослого должен быть	
1-2 см	
2-4 см	
4-5 см	+
6-8 см	
При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение	
Полусидячее	
Ровное горизонтальное	
Горизонтальное с приподнятой головой	
Горизонтальное с приподнятыми ногами	+
При отравлении фосфороорганическими соединениями антидотом является	
атропина сульфат	+
антициан	
магния окись	
натрия тиосульфат	
При патологической стираемости клиническая коронка зуба	
не изменяется	
увеличивается	
уменьшается	+
При подготовки зубов под несъемный мостовидный протез боковым стенкам опорных зубов	
придается параллельность	+
не придается параллельность	

внимание не уделяется	
При попадании крови или других биологических жидкостей при аварийной ситуации на слизистые глаз, можно использовать	
Чистую воду	+
1% раствор борной кислоты	
раствор марганцовокислого калия в воде в соотношении 1:10 000	
раствор хлоргексидина водный	
При постановке зубов в ортогнатическом прикусе клык	
отстоит от стекла на расстояние 0,5 мм	
касается стекла	+
отстоит от стекла на расстояние 1 мм	
При применении вакуумного литья	
сплав заполняет форму под действием центробежных сил	
отрицательное давление через поры упаковочной массы втягивает сплав	+
сильный поток воздуха вгоняет сплав в форму	
При резком охлаждении литейной формы происходит	
образование швов и трещин	
коробление металла	+
образование усадочных раковин	
При сборе медицинских отходов запрещается	
вручную разрушать, разрезать, отходы классов Б и В (том числе использованные системы для внутривенных инфузий)	
снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции	
собирать в специальные контейнеры, предназначенные для сбора медицинских отходов	
Использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов	
первый, второй, четвертый ответ	+
При черепно-мозговой травме противопоказано применение	
морфина	+
противостолбнячной сыворотки	
антибиотиков	
противорвотных	
При чрезмерно развитии нижней челюсти возникает соотношение челюстей	
глубокое	
прогнатическое	
прогеническое	+
Признак артериального кровотечения	
Медленное вытекание крови из раны	
Темно-вишнёвый цвет крови	
Сильная пульсирующая струя крови	+
Образование гематомы	
Приказ о нормативах потребления этилового спирта	
№ 245	+
№ 238	
№ 510	
Прикус – это	
аномалия зубных рядов	
характер смыкания зубов в положении центральной окклюзии	+
характер смыкания челюстей	
Принципиальная особенность построения литниковой системы при литье на огнеупорной модели состоит в том, что	
главный литник имеет наименьший диаметр	
главный литник имеет наибольший диаметр, и от него отходят питатели к наиболее массивным частям восковой репродукции	+
все дополнительные литники подведены к главному в середине модели	
Принципы лечения чесотки	
одновременное лечение всех больных в очаге	
мытьё больного со сменой нательного и постельного белья в начале и конце курса терапии	+
втирание препарата тампоном или салфеткой	
втирание препарата лицам старше трех лет в весь кожный покров	

втирание препарата в вечернее время на 8--0 часов	
контроль излеченности проводить после - недели лечения	
Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме	
Начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока	
Освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию	+
Закопать пострадавшего в землю	
Облить водой	
Принципы оказания помощи при химических ожогах	
По возможности нейтрализовать вещества, вызывающие ожог, промыть холодной водой	+
Промывание холодной водой в течение часа	
Анальгетики, начиная со второй степени – сухие асептические повязки без обработки обожжённой поверхности	
Присыпать тальком	
Приоритетным прикусом первый маляр верхней челюсти касается стекла бугром	
медиально-щечным	
медиально-небным	+
дистально-небным	
Приспособления для удерживания протеза во рту	
кламмеры	
замки-аттачмены	
балки с фиксаторами	
все ответы верны	+
Причины сколов керамического покрытия в пришеечной области металлокерамического протеза	
толстый каркас	
слишком тонкий каркас, отсутствует гирлянда	+
короткий металлический каркас	
Провести профилактику ВИЧ-инфекции медработнику после аварийной ситуации с ВИЧ-инфицированным пациентом антиретровирусными препаратами следует в период, не позднее	
72	+
1	
24	
Проводить дезинфекцию использованного одноразового инструментария	
Необходимо	+
не обязательно	
Протез для восстановления частично разрушенных тканей естественного зуба – это	
вкладка	+
полукоронка	
искусственная коронка	
штифтовый зуб	
Протез для восстановления коронковой части зуба при полном ее разрушении – это	
вкладка	
полукоронка	
искусственная коронка	
штифтовый зуб	+
Протез для восстановления разрушенной естественной коронки зуба – это	
вкладка	
полукоронка	
искусственная коронка	+
штифтовый зуб	
Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется	
только в детском возрасте	
только в подростковом возрасте	
на протяжении всей жизни человека	+
Пути передачи вирусных гепатитов В, С	
Половой путь	
Парентеральный путь	
Вертикальный путь	
Воздушно-капельный путь	

фекально-оральный	
трансмиссивный	
первый, второй, третий ответ	+
Пути передачи ВИЧ-инфекции	
Половой путь	
Парентеральный путь	
Вертикальный путь	
Воздушно-капельный путь	
фекально-оральный путь	
первый, второй, третий ответ	+
Пути передачи внутрибольничной инфекции	
парентеральный	
контактный	
воздушно-капельный	
фекально - оральный	
биологический	
химический	
первый, второй, третий, четвертый ответ	+
Работа с кислотами, щелочами, бензином, метилметакрилатом, ртутью разрешена	
только в вытяжных шкафах	+
на рабочем месте	
в специальных помещениях	
Работать с электроприборами нельзя без	
заземления	+
шапочки	
защитных очков	
Различают зубы	
однокорневые	
двухкорневые	
трехкорневые	
все ответы верны	+
Размер пластмассовых зубов в зависимости от цифрового обозначения	
уменьшается с увеличением цифры	
увеличивается вместе с увеличением цифры	+
не зависит от цифрового обозначения	
Растворы для стерилизации химическим методом	
сайдекс, глутарал	
6% перекись водорода	
3% перекись водорода	
лизоформин 3000	
эригид-форте	
второй, четвертый, пятый ответ	+
Расход спирта этилового 95% списывается в	
Гр	+
Мл	
Кг	
Реанимацию обязаны проводить	
только врачи и медсестры реанимационных отделений	
все специалисты, имеющие медицинское образование	+
все взрослое население	
Результатом правильного наложения жгута при кровотечении является	
прекращение кровотечения, отсутствие пульса, бледность кожи	+
уменьшение кровотечения, сохранение пульса, увеличение цианоза	
прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза	
уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи	
Ретенционная часть зуба на верхней челюсти находится	
выше межевой линии	+
ниже межевой линии	
на межевой линии	
Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплексамеероприятий	
по профилактике экзогенных интоксикаций	

направленных на пропаганду «Здорового образа жизни»	
по профилактике внутрибольничной инфекции	+
Сбор отходов класса А осуществляется в	
многоразовые емкости	
одноразовые пакеты белого цвета	+
одноразовые пакеты желтого цвета	
одноразовые пакеты красного цвета	
Сбор отходов класса Б (не колеще-режущий инструментарий) осуществляется в	
одноразовые пакеты белого цвета	
одноразовые пакеты желтого цвета	+
одноразовые пакеты красного цвета	
Скол керамического покрытия металлокерамического протеза мог произойти из-за	
высокой коронковой части зуба	
большой толщины керамического покрытия	+
отсутствие оксидной пленки	
Слипание поверхностей двух разнородных тел – это	
адгезия	+
когезия	
анатомическая ретенция	
Соединениекламмера с базисом бывает	
стабильное	
полулабильное	
лабильное	
все ответы верны	+
Состав «Аптечки аварийных ситуаций»	
70 % спирт этиловый , 5% спиртовой раствор йода,бактерицидныйлейкопластырь,стерильныйбинт,резиновые перчатки ,ножницы, препараты выбора: или 0,05 % раствор марганцовокислого калия или 1 % раствор борной кислоты или 1% раствор протаргола	
70 % спирт этиловый , 5% спиртовой раствор йода, бактерицидный лейкопластырь, салфетка марлевая медицинская стерильная, бинт марлевый медицинский стерильный	+
70 % спирт этиловый, 5% спиртовой раствор йода, бактерицидный лейкопластырь, ножницы препараты выбора: или 0,05 % раствор марганцовокислого калия или 1 % раствор борной кислоты	
70 % спирт этиловый, 5% спиртовой раствор йода, стерильный бинт, резиновые перчатки, ножницы, препараты выбора: или 0,05 % раствор марганцовокислого калия или 1 % раствор протаргола	
Средняя линия наклона опорных зубов-это	
межевая линия	
путь введения и выведения бюгельно протеза на челюсти	+
кламмерная линия	
Средняя температура плавления нержавеющей стали	
1250 ° С	
1425 ° С	+
1500° С	
Субъектами медицинского права являются	
медицинский персонал	
суд	
пациент	
ЛПУ	
должностное лицо правоохранительных органов	
первый, третий, четвертый ответ	+
Съемные пластиночные протезы состоят из	
базиса	
искусственных зубов	
фиксирующей системы	
все ответы верны	+
Тело консольного и мостовидного протеза – это	
искусственные зубы	+
искусственные коронки	
штифтовые зубы	
Термин «деловая субординация» означает	

демократизм в отношениях коллег	
распоряжения старшего по должности, являются обязательными для подчиненных	+
подчинение коллегам	
Толщина литника для маленьких деталей	
0,5-1,0 мм	
не менее 1,5 мм	+
2,0-3,0 мм	
У моляров верхней челюсти	
один корень	
два корня	
три корня	+
У резцов, клыков и премоляров	
один корень	+
два корня	
три корня	
Уборка в зуботехнической лаборатории должна проводиться не менее	
1 раза в день	
2 раз в день	+
3 раз в день	
Удаляется ли инородное тело, воткнувшееся в глазное яблоко	
да	
нет	+
да, если больного далеко везти	
Удерживание протеза в полости рта в покое и при разговоре – это	
фиксация	+
стабилизация	
артикуляция	
Удерживание протеза в полости рта во время жевания – это	
фиксация	
стабилизация	+
артикуляция	
Ультрафиолетовые лучи убивают микобактерии за	
2 – 3 секунды	
2 – 3 минуты	+
2 – 3 часа	
2 – 3 дня	
Утилизация медицинских отходов проводится согласно	
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно Эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»	+
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»	
СанПиН 2.1.7.28-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов в ЛПУ	
Утолщения костной ткани на верхней челюсти, через которые большая часть жевательного давления передается на основание черепа, называются	
траектории	
экзостозы	
контрфорсы (устои)	+
Факторы передачи гепатита «В»	
кровь	
сперма	+
медицинский инструментарий	
продукты питания	
воздух	
Флюс при паянии в основном	
предохраняет от окисления спаиваемые поверхности	+
растворяет образующиеся оксиды металлов	
улучшает текучесть припоя	
Форма тела съёмного мостовидного протеза	
седловидная	+
касательная	
висячая	
Функциональный регулятор Френкеля применяется для лечения	

прогнатии	
прогении	
прогнатии или прогении	+
ХарактеристикакламмераБонвиля	
четырёхплечий. Применяется при первом классе, по Кенеди	
перекидной. Применяется при односторонних концевых дефектах	+
четырёх- или шестиплечий. Применяется при односторонних концевых дефектах зубного ряда	
Цель медицинского страхования	
гарантировать гражданам получение медицинской помощи при возникновении страхового случая	+
гарантировать гражданам получение страховой суммы по истечении срока страхования	
Цельнолитый каркас металлокерамического протеза перед нанесением грунтового слоя обезжиривают	
эфиром	
70% спиртом	
96% спиртом	+
Части мостовидного протеза перед пайкой склеиваются	
липким воском	+
базисным воском	
моделировочным воском	
Частькламмера, лежащая на естественном зубе, является	
телом	
плечом	+
отростком	
Чаще всего в металлопластмассовых конструкциях пластмасса наносится	
с оральной стороны	
со всех сторон	
с вестибулярной стороны	+
Чесоточный клещ вне тела человека живет	
до 5 часов	
до 2 суток	
до 5 суток	+
до 2 недель	
Число бугорков на окклюзионной поверхности постоянных нижних моляров	
два	
три	
четыре	+
Число и место литников зависит от	
почерка, привычек литейщика	
конструкции, методики литья, квалификации специалиста, вида сплава	+
той технологии, которой пользуются в данном ЛПУ	
Чтобы достаточно точно определить количество КХС, необходимого для качественного литья, надо знать	
сколько брали в предыдущем случае	
плотность восковой смеси и сплава	+
объем полости, освободившейся после выжигания воска	
Чтобы исключить завышение прикуса при фиксации готового металлокерамического протеза цементу придают	
консистенцию густой сметаны	
консистенцию липового меда	+
состояние необходимое для заполнения корневых каналов	
Чтобы каркас металлокерамического протеза не потерял жесткость он не должен быть тоньше	
0,3	+
0,4	
0,5	
Ширина валика прикусного шаблона в жевательном участке в полном съемном протезировании должна быть	
0,8	
1	+
1,5	

Шок - это	
острая сосудистая недостаточность	+
острая сердечная недостаточность	
острая почечная недостаточность	